GUIDE DE RÉFÉRENCE DES PRODUITS DE NUTRICIA NORTH AMERICA

CANADA

NUTRICIA

Mis à jour en juin 2021

Communiquer avec Nutricia

Mon(mes) représentant(s) Nutricia :

Nom : .....

Téléphone : .....

Courriel : .....

Nom : .....

Téléphone : .....

Courriel : .....

Nom : .....

Téléphone : .....

Courriel : .....

Comment communiquer avec Nutricia

Service à la clientèle de Nutricia :

- **Téléphone :** 877 636-2283
- **Courriel :** canada.servicealaclientele@nutricia.com

Services nutritionnels de Nutricia :

- **Téléphone :** 800 365-7354
- **Courriel :** nutritionservices@nutricia.com

Internet :

Pour obtenir des renseignements sur les produits de Nutricia et d'autres ressources utiles, visiter le **www.Nutricia.ca.**
Pour obtenir une liste complète de nos sites Web, voir la section *Ressources*.

© 2021 Nutricia North America. Tous droits réservés. Nutricia et ses marques sont des marques déposées. Voir les étiquettes des produits pour plus de détails.

- **Nutricia est un chef de file en matière de mise au point et d'utilisation de la nutrition clinique avancée pour les soins spécialisés**
- **Les produits et les services de Nutricia contribuent à transformer le quotidien de millions de nourrissons, d'enfants et d'adultes**

Ce guide est une référence pratique destinée aux cliniciens pour la gamme complète de produits nutritionnels spécialisés de Nutricia North America au Canada. Nutricia s'efforce de mettre au point des produits de qualité qui offrent plus de choix et de souplesse aux patients d'aujourd'hui afin d'améliorer l'acceptation de leur régime alimentaire. Veuillez noter que l'utilisation de tous nos produits nécessite une surveillance médicale. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec notre équipe des services nutritionnels ou visiter notre site Web au **www.Nutricia.ca**. Notre personnel est composé d'experts hautement compétents prêts à offrir leur soutien à nos clients.
Nous espérons avoir de vos nouvelles.

Consommateurs et patients :

Les produits de Nutricia sont disponibles pour une livraison à domicile pratique assurée directement par Nutricia North America. Les consommateurs peuvent composer notre numéro sans frais ou visiter l'un de nos sites Web. Voir la section *Ressources* pour une liste de nos sites Web.

Les consommateurs peuvent également acheter des produits de Nutricia dans les pharmacies de détail. Les pharmacies peuvent passer des commandes spéciales des produits de Nutricia auprès de leur grossiste ou de Nutricia North America directement*.

** Ne s'applique pas aux produits métaboliques de Nutricia.*

TABLE DES MATIÈRES

Renseignements pour commander 2-3
Contenu selon les indications des produits 6-8
Troubles gastro-intestinaux et allergies alimentaires 9-30
- Instructions pour le mélange 19
- Mesures domestiques 20
- Calcul des volumes à administrer 21
- Tableaux de dilution 22-28

Maladies métaboliques 31-124
Mesures domestiques : Maladies métaboliques 110
- Instructions pour le mélange : Maladies métaboliques ... 112-123

Aliments faibles en protéines 125-126
Neurologie 127-134
- Instructions pour le mélange : KetoCal 132

Autres produits nutritionnels 135-150

CONTENU – Index alphabétique

Aliments faibles en protéines 125
Complete Amino Acid Mix 144
Complex MSD Amino Acid Blend 70
Complex MSD Essential 68
Complex MSD Junior 66
Duocal 140
Essential Amino Acid Mix 146
GlutarAde Amino Acid Blend 86
GlutarAde Essential 84
GlutarAde Junior 82
HCU Anamix Next 90
HCU Lophlex LQ 94
IVA Anamix Next 76
KetoCal 4:1 en poudre 128
KetoCal 4:1 LQ – Vanille et non aromatisé 130
Liquigen 138
MMA/PA Anamix Next 96
Monogen 136
MSUD Lophlex LQ 74
MSUD Maxamum 72
Neocate DHA & ARA 10
Neocate Junior 14
Neocate Nutra 12
Neocate Splash 16
Periflex Advance 36
Periflex Infant 32
Periflex LQ 38
PhenylAde40 Drink Mix 50
PhenylAde60 Drink Mix 52
PhenylAde Essential Drink Mix 48
PhenylAde GMP Drink Mix 40
PhenylAde GMP MIX-IN 46
PhenylAde GMP READY 42
PhenylAde GMP ULTRA 44
PhenylAde MTE Amino Acid Blend 54
PhenylAde PheBLOC LNAA 56
Phlexy-10 Drink Mix 64
Phlexy-Vits 148
PKU Lophlex en poudre 62
PKU Lophlex LQ 60
PKU Periflex Junior Plus 34
Polycal 142
TYR Anamix Next 102
TYR Lophlex GMP MIX-IN 106
TYR Lophlex LQ 104
UCD Anamix Junior 108
XLeu Maxamum 78
XLys, XTrp Analog 80
XMet Analog 88
XMet Maxamum 92
XMTVI Maxamum 98
XPhe Maxamum 58
XPhe, XTyr Analog 100

CONTENU – Selon les indications et les besoins du régime alimentaire*

Allergie au lait de vache, allergies alimentaires multiples, troubles gastro-intestinaux et allergiques connexes
- Neocate DHA & ARA 10
- Neocate Nutra 12
- Neocate Junior 14
- Neocate Splash 16
- Complete Amino Acid Mix 144

Produits à base d'acides aminés
- Neocate DHA & ARA 10
- Neocate Nutra 12
- Neocate Junior 14
- Neocate Splash 16
- Préparations métaboliques de Nutricia 31-124
- Complete Amino Acid Mix 144
- Essential Amino Acid Mix 146

Chylothorax
- Liquigen 138
- Monogen 136

Œsophagite à éosinophiles (EE)
- Neocate DHA & ARA 10
- Neocate Nutra 12
- Neocate Junior 14
- Neocate Splash 16
- Complete Amino Acid Mix 144

Syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires (SEIPA)
- Neocate DHA & ARA 10
- Neocate Junior 14
- Neocate Splash 16

Reflux gastro-œsophagien (RGO)
- Neocate DHA & ARA 10
- Neocate Nutra 12
- Neocate Junior 14
- Neocate Splash 16

Acidémie glutarique de type 1
- GlutarAde Junior 82
- GlutarAde Essential 84
- GlutarAde Amino Acid Blend 86
- XLys, XTrp Analog 80

Homocystinurie et hyperméthioninémie
- HCU Anamix Next 90
- XMet Analog 88
- XMet Maxamum 92
- HCU Lophlex LQ 94

Erreurs innées du métabolisme
- Préparations métaboliques de Nutricia 31-124
- Aliments faibles en protéines 125
- Liquigen 138
- Monogen 136
- Duocal 140
- Polycal 142
- Complete Amino Acid Mix 144
- Essential Amino Acid Mix 146
- Phlexy-Vits 148

Acidémie isovalérique
- IVA Anamix Next 76
- XLeu Maxamum 78

Diète cétogène
- KetoCal 4:1 LQ – Vanille et non aromatisé 130
- KetoCal 4:1 en poudre 128
- Liquigen 138

Troubles d'oxydation des acides gras à chaîne longue
- Liquigen 138
- Monogen 136

Régimes alimentaires faibles en protéines
- Aliments faibles en protéines 125
- Duocal 140

Malabsorption
- Duocal 140
- Neocate DHA & ARA 10
- Neocate Nutra 12
- Neocate Junior 14
- Neocate Splash 16
- Liquigen 138
- Complete Amino Acid Mix 144

Leucinose
- Complex MSD Junior 66
- Complex MSD Essential 68
- Complex MSD Amino Acid Blend 70
- MSUD Maxamum 72
- MSUD Lophlex LQ 74

Régimes alimentaires modulaires
- Duocal 140
- Liquigen 138
- Polycal 142
- Complete Amino Acid Mix 144
- Essential Amino Acid Mix 146
- Phlexy-Vits 148

*** Liste partielle des produits**

Phénylcétonurie
Periflex Infant 32
PKU Periflex Junior Plus 34
Periflex LQ 38
Periflex Advance 36
PhenylAde40 Drink Mix 50
PhenylAde60 Drink Mix 52
PhenylAde MTE Amino Acid Blend 54
PhenylAde Essential Drink Mix 48
PhenylAde GMP Drink Mix 40
PhenylAde GMP MIX-IN 46
PhenylAde GMP READY 42
PhenylAde GMP ULTRA 44
PhenylAde PheBLOC LNAA 56
XPhe Maxamum 58
PKU Lophlex LQ 60
PKU Lophlex en poudre 62
Phlexy-10 Drink Mix 64

Acidémie propionique ou méthylmalonique
MMA/PA Anamix Next 96
XMTVI Maxamum 98

Insuffisance rénale
Aliments faibles en protéines 125
Duocal 140
Polycal 142

Syndrome de l'intestin court
Liquigen 138
Neocate DHA & ARA 10
Neocate Nutra 12
Neocate Junior 14
Neocate Splash 16
Complete Amino Acid Mix 144

Tyrosinémie
TYR Anamix Next 102
TYR Lophlex GMP MIX-IN 106
TYR Lophlex LQ 104
XPhe, XTyr Analog 100

Maladies du cycle de l'urée
UCD Anamix Junior 108
Essential Amino Acid Mix 146

Tobey
A reçu un diagnostic d'allergies alimentaires multiples

TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX ET ALLERGIES ALIMENTAIRES

Neocate[MD] DHA & ARA

Une préparation en poudre pour nourrissons à base d'acides aminés, complète sur le plan nutritionnel et contenant du fer, du DHA, de l'ARA et des nucléotides.

Principales caractéristiques :

- Hypoallergène
- Avec DHA, ARA et nucléotides
- Acides aminés libres à 100 %, non allergènes
- Complet sur le plan nutritionnel
- Déjà plus de 190 publications appuient l'utilisation de Neocate
- Casher pareve et halal
- Dilution standard = 0,67 kcal/ml
- Osmolalité (à 0,67 kcal/ml) : 340 mOsm/kg d'H_2O
- Eau libre (à 0,67 kcal/ml) : 90,3 %
- Distribution énergétique :
  Protéines 11,2 %
  Glucides 43,1 %
  Lipides (TCM 33 % / TCL 67 %) 45,7 %
- Déplacement : 0,7 ml/g

Indications :

- Allergie au lait de vache
- Allergies alimentaires multiples
- Troubles gastro-intestinaux et allergiques connexes :
  - Syndrome de l'intestin court (SIC)
  - Syndrome de l'entérocolite induite par les protéines alimentaires (SEIPA)
  - Œsophagite à éosinophiles (EE)
  - Malabsorption
  - Reflux gastro-œsophagien

Pour des détails sur la taille de la mesurette, les mesures domestiques et l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Pour obtenir des conseils sur la surveillance des micronutriments, veuillez consulter la page 29.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
127373	4 x 400 g	1 932

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 100 ml*
Énergie, kcal (kJ)	483 (2 020)	67 (279)
Équivalent en protéines, g	13,5	1,9
Glucides, g	52,0	7,2
Lipides, g	24,5	3,4
Acide linoléique, g	3,57	0,49
Acide α-linolénique, mg	419	58,1
Acide arachidonique, mg	69,3	9,6
Acide docosahexaénoïque, mg	69,3	9,6
Cendres, g	3,34	0,46
Vitamines		
Vitamine A, UI	1 352	187
Vitamine D_3, UI	352	48,6
Vitamine E, UI	6,8	0,94
Vitamine K, mg	0,0425	0,0059
Thiamine, mg	0,54	0,07
Riboflavine, mg	0,54	0,07
Vitamine B_6, mg	0,54	0,07
Vitamine B_{12}, mg	0,0013	0,0002
Niacine, mg	4,9	0,68
Acide folique, mg	0,0640	0,0088
Acide pantothénique, mg	2,9	0,40
Biotine, mg	0,0190	0,0026
Vitamine C, mg	51,6	7,1
Choline, mg	95,4	13,2
Inositol, mg	108	14,9

Minéraux	Pour 100 g	Pour 100 ml*
Calcium, mg	561	77,4
Phosphore, mg	397	54,8
Magnésium, mg	51,0	7,0
Fer, mg	7,3	1,0
Zinc, mg	5,3	0,73
Manganèse, mg	0,20	0,0276
Cuivre, mg	0,41	0,0566
Iode, mg	0,10	0,0138
Molybdène, mg	0,0113	0,0016
Chrome, mg	0,0106	0,0015
Sélénium, mg	0,0145	0,0020
Sodium, mg	189	26,1
Potassium, mg	525	72,5
Chlorure, mg	386	53,3
Nucléotides, mg	23,3	3,2

* Dilution standard = 0,67 kcal/ml

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales raffinées (huiles de noix de coco et/ou de palmiste modifiées, huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique, huile de tournesol, huile de canola), L-arginine L-aspartate, L-leucine, acétate de L-lysine, L-glutamine, L-proline, L-valine, glycine, L-isoleucine, L-thréonine, L-phénylalanine, L-tyrosine, L-sérine, L-histidine, L-alanine, L-cystine, L-tryptophane, L-méthionine, *huile de Mortierella alpina**, *huile de Crypthecodinium cohnii****, taurine, L-carnitine, uridine-5-monophosphate disodique, cytidine-5-monophosphate, inosine-5-monophosphate disodique, adénosine-5-monophosphate, guanosine-5-monophosphate disodique, phosphate dipotassique, phosphate de calcium dibasique, chlorure de sodium, citrate tripotassique, phosphate tricalcique, chlorure de magnésium, carbonate de calcium, citrate tricalcique, glycérophosphate de calcium, bitartrate de choline, L-aspartate de magnésium, inositol, acide L-ascorbique, sulfate de fer, sulfate de zinc, niacinamide, D-pantothénate de calcium, acétate de DL-alpha-tocophéryle, palmitate d'ascorbyle, sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, sulfate de manganèse, riboflavine, acétate de vitamine A, DL-alpha-tocophérol, iodure de potassium, tocophérols mixtes, acide folique, chlorure de chrome, phylloquinone, sélénite de sodium, molybdate de sodium, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine, esters d'acide citrique des mono- et diglycérides.

* Une source d'acide arachidonique (ARA)

** Une source d'acide docosahexaénoïque (DHA)

Neocate[MD] Nutra

Le premier et seul aliment semi-solide à base d'acides aminés pour les enfants et les nourrissons de plus de 6 mois ayant des besoins médicaux particuliers.

Principales caractéristiques :

- Consistance lisse et cuillérable
- Hypoallergène
- Fabriqué avec des acides aminés non allergènes à 100 %
- Sans protéine de lait et sans gluten
- Haute teneur en calcium, en vitamine D, en zinc et en fer
- Sans arôme artificiel, sans colorant et sans agent de conservation
- Distribution énergétique :

Protéines	7 %
Glucides	57 %
Lipides (TCM 4 % / TCL 96 %)	36 %

Remarque : Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation. N'est pas destiné à l'alimentation au biberon ou par sonde.

Indications :

- Allergie au lait de vache
- Allergies alimentaires multiples
- Troubles gastro-intestinaux et allergiques connexes :
  - Syndrome de l'intestin court (SIC)
  - Œsophagite à éosinophiles (EE)
  - Malabsorption
  - Reflux gastro-œsophagien

Pour des détails sur la taille de la mesurette, les mesures domestiques et l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
169224	4 x 400 g	1 888

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Par portion suggérée (37 g de poudre)
Énergie, kcal (kJ)	472 (1 978)	175 (733)
Équivalent en protéines, g	8,2	3,0
Glucides, g	67,4	24,9
Lipides, g	18,8	7,0
Acide linoléique, mg	3,2	1,2
Vitamines		
Vitamine A, UI	649	240
Vitamine D_3, UI	172	63,6
Vitamine E, UI	3,4	1,3
Vitamine C, mg	23,0	8,5
Thiamine, mg	0,250	0,093
Riboflavine, mg	0,250	0,093
Niacine, mg	1,1	0,40
Vitamine B_6, mg	0,250	0,093
Acide folique, mg	0,0275	0,0102
Vitamine B_{12}, mg	0,0006	0,0002
Acide pantothénique, mg	1,4	0,52
Vitamine K, mg	0,0185	0,0068
Biotine, mg	0,0091	0,0034
Choline, mg	45,0	16,7
Inositol, mg	49,0	18,1

Minéraux	Pour 100 g	Par portion suggérée (37 g de poudre)
Calcium, mg	668	247
Phosphore, mg	340	126
Magnésium, mg	21,0	7,8
Fer, mg	5,9	2,2
Zinc, mg	4,1	1,5
Manganèse, mg	0,310	0,115
Cuivre, mg	0,310	0,115
Iode, mg	0,414	0,0153
Molybdène, mg	0,0088	0,0033
Chrome, mg	0,0010	0,0004
Sélénium, mg	0,0113	0,0042
Sodium, mg	38,0	14,1
Potassium, mg	<20,0	<10,0
Chlorure, mg	44,0	16,3

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, amidon de riz, huiles végétales raffinées (huile de noix de coco non hydrogénée, huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique, huile de canola, huile de tournesol), sucre, phosphate tricalcique, L-arginine L-aspartate, L-leucine, acétate de L-lysine, esters d'acide citrique des mono- et diglycérides, L-glutamine, L-proline, L-valine, glycine, L-isoleucine, L-thréonine, L-phénylalanine, L-tyrosine, L-sérine, L-histidine, L-alanine, L-cystine, L-tryptophane, L-méthionine, bitartrate de choline, L-aspartate de magnésium, acétate de magnésium, M-inositol, acide L-ascorbique, sulfate de fer, taurine, sulfate de zinc, L-carnitine, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, niacinamide, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acétate de vitamine A, iodure de potassium, chlorure de chrome, acide folique, sélénite de sodium, molybdate de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.

Neocate[MD] Junior

Une préparation en poudre à base d'acides aminés, complète sur le plan nutritionnel pour les personnes de plus de 1 an ayant des besoins médicaux particuliers.

Principales caractéristiques :

- Hypoallergène
- Offert avec des fibres solubles en quatre variétés : non aromatisé, vanille, fraise et fruits tropicaux
- Offert sans fibres en version non aromatisée seulement
- Acides aminés libres à 100 %, non allergènes
- Complet sur le plan nutritionnel

	Non aromatisé (sans fibres)	Non aromatisé (avec fibres)	Fraise (avec fibres)	Vanille (avec fibres)	Fruits tropicaux (avec fibres)
Osmolalité (mOsm/kg d'H₂O)†	600	620	610	620	670
Eau libre†	85,6 %	84,3 %	85,2 %	85,2 %	84,8 %
Déplacement, ml/g	0,69	0,74	0,70	0,70	0,70
Distribution énergétique :					
Protéines	12,4 %	12,5 %	12,5 %	12,5 %	12,6 %
Glucides	42,6 %	43,6 %	43,6 %	43,6 %	45,5 %
Lipides (TCM 35 % / TCL 65 %)	45 %	43,9 %	43,9 %	43,9 %	41,9 %

† Dilution standard = 1 kcal/ml

Indications :

- Allergie au lait de vache
- Allergies alimentaires multiples
- Troubles gastro-intestinaux et allergiques connexes :
  - Syndrome de l'intestin court (SIC)
  - Syndrome de l'entérocolite induite par les protéines alimentaires (SEIPA)
  - Œsophagite à éosinophiles (EE)
  - Malabsorption
  - Reflux gastro-œsophagien

Fournit au moins 100 % des ANREF[§] en protéines + 25 vitamines et minéraux essentiels :

1 à 3 ans	930 kcal
4 à 8 ans	1 370 kcal
9 à 13 ans	1 565 kcal
14 à 18 ans	2 550 kcal

[§] Voir la section Ressources *pour les ANREF*

Pour des détails sur la taille de la mesurette, les mesures domestiques et l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Pour obtenir des conseils sur la surveillance des micronutriments, veuillez consulter la page 29.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
129778 – Non aromatisé	4 x 400 g	1 916
133051 – Non aromatisé (avec fibres)	4 x 400 g	1 888
133050 – Vanille (avec fibres)	4 x 400 g	1 888
169203 – Fraise (avec fibres)	4 x 400 g	1 888
134057 – Fruits tropicaux (avec fibres)	4 x 400 g	1 804

Information nutritionnelle :

	Non aromatisé (sans fibres)		Non aromatisé, vanille, fraise (avec fibres)		Fruits tropicaux (avec fibres)	
Nutriments	**Pour 100 g**	**Pour 100 ml***	**Pour 100 g**	**Pour 100 ml***	**Pour 100 g**	**Pour 100 ml***
Énergie, kcal (kJ)	479 (2 006)	100 (419)	472 (1 976)	100 (419)	451 (1 892)	100 (419)
Équivalent en protéines, g	14,8	3,1	14,8	3,1	14,2	3,1
Glucides, g	51,0	10,7	51,4†	10,9	51,4	11,4
Fibres, g	0	0	1,9	0,40	1,9	0,42
Lipides, g	24,0	5,0	23,0	4,9	21,0	4,7
Acide linoléique, g	3,9	0,82	3,8	0,79	3,4	0,76
Vitamines						
Vitamine A, UI	956	200	956	202	956	212
Vitamine D_3, UI	380	79,4	380	80,5	380	84,3
Vitamine E, UI	10,0	2,1	10,0	2,1	10,0	2,2
Vitamine C, mg	44,6	9,3	44,6	9,4	44,6	9,9
Thiamine, mg	0,48	0,10	0,48	0,10	0,48	0,11
Riboflavine, mg	0,96	0,20	0,96	0,20	0,96	0,21
Niacine, mg	4,3	0,90	4,3	0,91	4,3	0,95
Vitamine B_6, mg	0,48	0,10	0,48	0,10	0,48	0,11
Acide folique, mg	0,1430	0,0299	0,1430	0,0303	0,1430	0,0317
Vitamine B_{12}, mg	0,0019	0,0004	0,0019	0,0004	0,0019	0,0004
Acide pantothénique, mg	1,9	0,40	1,9	0,40	1,9	0,42
Vitamine K, mg	0,0192	0,0040	0,0192	0,0041	0,0192	0,0043
Biotine, mg	0,0144	0,0030	0,0144	0,0031	0,0144	0,0032
Choline, mg	143	29,9	143	30,3	143	31,7
Inositol, mg	105	21,9	105	22,2	105	23,3
Minéraux						
Calcium, mg	565	118	565	120	565	125
Phosphore, mg	382	79,8	382	80,9	382	84,7
Magnésium, mg	76,5	16,0	76,5	16,2	76,5	17,0
Fer, mg	7,4	1,5	7,4	1,6	7,4	1,6
Zinc, mg	4,7	0,98	4,7	1,0	4,7	1,0
Iode, mg	0,0852	0,0178	0,0852	0,0181	0,0852	0,0189
Manganèse, mg	0,620	0,130	0,620	0,131	0,620	0,137
Cuivre, mg	0,530	0,111	0,530	0,112	0,530	0,118
Molybdène, mg	0,0215	0,0045	0,0215	0,0046	0,0215	0,0048
Chrome, mg	0,0180	0,0038	0,0180	0,0038	0,0180	0,0040
Sélénium, mg	0,0192	0,0040	0,0192	0,0041	0,0192	0,0043
Sodium, mg	239	50,0	239	50,6	239	53,0
Potassium, mg	653	136	653	138	653	145
Chlorure, mg	364	76,1	364	77,1	364	80,7

* Dilution standard = 1 kcal/ml
† Pour la version à la fraise seulement 51,5 g

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales raffinées (huiles de palmiste et/ou de noix de coco modifiées [triglycérides à chaîne moyenne], huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique, huile de tournesol, huile de canola), L-sérine, L-glutamine, glycine, L-alanine, L-leucine, acétate de L-lysine, L-thréonine, L-tyrosine, L-valine, maltodextrine, L-isoleucine, L-proline, L-cystine, L-histidine, L-phénylalanine, L-méthionine, L-arginine, L-tryptophane, taurine, L-carnitine, phosphate dipotassique, esters d'acide citrique des mono- et diglycérides, phosphate tricalcique, citrate tripotassique, citrate trisodique, carbonate de calcium, bitartrate de choline, hydrogénophosphate de magnésium, chlorure de sodium, chlorure de calcium, chlorure de magnésium, inositol, acide ascorbique, lécithine de tournesol, sulfate de fer, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, palmitate d'ascorbyle, niacinamide, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, riboflavine, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, acétate de vitamine A, acide folique, iodure de potassium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.

La version **non aromatisée** avec fibres contient également du fructooligosaccharide (FOS) et de l'inuline de racine de chicorée.

La version aromatisée à la **vanille** contient également du fructooligosaccharide (FOS), de l'inuline de racine de chicorée, un arôme artificiel et du sucralose[‡].

La version aromatisée à la **fraise** contient également du fructooligosaccharide (FOS), de l'inuline de racine de chicorée, un arôme artificiel, de l'acide citrique et du sucralose[‡].

La version aromatisée aux **fruits tropicaux** contient également du fructooligosaccharide (FOS), de l'inuline de racine de chicorée, un arôme artificiel, de l'acide citrique et de l'acésulfame de potassium[¥].

‡ Contient du sucralose à raison de 8,5 mg/100 ml à la dilution standard

¥ Contient de l'acésulfame de potassium à raison de 6,7 mg/100 ml à la dilution standard

Veuillez consulter l'étiquette des produits individuels pour connaître l'ordre exact des ingrédients.

Neocate[MD] Splash

La première et seule préparation à base d'acides aminés, complète sur le plan nutritionnel, hypoallergène et prête à l'emploi pour les personnes de plus de 1 an ayant des besoins médicaux particuliers.

Principales caractéristiques :

- Hypoallergène
- Acides aminés libres à 100 %, non allergènes
- Complet sur le plan nutritionnel
- Boîtes à boire prêtes à l'emploi pratiques de 237 ml
- Sans gluten ni caséine
- 4 arômes savoureux : orange-ananas, raisin, fruits tropicaux et non aromatisé
- Densité énergétique = 1 kcal/ml
- Distribution énergétique :

Protéines	12 %
Glucides	42 %
Lipides (TCM 35 % / TCL 65 %)	46 %

- Osmolalité (mOsm/kg d'H_2O) :
  670 (non aromatisé)
  740 (raisin)
  790 (orange-ananas, fruits tropicaux)
- Eau libre : 84,6 %

Indications :

- Allergie au lait de vache
- Allergies alimentaires multiples
- Troubles gastro-intestinaux et allergiques connexes :
  - Syndrome de l'intestin court (SIC)
  - Syndrome de l'entérocolite induite par les protéines alimentaires (SEIPA)
  - Œsophagite à éosinophiles (EE)
  - Malabsorption
  - Reflux gastro-œsophagien

Fournit au moins 100 % des ANREF[§] en protéines + 25 vitamines et minéraux essentiels :

1 à 3 ans	930 ml
4 à 8 ans	1 370 ml
9 à 13 ans	1 565 ml
14 à 18 ans	2 550 ml

[§] Voir la section Ressources *pour les ANREF*

Pour des détails sur l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
111394 – Non aromatisé	27 x 237 ml (8 oz liq.)	237
122436 – Orange-ananas	27 x 237 ml (8 oz liq.)	237
122435 – Raisin	27 x 237 ml (8 oz liq.)	237
122437 – Fruits tropicaux	27 x 237 ml (8 oz liq.)	237

Information nutritionnelle :

Nutriments	Par boîte à boire (237 ml)	Pour 100 ml
Énergie, kcal (kJ)	237 (991)	100 (418)
Équivalent en protéines, g	7,1	3,0
Glucides, g	24,9	10,5
Lipides, g	12,1	5,1
Acide linoléique, g (non aromatisé)	0,77 (0,69)	0,33 (0,29)
Vitamines		
Vitamine A, UI	474	200
Vitamine D_3, UI	190	80,0
Vitamine E, UI	5,0	2,1
Vitamine C, mg	22	9,3
Thiamine, mg	0,24	0,10
Riboflavine, mg	0,47	0,20
Niacine, mg	2,1	0,90
Vitamine B_6, mg	0,24	0,10
Acide folique, mg	0,0709	0,0299
Vitamine B_{12}, mg	0,0009	0,0004
Acide pantothénique, mg	0,948	0,400
Vitamine K, mg	0,0095	0,0040
Biotine, mg	0,0071	0,0030
Choline, mg	70,9	29,9
Inositol, mg	52,1	22,0

Minéraux	Par boîte à boire (237 ml)	Pour 100 ml
Calcium, mg	280	118
Phosphore, mg	190	80,0
Magnésium, mg	37,9	16,0
Fer, mg	3,6	1,5
Zinc, mg	2,3	0,98
Iode, mg	0,0422	0,0178
Manganèse, mg	0,308	0,130
Cuivre, mg	0,237	0,100
Molybdène, mg	0,0107	0,0045
Chrome, mg	0,0090	0,0038
Sélénium, mg	0,0095	0,0040
Sodium, mg	119	50,0
Potassium, mg	325	137
Chlorure, mg	180	76,0

Ingrédients :

Eau, maltodextrine, sucre, huiles végétales raffinées (huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique, huile de palmiste et/ou de noix de coco modifiées [triglycérides à chaîne moyenne], huile de canola), L-arginine, L-lysine L-aspartate, L-leucine, L-phénylalanine, L-proline, L-valine, glycine, L-isoleucine, N-acétyl-L-méthionine, L-thréonine, L-histidine, L-sérine, L-alanine, L-tryptophane, L-tyrosine, L-cystine, taurine, L-carnitine, (pour les versions aromatisées à l'orange-ananas, au raisin et aux fruits tropicaux uniquement : arômes artificiels), glycérophosphate de calcium, acide malique, cellulose microcristalline, citrate tripotassique, esters d'acide diacétyl-tartrique de mono- et diglycérides, mono- et diglycérides, citrate trisodique, chlorure de potassium, acétate de magnésium, bitartrate de choline, chlorure de calcium, gomme de cellulose, acide L-ascorbique, M-inositol, (pour les versions aromatisées à l'orange-ananas et au raisin uniquement : sucralose*), (pour la version aromatisée aux fruits tropicaux uniquement : acésulfame de potassium**), (pour les versions aromatisées à l'orange-ananas, au raisin et aux fruits tropicaux uniquement : lactate ferreux), (pour la version non aromatisée uniquement : sulfate de fer), sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, riboflavine, chlorure de chrome, chlorhydrate de chlorure de thiamine, palmitate de vitamine A, chlorhydrate de pyridoxine, acide folique, iodure de potassium, molybdate de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.

* La version aromatisée à l'**orange-ananas** contient du sucralose à raison de 23,6 mg/237 ml.

* La version aromatisée au **raisin** contient du sucralose à raison de 23,9 mg/237 ml.

** La version aromatisée aux **fruits tropicaux** contient de l'acésulfame de potassium à raison de 23,6 mg/237 ml.

Veuillez consulter la boîte des produits individuels pour connaître l'étiquetage exact des ingrédients.

PRÉPARATION ET UTILISATION :

- L'apport recommandé doit être déterminé par un professionnel de la santé en fonction de l'âge, du poids et de l'état de santé du patient. Utiliser uniquement sous surveillance médicale.
- Toutes les préparations peuvent être consommées par voie orale ou par sonde. N'est pas destiné à un usage parentéral. (Neocate Nutra est un aliment semi-solide et n'est pas destiné à l'alimentation au biberon ou par sonde.)
- Ne pas faire bouillir la préparation ni préparer ou chauffer le produit au four à micro-ondes.
- Si elles sont consommées par voie orale, les préparations pour personnes de plus de 1 an sont meilleures servies froides.
- Une fois la préparation reconstituée ou la boîte à boire ouverte, le produit doit être conservé au réfrigérateur à une température de 2 à 4 °C (35 à 40 °F) pendant un maximum de **24 heures** après la reconstitution (l'heure d'ouverture pour les liquides). Agiter ou remuer la préparation immédiatement avant utilisation.
- **Durée de l'alimentation par sonde :** Selon la recommandation de Nutricia, la préparation peut être conservée en toute sécurité à la température ambiante pendant un maximum de **4 heures**, après quoi la préparation inutilisée doit être jetée.
- Jeter la préparation restante dans le biberon ou la tasse **1 heure** après le début de l'alimentation.
- Toutes les mesurettes fournies doivent être rases et la poudre, non tassée. Utiliser une balance pour obtenir les résultats les plus précis. Les mesures domestiques ne sont pas recommandées pour mesurer les produits de Nutricia en poudre.

Conservation :

Boîtes : Conserver les boîtes non ouvertes à la température ambiante, à l'abri des températures extrêmes. Une fois ouverte, refermer la boîte avec le couvercle fourni et la conserver dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur). Utiliser au cours du mois qui suit.

Paquets : Conserver les paquets non ouverts à la température ambiante. Une fois ouverte, refermer la boîte et la conserver dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur); utiliser au cours de la semaine qui suit.

Liquides : Conserver les contenants non ouverts dans un endroit frais et sec. Une fois ouvert, conserver le contenant au réfrigérateur pendant un maximum de 24 heures. Ne pas congeler.

PRÉPARATION ET UTILISATION :

Consulter les étiquettes du produit pour les instructions de préparation détaillées.

Neocate DHA & ARA

1. Se laver les mains avec de l'eau et du savon.
2. Nettoyer et désinfecter la surface de travail.
3. Pour stériliser les biberons, les tétines, les capuchons et les autres pièces, les placer dans une casserole remplie d'eau et porter l'eau à ébullition. Laisser bouillir à gros bouillons pendant 2 minutes, puis laisser refroidir. Couvrir jusqu'au moment d'utiliser.
4. Porter de l'eau fraîche à ébullition, laisser bouillir à gros bouillons pendant 2 minutes, puis laisser refroidir. Si le nourrisson est né à terme et en bonne santé, laisser refroidir l'eau jusqu'à la température ambiante. Si le nourrisson était de faible poids à la naissance ou s'il est immunodéprimé, consulter un professionnel de la santé.
5. Ajouter les quantités appropriées d'eau et de poudre dans le(s) biberon(s). Consulter l'étiquette du produit pour obtenir des instructions spécifiques et utiliser la mesurette fournie.
6. Mettre le capuchon sur le(s) biberon(s). Bien agiter pendant 15 à 20 secondes jusqu'à ce que la poudre soit dissoute.

Neocate Junior

1. Mesurer la quantité requise d'eau tiède ou froide et la verser dans un contenant.
2. Ajouter la quantité prescrite de Neocate Junior à l'eau.
3. Couvrir et agiter le contenant jusqu'à dissolution complète de la poudre.

Neocate Nutra

La portion suggérée est de 8 mesurettes (37 g) de poudre dans 60 ml afin d'obtenir une consistance cuillérable. Il est possible de préparer une plus petite portion en ajoutant 30 ml d'eau à 4 mesurettes de poudre (18,5 g). Pour les nourrissons : Consulter l'équipe de soins pédiatriques quant à la nécessité d'utiliser de l'eau bouillie refroidie pour faire le mélange.

1. Se laver soigneusement les mains et nettoyer la surface de préparation.
2. Ajouter le nombre recommandé de mesurettes de Neocate Nutra dans un bol propre.
3. Ajouter graduellement la quantité d'eau requise tout en mélangeant à l'aide d'une cuillère propre. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une consistance épaisse. Pour modifier la consistance, ajouter plus ou moins d'eau au besoin.

Neocate Nutra doit être préparé immédiatement avant de servir. Le produit s'épaissira davantage s'il est réfrigéré. Neocate Nutra peut être ajouté à des mets cuits. Ne pas ajouter aux aliments très chauds. Ne pas réchauffer le produit préparé. Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation. **N'est pas destiné à l'alimentation au biberon ou par sonde**.

Neocate Splash

Bien agiter avant d'utiliser.

Mesures domestiques

Les mesures domestiques varient selon la version de chaque préparation. Communiquer avec votre représentant Nutricia ou notre service à la clientèle pour déterminer quelle version de la préparation s'applique à votre cas et connaître les mesures domestiques à utiliser pour celle-ci.

Calcul des volumes à administrer

Neocate DHA & ARA

Volume/ jour	0,67 kcal/ml (n^bre boîtes/mois)	0,73 kcal/ml (n^bre boîtes/mois)	0,80 kcal/ml (n^bre boîtes/mois)	0,87 kcal/ml (n^bre boîtes/mois)	0,93 kcal/ml (n^bre boîtes/mois)	1 kcal/ml (n^bre boîtes/mois)
600 ml	7	7	8	9	9	10
720 ml	8	9	9	10	11	12
840 ml	9	10	11	12	13	14
960 ml	10	11	12	13	14	15
1 080 ml	12	13	14	15	16	17
1,2 L	13	14	15	17	18	19
Neocate DHA & ARA Volume total/boîte	2 895	2 640	2 415	2 235	2 070	1 935

Neocate Nutra

Portions/jour	Taille de portion suggérée – 8 mesurettes Nutra (175 kcal)		Demi-portion – 4 mesurettes Nutra (88 kcal)	
	10 portions/boîte		21 portions/boîte	
	(n^bre de boîtes/mois)	(n^bre de caisses/mois)	(n^bre de boîtes/mois)	(n^bre de caisses/mois)
1 portion	3	1	2	1
2 portions	6	2	3	1
3 portions	9	3	5	2
4 portions	12	3	6	2

Volume/jour

	Neocate Junior non aromatisé (sans fibres)		Neocate Junior, tous les autres arômes		Neocate Splash	
	1 kcal/ml		1 kcal/ml		1 kcal/ml	
	(n^bre boîtes/mois)	(n^bre caisses/mois)	(n^bre boîtes/mois)	(n^bre caisses/mois)	(n^bre boîtes à boire/mois)	(n^bre caisses/mois)
590 ml	10	3	10	3	76	3
710 ml	12	3	12	3	92	4
830 ml	13	4	14	4	107	4
945 ml	15	4	16	4	122	5
1 litre	16	4	17	5	137	6
1,2 litre	19	5	20	5	152	6

Le nombre de caisses par mois (30 jours) est arrondi au nombre entier le plus proche.

Neocate[MD] DHA & ARA

Tableau de dilution des nutriments (0,67 à 0,83 kcal/ml)

Nutriments Pour 100 ml Dilution :	0,67 kcal/ml	0,73 kcal/ml	0,80 kcal/ml	0,87 kcal/ml	0,93 kcal/ml	1 kcal/ml
Énergie, kcal	66,7	73,3	80,0	86,7	93,3	100
Énergie, kJ	279	307	335	362	390	418
Équivalent en protéines, g	1,9	2,0	2,2	2,4	2,6	2,8
Glucides, g	7,2	7,9	8,6	9,3	10,0	10,8
Lipides, g	3,4	3,7	4,1	4,4	4,7	5,1
Acide linoléique, g	0,49	0,54	0,59	0,64	0,69	0,74
ARA, mg	9,6	10,5	11,5	12,4	13,4	14,3
DHA, mg	9,6	10,5	11,5	12,4	13,4	14,3
Cendres, g	0,46	0,51	0,55	0,60	0,65	0,69
Vitamines						
Vitamine A, UI	187	205	224	243	261	280
Vitamine D_3, UI	48,6	53,4	58,3	63,2	68,0	72,9
Vitamine E, UI	0,94	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Vitamine K, mg	0,0059	0,0065	0,0070	0,0076	0,0082	0,0088
Thiamine, mg	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11
Riboflavine, mg	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11
Vitamine B_6, mg	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10	0,11
Vitamine B_{12}, mg	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0003
Niacine, mg	0,68	0,74	0,81	0,88	0,95	1,0
Acide folique, mg	0,0088	0,0097	0,0106	0,0115	0,0124	0,0133
Acide pantothénique, mg	0,40	0,44	0,48	0,52	0,56	0,60
Biotine, mg	0,0026	0,0029	0,0031	0,0034	0,0037	0,0039
Vitamine C, mg	7,1	7,8	8,5	9,3	10,0	10,7
Choline, mg	13,2	14,5	15,8	17,1	18,4	19,8
Inositol, mg	14,9	16,4	17,9	19,4	20,9	22,4
Minéraux						
Calcium, mg	77,4	85,2	92,9	101	108	116
Phosphore, mg	54,8	60,3	65,8	71,2	76,7	82,2
Magnésium, mg	7,0	7,7	8,4	9,2	9,9	10,6
Fer, mg	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Zinc, mg	0,73	0,80	0,88	0,95	1,0	1,1
Manganèse, mg	0,028	0,030	0,033	0,036	0,039	0,041
Cuivre, mg	0,057	0,062	0,068	0,074	0,079	0,085
Iode, mg	0,014	0,015	0,017	0,018	0,019	0,021
Molybdène, mg	0,0016	0,0017	0,0019	0,0020	0,0022	0,0023
Chrome, mg	0,0015	0,0016	0,0018	0,0019	0,0020	0,0022
Sélénium, mg	0,0020	0,0022	0,0024	0,0026	0,0028	0,0030
Sodium, mg	26,1	28,7	31,3	33,9	36,5	39,1
Potassium, mg	72,5	79,7	87,0	94,2	101	109
Chlorure, mg	53,3	58,6	63,9	69,3	74,6	79,9

Neocate[MD] DHA & ARA

Tableaux de dilution

0,67 kcal/ml (dilution standard)

Volume d'eau		Quantité de poudre Neocate†		Volume final approximatif*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
120	4	4	18,4	135	4,4
150	5	5	23,0	165	5,5
240	8	8	36,8	270	9,0
330	11	11	50,6	360	12,2
450	15	15	69,0	495	16,6
540	18	18	82,8	600	19,9
660	22	22	101,2	720	24,4
750	25	25	115	825	27,7
870	29	29	133	960	32,1
930	31	31	143	1 035	34,3

0,73 kcal/ml

Volume d'eau		Quantité de poudre Neocate†		Volume final approximatif*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
135	4,5	5	23,0	150	5,0
165	5,5	6	27,6	180	6,1
240	8	9	41,4	270	9,0
330	11	12	55,2	375	12,3
435	14,5	16	73,6	480	16,2
540	18	20	92,0	600	20,1
660	22	24	110	735	24,6
765	25,5	28	129	855	28,5
870	29	32	147	975	32,4
975	32,5	36	166	1 095	36,4

0,80 kcal/ml

Volume d'eau		Quantité de poudre Neocate†		Volume final approximatif*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
75	2,5	3	13,8	90	2,8
150	5	6	27,6	165	5,6
195	6,5	8	36,8	225	7,4
315	10,5	13	59,8	360	11,9
420	14	17	78,2	480	15,8
540	18	22	101	615	20,4
645	21,5	26	120	735	24,3
735	24,5	30	138	825	27,7
855	28,5	35	161	975	32,3
960	32	39	179	1 080	36,2

0,87 kcal/ml

Volume d'eau		Quantité de poudre Neocate†		Volume final approximatif*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
90	3	4	18,4	105	3,4
135	4,5	6	27,6	150	5,1
225	7,5	10	46,0	255	8,6
315	10,5	14	64,4	360	12,0
420	14	19	87,4	480	16,0
540	18	24	110	615	20,6
630	21	28	129	720	24,0
735	24,5	33	152	840	28,0
825	27,5	37	170	945	31,5
900	30	40	184	1 035	34,3

0,93 kcal/ml

Volume d'eau		Quantité de poudre Neocate†		Volume final approximatif*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
165	5,5	8	36,8	195	6,4
225	7,5	11	50,6	255	8,7
270	9	13	59,8	315	10,4
330	11	16	73,6	375	12,7
435	14,5	21	96,6	510	16,8
510	17	25	115	585	19,7
615	20,5	30	138	705	23,7
720	24	35	161	840	27,8
840	28	41	189	975	32,4
945	31,5	46	212	1 095	36,4

1 kcal/ml

Volume d'eau		Quantité de poudre Neocate†		Volume final approximatif*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
75	2,5	4	18,4	90	2,9
150	5	8	36,8	180	5,9
210	7	11	50,6	240	8,2
300	10	16	73,6	345	11,7
420	14	22	101	495	16,4
510	17	27	124	600	19,9
615	20,5	32	147	720	23,9
720	24	38	175	840	28,1
840	28	44	202	975	32,7
930	31	49	225	1 095	36,3

* Dans ce tableau, 1 oz liq. = 30 ml. Les volumes d'eau fournis sont exacts, mais le volume final de la préparation peut légèrement varier.

† Les mesurettes doivent être rases et la poudre, non tassée. Bien que les mesurettes que Nutricia fournit soient validées pour être utilisées avec les préparations de Nutricia, la pesée de la poudre à l'aide d'une balance procure la plus grande précision. 1 mesurette rase de poudre non tassée donne 4,6 grammes de poudre et fournit 22,22 kcal. 1 gramme fournit 4,83 kcal et déplace environ 0,70 ml d'eau.

Neocate[MD] Junior, non aromatisé

Tableaux de dilution

0,67 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
240	8	5	36,5	265	8,8
330	11	7	51,1	365	12,2
480	16	10	73,0	530	17,7
660	22	14	102	730	24,4
900	30	19	139	995	33,2

1 kcal/ml (dilution standard)

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
120	4	4	29,2	140	4,7
210	7	7	51,1	245	8,2
300	10	10	73,0	350	11,7
630	21	21	153	735	24,5
840	28	28	204	980	32,7

0,73 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
210	7	5	36,5	235	7,8
300	10	7	51,1	335	11,2
420	14	10	73,0	470	15,7
630	21	15	110	705	23,5
900	30	21	153	1 005	33,5

1,2 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
120	4	5	36,5	145	4,8
195	6,5	8	58,4	235	7,8
315	10,5	13	94,9	380	12,7
600	20	25	183	725	24,2
780	26	32	234	940	31,4

0,80 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
195	6,5	5	36,5	220	7,3
270	9	7	51,1	305	10,2
420	14	11	80,3	475	15,8
660	22	17	124	745	24,9
840	28	22	161	950	31,7

1,33 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
105	3,5	5	36,5	130	4,3
210	7	10	73,0	260	8,7
360	12	17	124	445	14,9
570	19	27	197	705	23,5
780	26	37	270	965	32,2

0,87 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
135	4,5	4	29,2	155	5,2
240	8	7	51,1	275	9,2
300	10	9	65,7	345	11,5
600	20	18	131	690	23,0
840	28	25	183	965	32,2

1,5 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
165	5,5	9	65,7	210	7,0
255	8,5	14	102	325	10,9
330	11	18	131	420	14,0
570	19	31	226	725	24,2
750	25	41	299	955	31,9

* Dans ce tableau, 1 oz liq. = 30 ml. Les volumes d'eau fournis sont exacts, mais le volume final de la préparation peut légèrement varier.
† Les mesurettes doivent être rases et la poudre, non tassée. Bien que les mesurettes que Nutricia fournit soient validées pour être utilisées avec les préparations de Nutricia, la pesée de la poudre à l'aide d'une balance procure la plus grande précision. 1 mesurette rase de poudre non tassée donne 7,3 grammes de poudre et fournit 35,0 kcal. 1 gramme fournit 4,79 kcal et déplace environ 0,69 ml d'eau. Neocate Junior est destiné aux personnes de 1 an et plus et doit être utilisé sous surveillance médicale.

Neocate[MD] Junior avec fibres, non aromatisé

Tableaux de dilution

0,67 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate‡		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
195	6,5	4	30,8	220	7,3
240	8	5	38,5	270	9,0
390	13	8	61,6	435	14,5
630	21	13	100	705	23,5
870	29	18	139	975	32,4

1 kcal/ml (dilution standard)

Volume d'eau*		Poudre Neocate‡		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
120	4	4	30,8	145	4,7
210	7	7	53,9	250	8,3
300	10	10	77,0	355	11,9
630	21	21	162	750	24,9
840	28	27	208	995	33,1

0,73 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate‡		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
345	11,5	8	61,6	390	13,0
480	16	11	84,7	545	18,1
570	19	13	100	645	21,5
690	23	16	123	780	26,0
870	29	20	154	985	32,8

1,2 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate‡		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
195	6,5	8	61,6	240	8,0
270	9	11	84,7	335	11,1
390	13	16	123	480	16,0
570	19	23	177	700	23,4
780	26	32	246	960	32,1

0,80 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate‡		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
120	4	3	23,1	135	4,6
240	8	6	46,2	275	9,1
315	10,5	8	61,6	360	12,0
630	21	16	123	720	24,0
840	28	21	162	960	32,0

1,33 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate‡		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
150	5	7	53,9	190	6,3
300	10	14	108	380	12,7
450	15	21	162	570	19,0
600	20	28	216	760	25,3
750	25	35	270	950	31,6

0,90 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate‡		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
105	3,5	3	23,1	120	4,1
210	7	6	46,2	245	8,1
315	10,5	9	69,3	365	12,2
630	21	18	139	735	24,4
840	28	24	185	975	32,6

1,5 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate‡		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
240	8	13	100	315	10,5
315	10,5	17	131	410	13,7
390	13	21	162	510	17,0
570	19	31	239	745	24,9
720	24	39	300	940	31,4

* Dans ce tableau, 1 oz liq. = 30 ml. Les volumes d'eau fournis sont exacts, mais le volume final de la préparation peut légèrement varier.
‡ Les mesurettes doivent être rases et la poudre, non tassée. Bien que les mesurettes que Nutricia fournit soient validées pour être utilisées avec les préparations de Nutricia, la pesée de la poudre à l'aide d'une balance procure la plus grande précision. 1 mesurette rase de poudre non tassée donne 7,7 grammes de poudre et fournit 36,3 kcal. 1 gramme fournit 4,72 kcal et déplace environ 0,74 ml d'eau. Neocate Junior est destiné aux personnes de 1 an et plus et doit être utilisé sous surveillance médicale.

Neocate[MD] Splash

Tableaux de concentration – ajouter Neocate Junior, non aromatisé

1,17 kcal/ml

Volume de Neocate Splash*		Poudre Neocate Junior†		Volume final approx.*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
150	5	1	7,3	155	5,2
330	11	2	14,6	340	11,5
474	2 boîtes à boire	3	21,9	489	16,5
630	21	4	29,2	650	22,0
948	4 boîtes à boire	6	43,8	978	33,1

1,33 kcal/ml

Volume de Neocate Splash*		Poudre Neocate Junior†		Volume final approx.*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
165	5,5	2	14,6	175	5,9
237	1 boîte à boire	3	21,9	252	8,5
474	2 boîtes à boire	6	43,8	504	17,1
711	3 boîtes à boire	9	65,7	756	25,6
948	4 boîtes à boire	12	87,6	1 008	34,1

1,5 kcal/ml

Volume de Neocate Splash*		Poudre Neocate Junior†		Volume final approx.*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
105	3,5	2	14,6	115	3,9
210	7	4	29,2	230	7,8
474	2 boîtes à boire	9	65,7	519	17,6
570	19	11	80,3	625	21,2
948	4 boîtes à boire	18	131	1 039	35,1

Tableaux de dilution – ajouter de l'eau

0,67 kcal/ml

Neocate Splash	Volume d'eau*		Volume final approx.*	
Boîtes à boire	ml	oz liq.	ml	oz liq.
1	120	4	357	12
2	240	8	714	24
3	330	12	1 041	36
4	450	15	1 398	47
5	570	19	1 755	59

0,73 kcal/ml

Neocate Splash	Volume d'eau*		Volume final approx.*	
Boîtes à boire	ml	oz liq.	ml	oz liq.
2	165	5,5	639	21,5
3	240	8,5	951	32,5
4	330	11	1 278	43
5	405	14	1 590	54
6	480	17	1 902	65

0,80 kcal/ml

Neocate Splash	Volume d'eau*		Volume final approx.*	
Boîtes à boire	ml	oz liq.	ml	oz liq.
1	60	2	297	10
2	120	4	594	20
3	180	6	891	30
4	210	7	1 158	39
5	270	9	1 455	49

0,90 kcal/ml

Neocate Splash	Volume d'eau*		Volume final approx.*	
Boîtes à boire	ml	oz liq.	ml	oz liq.
2	45	1,5	519	17,5
3	75	2,5	786	26,5
4	90	3	1 038	35
5	120	4	1 305	44
6	150	5	1 572	53

* Dans ce tableau, 1 oz liq. = ~29,6 ml. 1 boîte à boire = 8 oz liq. = 237 ml et une dilution standard est de 30 kcal/oz liq, ou 1 kcal/ml. Dans les recettes qui ne nécessitent pas un nombre pair de boîtes à boire de Neocate Splash et celles qui indiquent d'ajouter de l'eau, les volumes en ml sont arrondis aux 15 ml le plus près.
† Nutricia North America recommande d'utiliser une balance pour peser la poudre afin d'obtenir les mesures les plus précises. Les dilutions sont plus précises lorsque la poudre est pesée plutôt que mesurée avec les mesurettes. Les mesurettes doivent être rases et la poudre, non tassée. 1 mesurette rase de poudre non tassée donne 7,3 grammes de poudre et fournit 35,0 kcal. 1 gramme fournit 4,79 kcal et déplace environ 0,69 ml d'eau. Neocate Junior et Neocate Splash sont destinés aux personnes de 1 an et plus et doivent être utilisés sous surveillance médicale.

Neocate[MD] Junior avec fibres, vanille et fraise

0,67 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
330	11	7	51,1	365	12,2
420	14	9	65,7	465	15,5
510	17	11	80,3	565	18,9
660	22	14	102	730	24,4
900	30	19	139	995	33,2

0,73 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
165	5,5	4	29,2	185	6,2
255	8,5	6	43,8	285	9,5
420	14	10	73	470	15,7
660	22	16	117	740	24,7
870	29	21	153	975	32,6

0,80 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
150	5	4	29,2	170	5,7
225	7,5	6	43,8	255	8,5
300	10	8	58,4	340	11,4
600	20	16	117	680	22,7
840	28	22	161	950	31,7

0,90 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
165	5,5	5	36,5	190	6,4
300	10	9	65,7	345	11,5
570	19	17	124	655	21,9
630	21	19	139	725	24,2
840	28	25	183	970	32,2

1 kcal/ml (dilution standard)

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
120	4	4	29,2	140	4,7
210	7	7	51,1	245	8,2
480	16	16	117	560	18,7
630	21	21	153	735	24,6
840	28	29	212	990	32,9

1,2 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
165	5,5	7	51,1	200	6,7
285	9,5	12	87,6	345	11,5
450	15	19	139	545	18,2
660	22	28	204	805	26,8
810	27	34	248	985	32,8

1,33 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
165	5,5	8	58,4	205	6,9
270	9	13	94,9	335	11,2
390	13	19	139	485	16,2
600	20	29	212	750	24,9
780	26	38	277	975	32,4

1,5 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
90	3	5	36,5	115	3,9
180	6	10	73	230	7,7
360	12	20	146	460	15,4
570	19	32	234	735	24,5
750	25	42	307	965	32,2

* Dans ce tableau, 1 oz liq. = 30 ml. Les volumes d'eau fournis sont exacts, mais le volume final de la préparation peut légèrement varier.
† Les mesurettes doivent être rases et la poudre, non tassée. Bien que les mesurettes que Nutricia fournit soient validées pour être utilisées avec les préparations de Nutricia, la pesée de la poudre à l'aide d'une balance procure la plus grande précision. 1 mesurette rase de poudre non tassée donne 7,3 grammes de poudre et fournit 34,5 kcal. 1 gramme fournit 4,72 kcal et déplace environ 0,70 ml d'eau. Neocate Junior est destiné aux personnes de 1 an et plus et doit être utilisé sous surveillance médicale.

Neocate[MD] Junior avec fibres, fruits tropicaux

Tableaux de dilution

0,67 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
135	4,5	3	21,9	150	5,0
225	7,5	5	36,5	250	8,3
360	12	8	58,4	400	13,4
660	22	15	110	735	24,5
900	30	20	146	1 000	33,4

0,73 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
120	4	3	21,9	135	4,5
240	8	6	43,8	270	9,0
360	12	9	65,7	405	13,5
630	21	16	117	710	23,7
840	28	21	153	945	31,6

0,80 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
180	6	5	36,5	205	6,8
255	8,5	7	51,1	290	9,7
360	12	10	73,0	410	13,7
690	23	19	139	785	26,2
840	28	23	168	955	31,9

0,90 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
255	8,5	8	58,4	295	9,9
315	10,5	10	73,0	365	12,2
480	16	15	110	555	18,5
630	21	20	146	730	24,4
960	32	30	219	1 110	37,1

1 kcal/ml (dilution standard)

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
120	4	4	29,2	140	4,7
210	7	7	51,1	245	8,2
330	11	11	80,3	385	12,9
630	21	21	153	735	24,6
870	29	31	226	1 025	34,2

1,2 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
90	3	4	29,2	110	3,7
180	6	8	58,4	220	7,4
360	12	16	117	440	14,7
600	20	27	197	735	24,6
780	26	35	256	960	31,9

1,33 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
195	6,5	10	73,0	245	8,2
315	10,5	16	117	395	13,2
390	13	20	146	490	16,4
570	19	29	212	715	23,9
780	26	40	292	985	32,8

1,5 kcal/ml

Volume d'eau*		Poudre Neocate†		Volume final*	
ml	oz liq.	mesurettes	grammes	ml	oz liq.
135	4,5	8	58,4	175	5,9
255	8,5	15	110	330	11,0
390	13	23	168	505	16,9
540	18	32	234	700	23,4
780	26	46	336	1 015	33,8

* Dans ce tableau, 1 oz liq. = 30 ml. Les volumes d'eau fournis sont exacts, mais le volume final de la préparation peut légèrement varier.
† Les mesurettes doivent être rases et la poudre, non tassée. Bien que les mesurettes que Nutricia fournit soient validées pour être utilisées avec les préparations de Nutricia, la pesée de la poudre à l'aide d'une balance procure la plus grande précision. 1 mesurette rase de poudre non tassée donne 7,3 grammes de poudre et fournit 32,9 kcal. 1 gramme fournit 4,51 kcal et déplace environ 0,70 ml d'eau. Neocate Junior est destiné aux personnes de 1 an et plus et doit être utilisé sous surveillance médicale.

Avis sur la surveillance des oligoéléments

Les cliniciens doivent surveiller régulièrement les taux sériques d'oligoéléments, en particulier de phosphore, lorsque Neocate est utilisé comme principale ou seule source d'alimentation chez les patients atteints de maladies complexes touchant l'ensemble de l'organisme (diagnostics multiples et maladie intestinale), particulièrement chez les patients alimentés par sonde ou nés prématurément. Les préparations Neocate** doivent être utilisées sous surveillance médicale.*

** Une analyse rétrospective a recensé des études de cas de patients chez qui le produit était utilisé comme principale ou seule source d'alimentation en présence de diagnostics touchant de nombreux systèmes, y compris des anomalies congénitales et des interventions chirurgicales gastro-intestinales (comme l'entérocolite nécrosante, l'atrésie de l'œsophage et la fistule trachéo-œsophagienne); des maladies neurologiques (comme les convulsions, l'hémorragie intraventriculaire et l'hydrocéphalie); des maladies des voies respiratoires (maladie pulmonaire, trachéotomie, aspiration); des maladies cardiaques (cardiopathie congénitale) et d'autres maladies touchant l'ensemble de l'organisme, souvent chez des patients alimentés par sonde ou nés prématurément.*

*** Neocate est une préparation à base d'acides aminés destinée à la prise en charge nutritionnelle de l'allergie au lait de vache, des allergies à de multiples protéines alimentaires et des troubles gastro-intestinaux et allergiques connexes pour lesquels un régime alimentaire à base d'acides aminés est indiqué.*

René
A reçu un diagnostic de PCU

MALADIES MÉTABOLIQUES

Periflex[MD] Infant

Une préparation pour nourrissons en poudre sans phénylalanine contenant du fer, du DHA et de l'ARA, pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU).

Principales caractéristiques :

- Sans phénylalanine
- Contient du DHA et de l'ARA
- Poudre non aromatisée
- Contient un mélange équilibré de tous les autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides, de lipides, de vitamines et de minéraux
- Fournit 13 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Dilution standard = 67 kcal/100 ml
- Osmolalité (dilution standard) = 375 mOsm/kg d'H_2O
- Déplacement : 0,68 ml/g

Indication :

- Phénylcétonurie

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
169654	6 x 400 g	1 684

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Énergie, kcal (kJ)	421 (1 766)	324 (1 358)
Équivalent en protéines, g	13,0	10,0
Glucides, g	49,3	37,9
Lipides, g	19,1	14,7
Acide linoléique, g	2,9	2,2
ARA, mg	63,4	48,8
DHA, mg	36,3	27,9
Cendres, g	3,4	2,6
Acides aminés, g		
L-alanine	0,62	0,48
L-arginine	1,09	0,84
Acide L-aspartique	1,02	0,78
L-cystine	0,41	0,32
L-glutamine	1,28	0,98
Glycine	0,96	0,74
L-histidine	0,63	0,48
L-isoleucine	0,96	0,74
L-leucine	1,65	1,27
L-lysine	1,11	0,85
L-méthionine	0,26	0,20
L-phénylalanine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-proline	1,10	0,85
L-sérine	0,72	0,55
L-thréonine	0,81	0,62
L-tryptophane	0,31	0,24
L-tyrosine	1,44	1,11
L-valine	1,05	0,81
L-carnitine	0,01	0,01
Taurine	0,02	0,01

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	1 648 (495)	1 268 (381)
Vitamine D_3, UI (mg)	252 (0,0063)	194 (0,0048)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	4,8 (3,2)	3,7 (2,5)
Vitamine K_1, mg	0,037	0,028
Thiamine, mg	0,39	0,30
Riboflavine, mg	0,58	0,45
Niacine, mg	6,5	5,0
Vitamine B_6, mg	0,52	0,40
Vitamine B_{12}, mg	0,0011	0,0008
Acide folique, µg	0,043	0,033
Acide pantothénique, mg	2,6	2,0
Biotine, mg	0,013	0,010
Vitamine C, mg	39,0	30,0
Choline, mg	55,0	42,3
Inositol, mg	98,0	75,4
Minéraux		
Calcium, mg	522	401
Phosphore, mg	392	301
Magnésium, mg	52,0	40,0
Fer, mg	7,8	6,0
Zinc, mg	7,0	5,4
Manganèse, mg	0,38	0,29
Cuivre, mg	0,52	0,40
Iode, mg	0,065	0,050
Molybdène, mg	0,020	0,015
Chrome, mg	0,015	0,012
Sélénium, mg	0,0157	0,0121
Sodium, mg	157	121
Potassium, mg	653	502
Chlorure, mg	325	250

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales raffinées (huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique, huile de soya, huile de noix de coco), phosphate de calcium, L-arginine, L-aspartate, citrate tripotassique, L-leucine, acétate de L-lysine, L-tyrosine, L-glutamine, L-proline, L-valine, glycine, L-isoleucine, esters d'acide citrique des mono- et diglycérides, L-thréonine, L-sérine, L-histidine, L-alanine, chlorure de sodium, L-cystine, L-tryptophane, L-méthionine, acétate de magnésium, L-aspartate de magnésium, chlorure de potassium, huile de *M. alpina**, bitartrate de choline, inositol, huile de *C. cohnii***, acide ascorbique (vitamine C), sulfate de fer, sulfate de zinc, taurine, L-carnitine, niacinamide, huile de tournesol, acétate de DL-alpha-tocophérol (vitamine E), D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acétate de vitamine A, chlorhydrate de chlorure de thiamine, palmitate d'ascorbyle, iodure de potassium, sulfate de chrome, tocophérols mixtes, DL-alpha-tocophérol (vitamine E), phylloquinone (vitamine K_1), molybdate de sodium, acide folique, hydrogénosélénite de sodium, biotine, cholécalciférol (vitamine D_3), cyanocobalamine (vitamine B_{12}).

* Une source d'acide arachidonique (ARA)
** Une source d'acide docosahexaénoïque (DHA)

PKU Periflex[MD] Junior Plus

Une préparation en poudre sans phénylalanine pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants de plus de 1 an.

Principales caractéristiques :

- Sans phénylalanine
- Contient un mélange équilibré de tous les autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides (y compris un mélange de fibres), de lipides (y compris du DHA), de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments
- Préparation assurant l'ANREF selon l'âge
- Fournit 28 g d'équivalent en protéines et 12,5 g de lipides pour 100 g de poudre
- Offert en quatre variétés : nature, vanille, petits fruits et orange
- Osmolalité (à 1,1 kcal/ml) : 1 340 mOsm/kg d'H_2O Selon la dilution de 36 g de poudre (environ 4 mesurettes) dans 100 ml (3,5 oz liq.) d'eau
- Déplacement : 0,72 ml/g

Indication :

- Phénylcétonurie

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
89477 – Nature	6 x 400 g (14,1 oz)	1 540
89478 – Vanille	6 x 400 g (14,1 oz)	1 508
89474 – Petits fruits	6 x 400 g (14,1 oz)	1 508
89476 – Orange	6 x 400 g (14,1 oz)	1 508

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories (arômes)	385 (377)	138 (135)
Équivalent en protéines, g	28,0	10,0
Lipides, g	12,5	4,5
Saturés, g	2,0	0,71
Monoinsaturés, g	8,2	2,9
Polyinsaturés, g	1,8	0,64
DHA, mg	180	64,3
Glucides, g (arômes)	43,2 (41,2)	15,4 (14,7)
Fibres, g	11,2	4,0
Solubles	8,0	2,9
Insolubles	3,2	1,1
Acides aminés, g		
L-alanine	4,76	1,7
L-arginine	1,74	0,62
Acide L-aspartique	0,42	0,15
L-cystine	1,9	0,68
L-glutamine	3,36	1,2
Glycine	4,59	1,6
L-histidine	0,70	0,25
L-isoleucine	1,4	0,50
L-leucine	2,24	0,80
L-lysine	1,85	0,66
L-méthionine	0,73	0,26
L-phénylalanine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-proline	2,24	0,80
L-sérine	1,2	0,43
L-thréonine	2,52	0,90
L-tryptophane	0,42	0,15
L-tyrosine	2,66	0,95
L-valine	1,68	0,60
L-carnitine	0,02	0,01
Taurine	0,05	0,02

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	1 399 (420)	500 (150)
Vitamine D_3, UI (µg)	840 (21,0)	300 (7,5)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	12,5 (8,4)	4,5 (3)
Vitamine K, µg	14,0	5,0
Thiamine, mg	0,73	0,24
Riboflavine, mg	0,73	0,26
Vitamine B_6, mg	0,73	0,26
Vitamine B_{12}, µg	1,3	0,46
Niacine, mg	2,0	0,71
Acide folique, µg	210	75
Acide pantothénique, mg	4,2	1,5
Biotine, µg	11,2	4,0
Vitamine C, mg	42,0	15,0
Choline, mg	224	80,0
Inositol, mg	56,0	20,0
Minéraux		
Calcium, mg	980	350
Phosphore, mg	641	229
Magnésium, mg	113	40,4
Fer, mg	10,0	3,6
Zinc, mg	4,9	1,8
Manganèse, mg	0,92	0,33
Cuivre, µg	560	200
Iode, µg	139	49,6
Molybdène, mg	25,5	9,1
Chrome, µg	10,2	3,6
Sélénium, µg	28,2	10,1
Sodium, mg	280	100
Potassium, mg	445	159
Chlorure, mg	406	145

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales raffinées (huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique, huile de canola, triglycérides à chaîne moyenne [huile de palmiste et/ou de noix de coco], huile de tournesol), L-alanine, glycine, fructooligosaccharides, L-glutamine, inuline, amidon de maïs, L-tyrosine, phosphate de calcium dibasique, acétate de L-lysine, L-thréonine, cellulose microcristalline, L-leucine, L-proline, arôme artificiel, gomme arabique, L-cystine, L-arginine, L-valine, L-isoleucine, citrate tripotassique, citrate trisodique, L-sérine, chlorure de calcium, L-méthionine, L-histidine, maltodextrine, bitartrate de choline, hydrogénophosphate de magnésium, L-aspartate de magnésium, esters d'acide citrique des mono- et diglycérides (CITREM), huile de *C. cohnii***, L-tryptophane, citrate tricalcique, acide L-ascorbique, fibres de soya, M-inositol, taurine, sulfate de fer, lécithine de tournesol, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, niacinamide, sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acétate de vitamine A, palmitate d'ascorbyle, acide folique, iodure de potassium, tocophérols mixtes, molybdate de sodium, sélénite de sodium, chlorure de chrome, DL-alpha-tocophérol, vitamine D_3, phylloquinone, D-biotine, cyanocobalamine.

La version aromatisée aux **petits fruits** contient également : Arôme naturel, acide malique, édulcorant artificiel : sucralose*, colorant artificiel (bétanine).

La version aromatisée à la **vanille** contient également : Édulcorant artificiel : sucralose‡.

La version aromatisée à l'**orange** contient également : Acide citrique, arôme naturel, édulcorant artificiel : sucralose¥, colorants artificiels (béta-carotène, bétanine).

CONTIENT : Huile de soya, huile de noix de coco.

Veuillez consulter l'étiquette des produits individuels pour connaître l'ordre exact des ingrédients.

** Une source d'acide docosahexaénoïque (DHA)

* Contient 22,9 mg de sucralose par 100 ml (dilution standard)

‡ Contient 11,4 mg de sucralose par 100 ml (dilution standard)

¥ Contient 31,7 mg de sucralose par 100 ml (dilution standard)

Periflex[MD] Advance

Une préparation en poudre sans phénylalanine pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants plus âgés et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans phénylalanine
- Contient un mélange équilibré de tous les autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides, de lipides, de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments
- Fournit 35 g d'équivalent en protéines et 12,6 g de lipides pour 100 g de poudre
- Répond aux besoins en protéines dans un volume plus faible comparativement à Periflex Junior Plus
- Saveur, odeur et texture agréables
- Offert en deux variétés : non aromatisé et orange
- Osmolalité (mOsm/kg d'H_2O) :

Dilution	Non aromatisé	Orange
1 dans 5	830	890
1 dans 4	1 060	1 100

- Déplacement : 0,60 ml/g

Indication :

- Phénylcétonurie

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
49835 – Non aromatisé	6 x 454 g (1 lb)	1 748
49837 – Orange	6 x 454 g (1 lb)	1 675

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories (orange)	385 (369)	110 (105)
Équivalent en protéines, g	35,0	10,0
Lipides, g	12,6	3,6
Saturés, g	1,4	0,40
Monoinsaturés, g	7,9	2,3
Polyinsaturés, g	2,7	0,77
Acide linoléique, mg	2 064	590
Acide α-linolénique, mg	535	153
Glucides, g (orange)	33,0 (29,0)	9,4 (8,3)
Acides aminés, g		
L-alanine	1,4	0,40
L-arginine	2,6	0,74
Acide L-aspartique	2,5	0,71
L-cystine	0,96	0,27
Glycine	2,5	0,71
L-histidine	1,5	0,43
L-isoleucine	2,4	0,69
L-leucine	4,0	1,14
L-lysine	3,1	0,89
L-méthionine	0,64	0,18
L-phénylalanine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-proline	2,8	0,80
L-sérine	1,8	0,51
L-thréonine	1,9	0,54
L-tryptophane	0,78	0,22
L-tyrosine	3,5	1,00
L-valine	2,5	0,71
L-carnitine	0,03	0,01
Taurine	0,12	0,03
L-glutamine	4,3	1,23

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	1 951 (586)	557 (167)
Vitamine D_3, UI (µg)	292 (7,3)	83,4 (2,1)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	16,2 (10,9)	4,6 (3,1)
Vitamine K, µg	71,8	20,5
Thiamine, mg	0,80	0,23
Riboflavine, mg	0,85	0,24
Vitamine B_6, mg	1,4	0,40
Vitamine B_{12}, µg	2,7	0,77
Niacine, mg	5,0	1,4
Acide folique, µg	430	123
Acide pantothénique, mg	4,3	1,2
Biotine, µg	21,4	6,1
Vitamine C, mg	54,3	15,5
Choline, mg	376	107
Inositol, mg	70,0	20,0
Minéraux		
Calcium, mg	1 035	296
Phosphore, mg	995	284
Magnésium, mg	268	76,6
Fer, mg	12,9	3,7
Zinc, mg	7,9	2,3
Manganèse, mg	1,6	0,46
Cuivre, µg	720	206
Iode, µg	115	32,9
Molybdène, µg	32,4	9,3
Chrome, µg	22,8	6,5
Sélénium, µg	50,8	14,5
Sodium, mg	490	140
Potassium, mg	613	175
Chlorure, mg	490	140

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, huile de carthame à teneur élevée en acide oléique, huile de canola, L-lysine, L-aspartate, L-glutamine, L-leucine, L-tyrosine, L-proline, L-arginine, L-valine, glycine, L-isoleucine, hydrogénophosphate de magnésium, L-thréonine et 2 % ou moins de chacun des éléments suivants : L-sérine, hydrogénophosphate de disodium, L-histidine, L-alanine, chlorure de potassium, hydrogénotartrate de choline, L-cystine, L-tryptophane, sucre, L-méthionine, huile de noix de coco fractionnée, acétate de L-lysine, esters d'acide citrique des mono- et diglycérides (CITREM), citrate tripotassique, taurine, acide L-ascorbique, M-inositol, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophérol, sulfate de manganèse, niacinamide, D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, acétate de vitamine A, acide folique, iodure de potassium, chlorure de chrome, sélénite de sodium, molybdate de sodium, phylloquinone, D-biotine, vitamine D_3, cyanocobalamine.
La version **non aromatisée** contient également : Citrate tricalcique et 2 % ou moins de phosphate tricalcique.
La version aromatisée à l'**orange** contient également : Arôme artificiel, acide citrique, phosphate tricalcique et 2 % ou moins de chacun des éléments suivants : citrate tricalcique, gomme de guar, gomme de xanthane, édulcorant artificiel : sucralose*, colorants artificiels (bétanine, bêta-carotène).

CONTIENT : Huile de noix de coco.
* Contient 21 mg de sucralose par 100 ml (dilution 1:5) ou 25,5 mg par 100 ml (dilution 1:4)
Veuillez consulter l'étiquette des produits individuels pour connaître l'ordre exact des ingrédients.

Periflex^{MD} LQ

Une préparation prête à boire sans phénylalanine pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans phénylalanine
- Contient un mélange équilibré d'autres acides aminés, de glucides, de vitamines et de minéraux
- Peut facilement être utilisé avec ou remplacer PKU Periflex Junior Plus ou Advance
- Pas de mesure ou de mélange
- Excellent ajout à tout régime alimentaire quotidien pour la PCU
- Fournit 15 g d'équivalent en protéines et 5 g de lipides par contenant de 250 ml
- Offert en deux variétés : crème à l'orange et crème aux petits fruits
- Osmolalité (à 0,64 kcal/ml) :
  Orange : 1 080 mOsm/kg d'H_2O
  Petits fruits : 1 030 mOsm/kg d'H_2O
- Eau libre : 84 %

Indication :

- Phénylcétonurie

Pour des détails sur l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par contenant
80177 – Crème à l'orange	18 x 250 ml (8,5 oz liq.)	160
80176 – Crème aux petits fruits	18 x 250 ml (8,5 oz liq.)	160

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 250 ml	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	160	107
Équivalent en protéines, g	15,0	10,0
Lipides, g	5,0	3,3
Saturés, g	0,75	0,50
Monoinsaturés, g	3,0	2,0
Polyinsaturés, g	1,0	0,67
Glucides, g	13,8	9,2
Acides aminés, g		
L-alanine	0,68	0,45
L-arginine	1,28	0,85
Acide L-aspartique	1,2	0,80
L-cystine	0,48	0,32
Glycine	1,23	0,82
L-histidine	0,73	0,49
L-isoleucine	1,13	0,75
L-leucine	1,95	1,30
L-lysine	1,5	1,00
L-méthionine	0,33	0,22
L-phénylalanine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-proline	1,38	0,92
L-sérine	0,85	0,57
L-thréonine	0,95	0,63
L-tryptophane	0,38	0,25
L-tyrosine	1,73	1,15
L-valine	1,25	0,83
L-carnitine	0,01	0,01
Taurine	0,08	0,05
L-glutamine	Aucun ajout	Aucun ajout

Vitamines	Pour 250 ml	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	833 (250)	555 (167)
Vitamine D_3, UI (µg)	130 (3,3)	87,0 (2,2)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	7,0 (4,8)	4,7 (3,2)
Vitamine K, µg	30,8	20,5
Thiamine, mg	0,35	0,23
Riboflavine, mg	0,38	0,25
Vitamine B_6, mg	0,60	0,40
Vitamine B_{12}, µg	1,2	0,80
Niacine, mg	2,1	1,4
Acide folique, µg	184	123
Acide pantothénique, mg	1,9	1,3
Biotine, µg	9,3	6,2
Vitamine C, mg	23,3	15,5
Choline, mg	161	107
Inositol, mg	30,0	20,0
Minéraux		
Calcium, mg	400	267
Phosphore, mg	288	192
Magnésium, mg	114	76,0
Fer, mg	5,5	3,7
Zinc, mg	3,5	2,0
Manganèse, mg	0,70	0,47
Cuivre, µg	310	207
Iode, µg	49,0	32,7
Molybdène, µg	14,0	9,3
Chrome, µg	9,8	6,5
Sélénium, µg	21,8	14,5
Sodium, mg	210	140
Potassium, mg	263	175
Chlorure, mg	210	140

Ingrédients :

Eau, sucre et moins de 2 % de chacun des éléments suivants : glycérophosphate de calcium, huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique, acétate de L-lysine, huile de canola, L-leucine, L-tyrosine, arôme artificiel, L-proline, L-arginine, L-valine, glycine, acide L-aspartique, L-isoleucine, cellulose microcristalline, acide citrique, L-thréonine, L-sérine, acétate de magnésium, citrate tripotassique, L-histidine, L-alanine, L-cystine, hydrogénotartrate de choline, N-acétyl, L-méthionine, chlorure de sodium, L-tryptophane, citrate trisodique, huile de soya, acide L-ascorbique, ester d'acide diacétyltartrique des monoglycérides, mono- et diglycérides, gomme de guar, gomme de xanthane, édulcorant artificiel : acésulfame de potassium*, taurine, M-inositol, sulfate de fer, phosphate tricalcique, carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophérol, niacinamide, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, acétate de vitamine A, iodure de potassium, chlorure de chrome, sélénite de sodium, molybdate de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol (vitamine D_3), acide folique, cyanocobalamine.

CONTIENT : Huile de soya.

* La version aromatisée à la crème à l'orange contient 37,9 mg d'acésulfame de potassium par 250 ml; la version aromatisée à la crème aux petits fruits contient 99,4 mg d'acésulfame de potassium par 250 ml

Veuillez consulter l'étiquette des produits individuels pour connaître l'ordre exact des ingrédients.

PhenylAde^{MD} GMP Drink Mix

Une préparation en poudre à faible teneur en phénylalanine contenant un mélange équilibré de glycomacropeptides (GMP), d'acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides (y compris des fibres), de lipides (y compris de l'acide docosahexaénoïque [DHA]), de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments.

Principales caractéristiques :

- Faible en phénylalanine
- Convient aux personnes de plus de 1 an atteintes de PCU
- Préparation complète contenant des vitamines et des minéraux essentiels
- Contient une source de DHA
- 1,5 gramme de fibres solubles par portion de 10 g d'équivalent en protéines
- Fournit 30 g d'équivalent en protéines et 12 g de lipides pour 100 g de poudre
- Offert en deux variétés : vanille et original
- Offert en sachets (vanille et original) et en boîtes (vanille seulement)
- Osmolalité (à 0,73 kcal/ml) : 460 mOsm/kg d'H_2O
  Selon la dilution de 33,3 g de poudre (1 mesurette ou 1 sachet) dans 150 ml d'eau (5 oz liq.)
- Déplacement : 0,9 ml/g

Indication :

- Phénylcétonurie

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte/sachet
BOÎTES		
114098 – Vanille	4 x 400 g (14,1 oz)	1 584
SACHETS		
114099 – Vanille	16 x 33,3 g (1,2 oz)	132
114116 – Original	16 x 33,3 g (1,2 oz)	132

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 mesurette ou sachet)
Calories	396	132
Équivalent en protéines, g	30,0	10,0
Phénylalanine, mg	46,0	15,3
Lipides, g	12,0	4,0
Saturés, g	2,8	0,93
Monoinsaturés, g	6,3	2,1
Polyinsaturés, g	2,5	0,84
DHA, mg	155	51,6
Glucides, g	42,0	14,0
Fibres, g	4,5	1,5
Acides aminés, g		
L-alanine	1,33	0,44
L-arginine	1,42	0,47
Acide L-aspartique	1,89	0,63
L-cystine	0,93	0,31
Acide L-glutamique	4,14	1,38
L-glycine	2,24	0,75
L-histidine	1,47	0,49
L-isoleucine	2,27	0,76
L-leucine	2,34	0,78
L-lysine	1,33	0,44
L-méthionine	0,44	0,15
L-phénylalanine	0,05	0,02
L-proline	2,57	0,86
L-sérine	1,63	0,54
L-thréonine	3,68	1,23
L-tryptophane	0,72	0,24
L-tyrosine	3,69	1,23
L-valine	1,83	0,61
L-carnitine	0,04	0,01
Taurine	0,09	0,03

Vitamine	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 mesurette ou sachet)
Vitamine A, UI (µg ÉR)	2 040 (765)	680 (255)
Vitamine D_3, UI (µg)	900 (22,5)	300 (7,5)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	22,8 (15,3)	7,6 (5,1)
Vitamine K, µg	72,0	24,0
Thiamine, mg	1,4	0,47
Riboflavine, mg	1,8	0,60
Vitamine B_6, mg	1,7	0,56
Vitamine B_{12}, µg	3,6	1,2
Niacine, mg	15,0	5,0
Acide folique, µg	360	120
Acide pantothénique, mg	4,8	1,6
Biotine, µg	36,0	12,0
Vitamine C, mg	72,0	24,0
Choline, mg	300	100
Inositol, mg	60,0	20,0
Minéraux		
Calcium, mg	1 050	350
Phosphore, mg	945	315
Magnésium, mg	252	84,0
Fer, mg	13,2	4,4
Zinc, mg	10,2	3,4
Manganèse, mg	1,6	0,52
Cuivre, µg	1 200	400
Iode, µg	135	45,0
Molybdène, µg	54,0	18,0
Chrome, µg	36,0	12,0
Sélénium, µg	48,0	16,0
Sodium, mg	465	155
Potassium, mg	1 047	349
Chlorure, mg	569	190

Ingrédients :

Glycomacropeptide* (Lait), huiles végétales raffinées (canola, carthame, noix de coco et soya), amidon de maïs modifié, dextrine, maltodextrine, L-tyrosine, phosphate tricalcique. Contient 2 % ou moins de : L-glycine, phosphate de magnésium, L-leucine, L-histidine, L-arginine, chlorure de potassium, L-cystine, bitartrate de choline, phosphate dicalcique, L-tryptophane, huile de *C. cohnii***, extraits secs de sirop de glucose, citrate de potassium, palmitate d'ascorbyle, tocophérols mixtes, dioxyde de silicium, extrait de romarin, chlorure de sodium, acide ascorbique, taurine, inositol, mannitol, acétate de vitamine E, sulfate de fer, L-carnitine, mono- et distéarate de glycérol, huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique, polyphosphate de sodium, lécithine de tournesol, niacinamide, oxyde de zinc, ascorbate de sodium, vitamine D_3, palmitate de vitamine A, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, D-biotine, bêta-carotène, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, iodure de potassium, vitamine K_1, sélénite de sodium, acide folique, vitamine B_{12}, chlorure de chrome, molybdate de sodium.
La version **originale** contient également : Extraits secs de sirop de maïs et 2 % ou moins de sucre, arômes naturels.

La version aromatisée à la **vanille** contient également : Sucre, arômes naturels et artificiels.

CONTIENT : Lait, huile de noix de coco, huile de soya.

* Contient 15,3 mg de phénylalanine/10 g d'équivalent en protéines

** Une source d'acide docosahexaénoïque (DHA)

PhenylAde[MD] GMP READY

Une préparation prête à boire à faible teneur en phénylalanine contenant un mélange de glycomacropeptides (GMP), d'acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides, de lipides (y compris de l'acide docosahexaénoïque [DHA], et de l'acide eicosapentaénoïque [EPA]), de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments.

Principales caractéristiques :

- Faible en phénylalanine
- Convient aux personnes de plus de 1 an atteintes de PCU
- Préparation complète contenant des vitamines et des minéraux essentiels
- Contient une source de DHA et d'EPA
- Pas de mesure ou de mélange
- Fournit 10 g d'équivalent en protéines et 4 g de lipides par contenant de 250 ml
- Sans arôme (nature)
- Osmolalité (à 0,73 kcal/ml) : 460 mOsm/kg d'H_2O
- Eau libre : 93 %

Indication :

- Phénylcétonurie

Pour des détails sur l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par contenant
139686	18 x 250 ml (8,5 oz liq.)	110

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 10 g d'équivalent en protéines (250 ml)
Calories	110
Équivalent en protéines, g	10,0
Phénylalanine, mg	18,0
Lipides, g	4,0
Saturés, g	0,40
Trans, g	0
Monoinsaturés, g	2,4
Polyinsaturés, g	1,2
DHA, mg	60,0
EPA, mg	15,0
Glucides, g	8,5
Fibres, g	0,93
Sucres, g	7,5
Acides aminés, g	
L-alanine	0,40
L-arginine	0,49
Acide L-aspartique	0,59
L-cystine	0,29
Acide L-glutamique	1,35
Glycine	0,07
L-histidine	0,40
L-isoleucine	0,72
L-leucine	1,53
L-lysine	0,43
L-méthionine	0,13
L-phénylalanine	0,02
L-proline	0,79
L-sérine	0,51
L-thréonine	1,13
L-tryptophane	0,24
L-tyrosine	1,00
L-valine	0,87
L-carnitine	0,01
Taurine	0,03

Vitamines	Pour 10 g d'équivalent en protéines (250 ml)
Vitamine A, UI (µg ÉR)	665 (200)
Vitamine D_3, UI (µg)	250 (6,3)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	5,0 (3,3)
Vitamine K, µg	17,5
Thiamine, mg	0,40
Riboflavine, mg	0,40
Vitamine B_6, mg	0,35
Vitamine B_{12}, µg	0,70
Niacine, mg	3,5
Acide folique, µg	50,0
Acide pantothénique, mg	1,3
Biotine, µg	7,8
Vitamine C, mg	15,5
Choline, mg	93,8
Inositol, mg	20,3
Minéraux	
Calcium, mg	325
Phosphore, mg	275
Magnésium, mg	58,5
Fer, mg	3,0
Zinc, mg	2,2
Manganèse, mg	0,23
Cuivre, µg	250
Iode, µg	36,5
Molybdène, µg	12,5
Chrome, µg	7,5
Sélénium, µg	12,5
Sodium, mg	146
Potassium, mg	185
Chlorure, mg	100

Ingrédients :

Eau, Glycomacropeptide* (Lait), sucre, huiles végétales raffinées (huile de canola, huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique), L-leucine, glycérophosphate de calcium, L-tyrosine, maltodextrine, gomme de cellulose, phosphate de calcium dibasique, L-arginine, acétate de magnésium, L-histidine, L-valine, L-cystine, bitartrate de choline, arôme artificiel, L-tryptophane, chlorure de potassium, lactate de calcium, cellulose microcristalline, huile de *C. cohnii***, esters d'acide citrique des mono- et diglycérides (CITREM), chlorure de sodium, acide L-ascorbique, huile de *Schizochytrium Sp.*[†], taurine, M-inositol, sucralose[††], lactate ferreux, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, gluconate de cuivre, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, palmitate de vitamine A, tocophérols mixtes, lécithine de tournesol, iodure de potassium, acide folique, palmitate d'ascorbyle, chlorure de chrome, molybdate de sodium, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.

CONTIENT : Lait.

* Contient 18 mg de phénylalanine par 10 g d'équivalent en protéines

** Une source d'acide docosahexaénoïque (DHA)

† Une source d'acide docosahexaénoïque (DHA) et d'acide eicosapentaénoïque (EPA)

†† Contient 22,5 mg de sucralose par 250 ml

PhenylAde[MD] GMP ULTRA

Une préparation en poudre à faible teneur en phénylalanine qui fournit des protéines provenant du glycomacropeptide (GMP) et des acides aminés avec d'autres nutriments, pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les individus de plus de 3 ans.

Principales caractéristiques :

- Faible en phénylalanine
- Une option à faible volume et à plus faible teneur en calories[▯]
- Fournit 30 g d'équivalent en protéines par sachet
- Mélange complet de vitamines et minéraux
- Offert en deux variétés : limonade et vanille
- Osmolalité selon la dilution de 33,4 g de poudre (1 sachet) dans 180 ml d'eau
  (6 oz liq.) :
  Vanille : 500 mOsm/kg d'H_2O
  Limonade : 530 mOsm/kg d'H_2O
- Déplacement : 0,64 ml/g

Indication :

- Phénylcétonurie

Pour des détails sur l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par sachet
160056 - Vanille	16 x 33,4 g (1,2 oz)	107
160058 - Limonade	16 x 33,4 g (1,2 oz)	98

▯ Contient 69 % de calories en moins que PhenylAde Essential

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 20 g d'équivalent en protéines (1 sachet)
Calories (Limonade)	321 (295)	107 (98)
Équivalent en protéines, g	60	20
Phénylalanine, mg	108	36
Lipides, g (Limonade)	2,5 (0,19)	0,82 (0,06)
Glucides, g (Limonade)	14,8 (13,4)	4,9 (4,5)
Sucres, g (Limonade)	9,7 (8,3)	3,2 (2,8)
Acides aminés, g		
L-alanine	2,40	0,80
L-arginine	2,90	0,96
L-acide aspartique	3,60	1,20
L-cystine	1,80	0,60
L-acide glutamique	8,40	2,80
L-glycine	0,48	0,16
L-histidine	2,40	0,80
L-isoleucine	4,40	1,50
L-leucine	9,00	3,00
L-lysine	2,60	0,86
L-méthionine	0,78	0,26
L-phénylalanine	0,108	0,036
L-proline	4,80	1,60
L-sérine	3,00	1,00
L-thréonine	6,60	2,20
L-tryptophane	1,50	0,50
L-tyrosine	6,00	2,00
L-valine	5,30	1,80
L-carnitine	0,08	0,03
Taurine	0,18	0,06

Vitamines	Pour 100 g	Pour 20 g d'équivalent en protéines (1 sachet)
Vitamine A, UI (µg ÉR)	2 448 (920)	816 (307)
Vitamine D, UI (µg)	1 080 (27,0)	360 (9,0)
Vitamin E, IU (mg α ÉAT)	27,6 (18,4)	9,2 (6,1)
Vitamine K, µg	86,4	28,8
Thiamine, mg	2,2	0,73
Riboflavine, mg	2,2	0,72
Vitamine B_6, mg	2,0	0,68
Vitamin B_{12}, µg	4,3	1,4
Niacine, mg	18,0	6,0
Acide folique, µg	240	80,0
Équivalents de folate alimentaire, µg	400	133
Acide pantothénique, mg	6,0	2,0
Biotine, µg	43,2	14,4
Vitamine C, mg	86,4	28,8
Choline, mg	360	120
Inositol, mg	71,3	23,8
Minéraux		
Calcium, mg	1311	437
Phosphore, mg	1287	429
Magnésium, mg	315	105
Fer, mg	16,2	5,4
Zinc, mg	12,6	4,2
Manganèse, mg	0,92	0,31
Cuivre, µg	1478	493
Iode, µg	171	57,0
Molybdène, µg	66,6	22,2
Chrome, µg	46,8	15,6
Sélénium, µg	66,6	22,2
Sodium, mg	1006	335
Potassium, mg	1428	476
Chlorure, mg	720	240

Ingrédients :

Vanille : Glycomacropeptide* (Lait), sucre, L-leucine, L-tyrosine, L-arginine, hydrogénophosphate de magnésium, L-histidine, huiles végétales raffinées (huile de canola, huile de carthame, huile de coco, huile de soya), arôme artificiel, phosphate tricalcique, maltodextrine, L-valine, L-cystine, L-tryptophane, phosphate dicalcique, chlorure de potassium, bitartrate de choline, amidon de maïs modifié, carbonate de calcium, citrate de potassium, chlorure de sodium, dioxyde de silicium, taurine, acide L-ascorbique, L-carnitine, inositol, sulfate ferreux, sucralose**, acétate de DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, oxyde de zinc, gluconate de cuivre, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de thiamine, sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, palmitate de vitamine A, sélénite de sodium, bêta-carotène, molybdate de sodium, iodure de potassium, chlorure de chrome, acide folique, vitamine K_1, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.

CONTIENT : Lait, huile de soya, huile de coco.

Limonade: Glycomacropeptide* (Lait), L-Leucine, sucre, L-tyrosine, acide citrique, L-arginine, arôme naturel, hydrogénophosphate de magnésium, L-histidine, phosphate tricalcique, L-valine, L-cystine, extraits secs de sirop de maïs, L-tryptophane, phosphate dicalcique, chlorure de potassium, maltodextrine, bitartrate de choline, carbonate de calcium, citrate de potassium, chlorure de sodium, dioxyde de silicium, taurine, acide L-ascorbique, sucralose†, L-carnitine, inositol, sulfate ferreux, acétate de DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, oxyde de zinc, gluconate de cuivre, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de thiamine, sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, palmitate de vitamine A, sélénite de sodium, bêta-carotène, molybdate de sodium, iodure de potassium, chlorure de chrome, acide folique, vitamine K_1, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.

CONTIENT : Lait.

* Contient 36 mg de phénylalanine par 20 g d'équivalent en protéines
** Vanille contient 16,6 mg de sucralose par 33,4 g de poudre
† Limonade contient 30 mg de sucralose par 33,4 g de poudre

PhenylAde[MD] GMP MIX-IN

Une préparation en poudre à faible teneur en phénylalanine contenant un mélange équilibré de glycomacropeptides (GMP) et d'acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides en petites quantités, de lipides et de quelques minéraux.

Principales caractéristiques :

- Faible en phénylalanine
- Convient aux personnes de plus de 1 an atteintes de PCU
- Fournit 80 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Se mélange facilement avec de l'eau, des boissons aromatisées ou toute autre préparation pour la PCU
- Offert en sachets
- Déplacement : 0,4 ml/g

Indication :

- Phénylcétonurie

Pour des détails sur l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par sachet
116130	20 x 12,5 g (0,44 oz)	42

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 sachet)
Calories	334	42
Équivalent en protéines	80,0	10,0
Phénylalanine, mg	122	15,3
Lipides, g	< 0,5	< 0,5
Glucides, g	2,7	< 0,5
Acides aminés, g		
L-alanine, g	3,51	0,44
L-arginine, g	3,76	0,47
Acide L-aspartique, g	5,0	0,63
L-cystine, g	2,45	0,31
Acide L-glutamique, g	11,0	1,38
Glycine, g	5,93	0,75
L-histidine, g	3,89	0,49
L-isoleucine, g	6,01	0,76
L-leucine, g	6,19	0,78
L-lysine, g	3,51	0,44
L-méthionine, g	1,17	0,15
L-phénylalanine, g	0,12	0,02
L-proline, g	6,81	0,86
L-sérine, g	4,31	0,54
L-thréonine, g	9,74	1,23
L-tryptophane, g	1,89	0,24
L-tyrosine, g	9,75	1,23
L-valine, g	4,84	0,61
L-carnitine, g	0,08	0,01
Taurine, g	0,24	0,03

Minéraux	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 sachet)
Calcium, mg	32,0	4,0
Phosphore, mg	320	40,0
Potassium, mg	1 160	145
Sodium, mg	960	120

Ingrédients :

Glycomacropeptide* (Lait), L-tyrosine, glycine, L-leucine, L-histidine, L-arginine, extraits secs de sirop de maïs, L-cystine. Contient 2 % ou moins de : L-tryptophane, huiles végétales raffinées (canola, carthame, noix de coco et soya), dioxyde de silicium, taurine, amidon de maïs modifié, maltodextrine, L-carnitine, palmitate d'ascorbyle, extrait de romarin, tocophérols mixtes, phosphate tricalcique.

* Contient 15,3 mg de phénylalanine/10 g d'équivalent en protéines

CONTIENT : Lait, huile de noix de coco, huile de soya.

Remarque : Doit être combiné à un supplément de vitamines et de minéraux approprié lorsque pris comme seule source de préparation pour la PCU.

PhenylAde[MD] Essential Drink Mix

Une préparation en poudre sans phénylalanine pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans phénylalanine
- Préparation complète contenant des vitamines et des minéraux essentiels
- Fournit 25 g d'équivalent en protéines et 13 g de lipides pour 100 g de poudre
- Offert en six variétés : chocolat, vanille, crème à l'orange, fraise et non aromatisé
- Offert en boîtes et en sachets
- Osmolalité (à 0,65 kcal/ml) : 800 mOsm/kg d'H_2O
  Selon la dilution de 40 g de poudre (1 mesurette ou 1 sachet) dans 210 ml (7 oz liq.) d'eau
- Déplacement : 0,75 ml/g

Indication :

- Phénylcétonurie

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte/sachet
BOÎTES		
119868 – Chocolat	4 x 454 g (1 lb)	1 784
119869 – Vanille	4 x 454 g (1 lb)	1 784
119870 – Crème à l'orange	4 x 454 g (1 lb)	1 784
119871 – Fraise	4 x 454 g (1 lb)	1 784
119879 – Non aromatisé	4 x 454 g (1 lb)	1 784
SACHETS		
119856 – Chocolat	16 x 40 g (1,4 oz)	157
119857 – Vanille	16 x 40 g (1,4 oz)	157
119858 – Crème à l'orange	16 x 40 g (1,4 oz)	157
119859 – Fraise	16 x 40 g (1,4 oz)	157
119861 – Non aromatisé	16 x 40 g (1,4 oz)	157

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 mesurette ou 1 sachet)
Calories	393	157
Équivalent en protéines, g	25,0	10,0
Lipides, g	13,0	5,0
Lipides saturés, g	3,0	1,2
Monoinsaturés, g	6,8	2,7
Polyinsaturés, g	2,8	1,1
Acide linoléique, mg	1 936	774
Acide α-linolénique, mg	725	290
Glucides, g	46,0	18,0
Fibres	3,9	1,5
Acides aminés, g		
L-alanine	2,32	0,93
L-arginine	1,97	0,79
L-asparagine	3,49	1,40
L-cystine	0,34	0,14
L-glutamine	3,89	1,56
Glycine	1,52	0,61
L-histidine	0,63	0,25
L-isoleucine	1,04	0,42
L-leucine	2,24	0,90
L-lysine	1,82	0,73
L-méthionine	0,61	0,24
L-phénylalanine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-proline	1,52	0,61
L-sérine	2,24	0,90
L-thréonine	1,15	0,46
L-tryptophane	0,58	0,23
L-tyrosine	2,69	1,08
L-valine	1,7	0,67
L-carnitine	0,04	0,01
Taurine	0,08	0,03

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 mesurette ou 1 sachet)
Vitamine A, UI (µg ÉR) (25 % de bêta-carotène)	1 700 (637)	680 (255)
Vitamine D_3, UI (µg)	600 (15,0)	240 (6,0)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	19,0 (12,7)	7,6 (5,1)
Vitamine K, µg	61,0	24,0
Thiamine, mg	1,5	0,6
Riboflavine, mg	1,5	0,6
Vitamine B_6, mg	1,4	0,56
Vitamine B_{12}, µg	3,0	1,2
Niacine, mg	17,0	6,8
Acide folique, µg	300	120
Acide pantothénique, mg	4,0	1,6
Biotine, µg	30,0	12,0
Vitamine C, mg	60,0	24,0
Choline, mg	210	84,0
Inositol, mg	50,0	20,0
Minéraux		
Calcium, mg	822	329
Phosphore, mg	788	315
Magnésium, mg	210	84,0
Fer, mg	11,0	4,4
Zinc, mg	10,0	4,0
Manganèse, mg	1,3	0,52
Cuivre, µg	1 000	400
Iode, µg	100	40,0
Molybdène, µg	45,0	18,0
Chrome, µg	30,0	12,0
Sélénium, µg	40,0	16,0
Sodium, mg	388	155
Potassium, mg	872	349
Chlorure, mg	475	190

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié, huile de canola, maltodextrine, huile de carthame, dextrine, L-asparagine monohydraté, L-glutamine, L-tyrosine, acétate de L-lysine, L-alanine, L-leucine, L-sérine. Contient 2 % ou moins de : L-arginine, phosphate monocalcique, L-valine, phosphate dicalcique, citrate de sodium, glycine, L-proline, citrate de potassium, huile de noix de coco, huile de soya, L-thréonine, L-isoleucine, chlorure de potassium, L-histidine, L-méthionine, bitartrate de choline, L-tryptophane, huile de lin, oxyde de magnésium, L-cystine, palmitate d'ascorbyle, tocophérols mixtes, extrait de romarin, dioxyde de silicium, phosphate tricalcique, chlorure de sodium, taurine, acide ascorbique, inositol, orthophosphate ferrique, acétate de vitamine E, L-carnitine, niacinamide, phosphate de calcium, oxyde de zinc, gluconate de cuivre, vitamine K_1, vitamine D_3, palmitate de vitamine A, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, mono- et diglycérides, D-biotine, bêta-carotène, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine, iodure de potassium, sélénite de sodium, acide folique, vitamine B_{12}, chlorure de chrome, molybdate de sodium.

La version aromatisée au **chocolat** contient également : Sucre, arôme naturel et artificiel, et moins de 2 % des éléments suivants : FD&C rouge nº 40, FD&C jaune nº 5, FD&C bleu nº 2.

La version aromatisée à la **vanille** contient également : Sucre, arôme naturel et artificiel, et moins de 2 % des éléments suivants : dioxyde de titane.

La version aromatisée à la **crème à l'orange** contient également : Sucre, arôme naturel et artificiel, et moins de 2 % des éléments suivants : FD&C jaune nº 6.

La version aromatisée à la **fraise** contient également : Sucre, arôme naturel et artificiel, et moins de 2 % des éléments suivants : FD&C rouge nº 40, FD&C bleu nº 1.

CONTIENT : Huile de noix de coco, huile de soya.

Veuillez consulter l'étiquette des produits individuels pour connaître l'ordre exact des ingrédients.

PhenylAde[MD] 40 Drink Mix

Une préparation en poudre sans phénylalanine pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans phénylalanine
- Préparation complète contenant des vitamines et des minéraux essentiels
- Seulement 0,5 g de lipides et 83 calories par portion
- Fournit 40 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Offert dans des sachets à portion unique aux agrumes et non aromatisés
- Osmolalité (à 0,63 kcal/ml) : 1 110 mOsm/kg d'H_2O
  Selon la dilution de 25 g de poudre (1 sachet) dans 120 ml (4 oz liq.) d'eau
- Déplacement : 0,48 ml/g

Indication :

- Phénylcétonurie

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par sachet
119863 - Non aromatisé	20 x 25 g (0,88 oz)	83
119866 – Agrumes	20 x 25 g (0,88 oz)	83

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 sachet)
Calories	330	83
Équivalent en protéines, g	40,0	10,0
Lipides, g	2,0	0,50
Lipides saturés, g	0,48	0,12
Monoinsaturés, g	1,1	0,28
Polyinsaturés, g	0,40	0,10
Glucides, g	38,0	9,5
Acides aminés, g		
L-alanine	3,85	0,96
L-arginine	3,27	0,82
L-asparagine	5,04	1,26
L-cystine	0,55	0,14
L-glutamine	6,34	1,59
Glycine	2,47	0,62
L-histidine	1,02	0,26
L-isoleucine	1,64	0,41
L-leucine	3,64	0,91
L-lysine	2,98	0,75
L-méthionine	1,08	0,27
L-phénylalanine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-proline	2,47	0,62
L-sérine	4,08	1,02
L-thréonine	1,92	0,48
L-tryptophane	0,61	0,15
L-tyrosine	3,78	0,95
L-valine	2,74	0,69
L-carnitine	0,06	0,01
Taurine	0,12	0,03

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 sachet)
Vitamine A, UI (µg ÉR) (25 % de bêta-carotène)	1 557 (584)	389 (146)
Vitamine D_3, UI (µg)	347 (8,7)	87,0 (2,2)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	15,4 (10,3)	3,9 (2,6)
Vitamine K, µg	60,0	15,0
Thiamine, mg	1,4	0,35
Riboflavine, mg	1,3	0,32
Vitamine B_{6}, mg	1,5	0,38
Vitamine B_{12}, µg	2,8	0,70
Niacine, mg	16,4	4,1
Acide folique, µg	468	117
Acide pantothénique, mg	5,8	1,5
Biotine, µg	35,0	8,8
Vitamine C, mg	75,0	18,9
Choline, mg	284	71,0
Inositol, mg	86,0	22,0
Minéraux		
Calcium, mg	894	224
Phosphore, mg	809	202
Magnésium, mg	209	52,0
Fer, mg	12,0	3,0
Zinc, mg	8,0	2,0
Manganèse, mg	1,8	0,45
Cuivre, µg	869	217
Iode, µg	133	33,0
Molybdène, µg	40,0	10,0
Chrome, µg	27,0	6,7
Sélénium, µg	56,0	13,9
Sodium, mg	424	106
Potassium, mg	776	194
Chlorure, mg	1 322	331

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, sucre, L-glutamine, L-asparagine monohydraté, L-sérine, L-alanine, L-tyrosine, monochlorhydrate de L-lysine, L-leucine, L-arginine, L-valine, acide citrique, phosphate tricalcique, glycine, L-proline, arôme naturel. Contient 2 % ou moins de : L-thréonine, L-isoleucine, phosphate de magnésium, L-méthionine, citrate de sodium, L-histidine, phosphate dipotassique, amidon de maïs modifié, huile de canola, maltodextrine, huile de carthame, bitartrate de choline, chlorure de potassium, L-tryptophane, L-cystine, chlorure de sodium, huile de noix de coco, huile de soya, taurine, dioxyde de silicium, inositol, acide ascorbique, L-carnitine, palmitate d'ascorbyle, tocophérols mixtes, extrait de romarin, orthophosphate ferrique, acétate de vitamine E, sulfate de zinc, niacinamide, sucralose*, D-pantothénate de calcium, vitamine K_1, sulfate de manganèse, palmitate de vitamine A, D-biotine, vitamine D_3, bêta-carotène, sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de potassium, mononitrate de thiamine, riboflavine, sélénite de sodium, acide folique, vitamine B_{12}, chlorure de chrome, molybdate de sodium. La version aromatisée aux **agrumes** contient également : moins de 2 % des éléments suivants : FD&C jaune nº 5.

CONTIENT : Huile de noix de coco, huile de soya.

* Contient 2,5 mg de sucralose par 25 g de poudre

Veuillez consulter l'étiquette des produits individuels pour connaître l'ordre exact des ingrédients.

PhenylAde[MD] 60 Drink Mix

Une préparation en poudre sans phénylalanine pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans phénylalanine
- Préparation complète contenant des vitamines et des minéraux essentiels
- Seulement 49 calories par portion
- Fournit 60 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Offert en deux variétés : vanille et non aromatisé
- Convient aux personnes de plus de 1 an atteintes de PCU
- Offert en boîtes ou en sachets
- Osmolalité (à 0,49 kcal/ml) : 1 256 mOsm/kg d'H_2O
  Selon la dilution de 16,7 g de poudre (1 mesurette ou 1 sachet) dans 90 ml (3 oz liq.) d'eau
- Déplacement : 0,54 ml/g

Indication :

- Phénylcétonurie

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte/sachet
BOÎTES		
119852 – Non aromatisé	4 x 454 g (1 lb)	1 335
119853 – Vanille	4 x 454 g (1 lb)	1 335
SACHETS		
119876 – Non aromatisé	30 x 16,7 g (0,59 oz)	49
119854 – Vanille	30 x 16,7 g (0,59 oz)	49

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 mesurette/sachet)
Calories	294	49
Équivalent en protéines, g	60,0	10,0
Lipides, g	1,0	0,17
Lipides saturés, g	< 0,50	< 0,10
Monoinsaturés, g	< 0,50	< 0,10
Polyinsaturés, g	< 0,50	< 0,10
Glucides, g	11,0	2,0
Acides aminés, g		
L-alanine	5,56	0,93
L-arginine	4,72	0,79
L-asparagine	8,36	1,39
L-cystine	0,81	0,13
L-glutamine	9,31	1,55
Glycine	3,63	0,61
L-histidine	1,51	0,25
L-isoleucine	2,49	0,42
L-leucine	5,37	0,90
L-lysine	4,36	0,73
L-méthionine	1,45	0,24
L-phénylalanine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-proline	3,63	0,61
L-sérine	5,37	0,90
L-thréonine	2,76	0,46
L-tryptophane	1,38	0,23
L-tyrosine	6,45	1,08
L-valine	4,01	0,67
L-carnitine	0,09	0,01
Taurine	0,18	0,03

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 mesurette/sachet)
Vitamine A, UI (µg ÉR) (25 % de bêta-carotène)	2 331 (874)	389 (146)
Vitamine D_3, UI (µg)	520 (13,0)	87,0 (2,2)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	23,0 (15,4)	3,8 (2,6)
Vitamine K, µg	90,0	15,0
Thiamine, mg	2,1	0,35
Riboflavine, mg	1,9	0,32
Vitamine B_6, mg	2,3	0,38
Vitamine B_{12}, µg	4,2	0,70
Niacine, mg	25,0	4,1
Acide folique, µg	700	117
Acide pantothénique, mg	8,7	1,5
Biotine, µg	53,0	8,8
Vitamine C, mg	113	19,0
Choline, mg	425	71,0
Inositol, mg	129	22,0
Minéraux		
Calcium, mg	1 300	217
Phosphore, mg	1 194	199
Magnésium, mg	310	52,0
Fer, mg	18,0	3,0
Zinc, mg	12,0	2,0
Manganèse, mg	2,7	0,45
Cuivre, µg	1 300	217
Iode, µg	180	30,0
Molybdène, µg	60,0	10,0
Chrome, µg	40,0	6,7
Sélénium, µg	83,0	14,0
Sodium, mg	600	100
Potassium, mg	1 162	194
Chlorure, mg	900	150

Ingrédients :

Non aromatisé : L-asparagine monohydraté, L-glutamine, sucre, L-tyrosine, acétate de L-lysine, L-alanine, L-leucine, L-sérine, L-arginine, L-valine, phosphate tricalcique, glycine, L-proline, L-thréonine, extraits secs de sirop de maïs, L-isoleucine, phosphate de magnésium. Contient 2 % ou moins de : citrate de sodium, L-histidine, L-méthionine, L-tryptophane, phosphate dipotassique, chlorure de potassium, bitartrate de choline, lécithine de soya, L-cystine, chlorure de sodium, dioxyde de silicium, amidon de maïs modifié, taurine, huile de canola, maltodextrine, huile de carthame, acide ascorbique, inositol, L-carnitine, orthophosphate ferrique, acétate de vitamine E, huile de noix de coco, huile de soya, sulfate de zinc, niacinamide, sucralose*, D-pantothénate de calcium, vitamine K_1, palmitate d'ascorbyle, tocophérols mixtes, extrait de romarin, sulfate de manganèse, palmitate de vitamine A, D-biotine, vitamine D_3, bêta-carotène, sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de potassium, mononitrate de thiamine, riboflavine, sélénite de sodium, acide folique, vitamine B_{12}, chlorure de chrome, molybdate de sodium.

CONTIENT : Soya, huile de noix de coco.

Vanille : L-asparagine monohydraté, L-glutamine, sucre, L-tyrosine, acétate de L-lysine, L-alanine, L-leucine, L-sérine, L-arginine, L-valine, phosphate tricalcique, glycine, L-proline, L-thréonine, arôme naturel et artificiel, L-isoleucine, phosphate de magnésium. Contient 2 % ou moins de : citrate de sodium, L-histidine, L-méthionine, L-tryptophane, phosphate dipotassique, chlorure de potassium, bitartrate de choline, lécithine de soya, L-cystine, chlorure de sodium, taurine, acide ascorbique, inositol, dioxyde de silicium, L-carnitine, orthophosphate ferrique, sucralose**, acétate de vitamine E, sulfate de zinc, niacinamide, D-pantothénate de calcium, vitamine K_1, sulfate de manganèse, palmitate de vitamine A, D-biotine, vitamine D_3, bêta-carotène, sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de potassium, mononitrate de thiamine, riboflavine, sélénite de sodium, acide folique, vitamine B_{12}, chlorure de chrome, molybdate de sodium.

CONTIENT : Soya.

* Contient 3 mg de sucralose par 16,7 g de poudre
** Contient 11,7 mg de sucralose par 16,7 g de poudre

PhenylAde[MD] MTE Amino Acid Blend

Une préparation en poudre sans phénylalanine pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans phénylalanine
- Seulement 40 calories par portion
- Offert en boîtes et en sachets
- Contient du calcium, du phosphore, du magnésium, du chrome, du molybdène et du sélénium ajoutés
- 100 g de poudre fournit 78 g d'équivalent en protéines
- Déplacement : 0,47 ml/g

Indication :

- Phénylcétonurie

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte/sachet
BOÎTES		
120448	4 x 454 g (1 lb)	1 421
SACHETS		
119862	30 x 12,8 g (0,45 oz)	40

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 mesure/ sachet)
Calories	312	40
Équivalent en protéines, g	78,0	10,0
Lipides, g	0	0
Glucides, g	0	0
Acides aminés, g		
L-alanine	7,23	0,93
L-arginine	6,13	0,79
L-asparagine	10,87	1,40
L-cystine	1,05	0,14
L-glutamine	12,11	1,55
Glycine	4,72	0,61
L-histidine	1,96	0,25
L-isoleucine	3,24	0,42
L-leucine	6,98	0,90
L-lysine	5,67	0,73
L-méthionine	1,89	0,24
L-phénylalanine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-proline	4,72	0,61
L-sérine	6,98	0,90
L-thréonine	3,59	0,46
L-tryptophane	1,79	0,23
L-tyrosine	8,39	1,08
L-valine	5,22	0, 67
L-carnitine	0,11	0,01
Taurine	0,24	0,03
Minéraux		
Calcium, mg	570	73,0
Chlorure, mg	Trace	Trace
Chrome, µg	23,0	3,0
Magnésium, mg	123	15,8
Molybdène, µg	23,0	3,0
Phosphore, mg	570	73,0
Sodium, mg	Trace	Trace
Sélénium, µg	26,0	3,3

Ingrédients :

L-asparagine monohydraté, L-glutamine, L-tyrosine, acétate de L-lysine, L-alanine, L-leucine, L-sérine, L-arginine, L-valine, glycine, L-proline, L-thréonine, L-isoleucine, phosphate dicalcique, L-histidine, L-méthionine, L-tryptophane, L-cystine, phosphate de magnésium (dibasique), dioxyde de silicium, taurine, L-carnitine, citrate de calcium, chlorure de chrome, sélénite de sodium, molybdate de sodium.

Remarque : Doit être combiné à un supplément de vitamines et de minéraux approprié lorsque pris comme seule source d'acides aminés de protéines.

PhenylAde[MD] PheBLOC[MC] LNAA

Une préparation en poudre sans phénylalanine contenant les acides aminés essentiels restants (grands acides aminés neutres et lysine) pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les personnes de plus de 12 ans.

Principales caractéristiques :

- Sans phénylalanine
- Procure un complément complet d'acides aminés essentiels (sans phénylalanine)
- Simplifie la prise en charge du régime alimentaire
- Convient à ceux qui utilisent actuellement de la saproptérine et préfèrent une préparation pour la PCU non liquide
- Une option pour les diagnostics tardifs ou ceux qui n'ont jamais été traités au moyen d'un régime alimentaire

Indication :

- Phénylcétonurie

Précautions :

- Ne pas utiliser lorsqu'une grossesse est planifiée ou pendant la grossesse
- Consulter un médecin avant d'utiliser des médicaments sérotoninergiques

Pour des détails sur l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par caisse
123567	110 x 3 g (0,11 oz)	1 100

Information nutritionnelle :

Nutriments	Par sachet (3 g de poudre)	Pour 2 sachets (6 g de poudre)
Calories	10	20
Équivalent en protéines, g	2,2	4,4
Lipides, g	0	0
Glucides, g	0,34	0,68
Minéraux		
Sodium, mg	Trace	Trace
Chlorure, mg	28,0	56,0
Acides aminés, g		
L-arginine	0,17	0,34
L-histidine	0,16	0,31
L-isoleucine	0,16	0,32
L-leucine	0,15	0,31
L-lysine	0,12	0,23
L-méthionine	0,25	0,50
L-phénylalanine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-thréonine	0,16	0,33
L-tryptophane	0,31	0,61
L-tyrosine	0,98	1,97
L-valine	0,16	0,32

Ingrédients :

L-tyrosine, maltodextrine, L-tryptophane, L-méthionine, L-arginine, L-thréonine, L-valine, L-isoleucine, L-histidine, L-leucine et monochlorhydrate de L-lysine

Remarque : Doit être combiné à un supplément de vitamines et de minéraux approprié lorsque pris comme seule source d'acides aminés de protéines.

XPhe Maxamum[MD]

Une préparation en poudre sans phénylalanine pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants plus âgés et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans phénylalanine
- Contient un mélange équilibré de tous les autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides, de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments
- Préparation assurant l'ANREF selon l'âge
- XPhe Maxamum fournit 40 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Offert en deux variétés : orange et non aromatisé
- Contient < 1 g de lipides par 10 g d'équivalent en protéines ce qui permet une plus grande flexibilité pour modifier l'apport énergétique
- Offert en boîtes ou en sachets
- Osmolalité (mOsm/kg d'H_2O) :

Dilution	Non aromatisé	Orange
1 dans 7	770	790
1 dans 5	1 090	1 140

- Déplacement : 0,6 ml/g

Indication :

- Phénylcétonurie

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte/sachet
BOÎTES		
49851 – Orange	6 x 454 g (1 lb)	1 385
49850 – Non aromatisé	6 x 454 g (1 lb)	1 385
SACHETS		
49458 – Orange	30 x 50 g (1,8 oz)	153
49459 – Non aromatisé	30 x 50 g (1,8 oz)	153

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	305	76
Équivalent en protéines, g	40	10
Lipides, g	< 1	< 0,25
Glucides, g	34	8,5
Acides aminés, g		
L-alanine	1,6	0,40
L-arginine	3	0,75
Acide L-aspartique	2,8	0,70
L-cystine	1,1	0,28
Glycine	2,8	0,70
L-histidine	1,7	0,43
L-isoleucine	2,7	0,68
L-leucine	4,6	1,15
L-lysine	3,5	0,88
L-méthionine	0,73	0,18
L-phénylalanine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-proline	3,2	0,80
L-sérine	2	0,50
L-thréonine	2,2	0,55
L-tryptophane	0,89	0,22
L-tyrosine	4	1,00
L-valine	2,9	0,73
L-carnitine	0,039	0,01
Taurine	0,14	0,04
L-glutamine	4,9	1,23

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	2 228 (669)	557 (167)
Vitamine D_3, UI (µg)	332 (8,3)	83,0 (2,1)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	18,3 (12,3)	4,6 (3,1)
Vitamine K, µg	82,0	20,5
Thiamine, mg	0,91	0,23
Riboflavine, mg	0,97	0,24
Vitamine B_6, mg	1,6	0,40
Vitamine B_{12}, µg	3,1	0,78
Niacine, mg	5,7	1,4
Acide folique, µg	491	123
Acide pantothénique, mg	4,9	1,2
Biotine, µg	24,5	6,1
Vitamine C, mg	62,0	15,5
Choline, mg	430	108
Inositol, mg	80,0	20,0
Minéraux		
Calcium, mg	1 183	296
Phosphore, mg	1 137	284
Magnésium, mg	306	76,5
Fer, mg	14,7	3,7
Zinc, mg	9,0	2,3
Manganèse, mg	1,8	0,45
Cuivre, µg	820	205
Iode, µg	131	32,8
Molybdène, µg	37,0	9,3
Chrome, µg	26,0	6,5
Sélénium, µg	58,0	14,5
Sodium, mg	560	140
Potassium, mg	700	175
Chlorure, mg	560	140

Ingrédients :

Sucre, L-arginine L-aspartate, acétate de L-lysine, L-glutamine, L-leucine, L-tyrosine, glycérophosphate de calcium, L-proline, L-valine, glycine, L-isoleucine, L-thréonine, citrate tripotassique, hydrogénophosphate de magnésium et 2 % ou moins de chacun des éléments suivants : L-sérine, L-histidine, L-alanine, phosphate de calcium dibasique, bitartrate de choline, L-cystine, phosphate tricalcique, chlorure de sodium, N-acétyl-L-méthionine, citrate trisodique, L-tryptophane, lécithine de soja, L-aspartate de magnésium, taurine, acide L-ascorbique, M-inositol, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, sélénite de sodium, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, acétate de vitamine A, acide folique, iodure de potassium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, phylloquinone, D-biotine, vitamine D_3, cyanocobalamine.

La version aromatisée à l'**orange** contient également : Acide citrique et 2 % ou moins de chacun des éléments suivants : arôme artificiel, édulcorant artificiel : acésulfame de potassium*, colorants artificiels (bêta-carotène, bétanine).

CONTIENT : Soya.

* Contient 13 mg d'acésulfame de potassium par 100 ml (dilution 1:7) ou 17,6 mg par 100 ml (dilution 1:5)

Veuillez consulter l'étiquette des produits individuels pour connaître l'ordre exact des ingrédients.

PKU Lophlex[MD] LQ

Une préparation prête à boire sans phénylalanine* contenant des acides aminés, des vitamines et des minéraux, à base de jus de fruits (fait de concentré) avec un arôme naturel; pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les personnes de 4 ans et plus, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans phénylalanine
- Faible volume; fournit 20 g d'équivalent en protéines dans seulement 125 ml (4,2 oz liq.)
- Pratique et prêt à boire
- Fabriqué avec du vrai jus de fruits fait de concentré
- Contient un mélange équilibré d'autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides, de vitamines et de minéraux
- Fournit 150 mg de DHA par sachet
- Offert en trois variétés : orange juteuse, explosion de petits fruits et fruits tropicaux juteux
- Osmolalité (à 0,96 kcal/ml) : 2 460 mOsm/kg d'H_2O

Indication :

- Phénylcétonurie

Pour des détails sur l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par sachet
86051 - Orange juteuse	30 x 125 ml (4,2 oz liq.)	120
86021 - Explosion de petits fruits	30 x 125 ml (4,2 oz liq.)	120
86055 - Fruits tropicaux juteux	30 x 125 ml (4,2 oz liq.)	120

* Peut contenir des traces de phénylalanine (PHE) provenant de jus de fruits (fait de concentré).

Information nutritionnelle :

Nutriments	Par sachet (125 ml)	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	120	60
Équivalent en protéines, g	20,0	10,0
Lipides, g	0,44	0,22
DHA, mg	150	75,0
Glucides, g	9,3	4,7
dont fibres, g	0,50	0,25
Acides aminés, g		
L-alanine	1,16	0,58
L-arginine	2,00	1,00
Acide L-aspartique	1,75	0,88
L-cystine	0,51	0,26
Glycine	1,88	0,94
L-histidine	0,79	0,40
L-isoleucine	1,24	0,62
L-leucine	2,13	1,1
L-lysine	1,63	0,82
L-méthionine	0,34	0,17
L-phénylalanine	Trace*	Trace*
L-proline	2,00	1,00
L-sérine	1,09	0,55
L-thréonine	1,04	0,52
L-tryptophane	0,41	0,21
L-tyrosine	1,88	0,94
L-valine	1,38	0,69
L-carnitine	0,01	0,01
Taurine	0,10	0,05

Vitamines	Par sachet (125 ml)	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	949 (285)	475 (143)
Vitamine D_3, UI (µg)	320 (8,0)	160 (4,0)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	4,8 (3,2)	2,4 (1,6)
Vitamine K, µg	24,9	12,5
Thiamine, mg	0,54	0,27
Riboflavine, mg	0,50	0,25
Vitamine B_6, mg	0,58	0,29
Vitamine B_{12}, µg	1,8	0,90
Niacine, mg	7,1	3,6
Acide folique, mg	120	60,0
Acide pantothénique, mg	1,8	0,90
Biotine, µg	53,4	26,7
Vitamine C, mg	17,8	8,9
Choline, mg	153	76,5
Inositol, mg	40,6	20,3
Minéraux		
Calcium, mg	319	160
Phosphore, mg	244	122
Magnésium, mg	96,3	48,2
Fer, mg	5,1	2,6
Zinc, mg	3,8	1,9
Manganèse, µg	0,56	0,28
Cuivre, µg	56,3	28,2
Iode, µg	56,3	28,2
Molybdène, µg	25,0	12,5
Chrome, µg	10,8	5,4
Sélénium, µg	26,8	13,4
Sodium, mg	< 25,0	< 12,5
Potassium, mg	90,0	45,0
Chlorure, mg	< 25,0	< 12,5

Ingrédients :

Eau et moins de 2 % de chacun des éléments suivants : L-leucine, acide citrique, L-proline, L-arginine, glycine, L-tyrosine, acétate de L-lysine, L-valine, acide L-aspartique, L-isoleucine, phosphate dicalcique, L-alanine, L-sérine, L-thréonine, L-histidine, L-lysine, L-aspartate, maltodextrine, acétate de magnésium, L-cystine, bitartrate de choline, L-tryptophane, sucre, huile de *C. cohnii***, N-acétyl-L-méthionine, cellulose microcristalline, acide L-ascorbique, taurine, L-méthionine, gomme de guar, lécithine de tournesol, gomme de xanthane, M-inositol, sorbate de potassium (agent de conservation), lactate ferreux, gomme de cellulose, édulcorant artificiel : acésulfame de potassium, L-carnitine, benzoate de sodium (agent de conservation), sulfate de zinc, niacinamide, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, palmitate de vitamine A, riboflavine, acide folique, iodure de potassium, palmitate d'ascorbyle, tocophérols mixtes, molybdate de sodium, D-biotine, sélénite de sodium, chlorure de chrome, phylloquinone, vitamine D_3, cyanocobalamine.

** Une source d'acide docosahexaénoïque (DHA)

La version aromatisée à l'**orange juteuse** contient également : Jus d'orange fait de concentré (45,5 %), extraits secs de sirop de maïs et moins de 2 % des éléments suivants : arôme naturel, sucralose et acésulfame de potassium[£]. Contient 45,5 % de jus.
La version aromatisée à l'**explosion de petits fruits** contient également : Jus de pomme fait de concentré (34,1 %), jus de raisin fait de concentré (6,9 %), jus de cassis fait de concentré (2,5 %) et moins de 2 % des éléments suivants : jus de baie de sureau fait de concentré (0,6 %), arôme naturel, concentré (pomme, cassis, radis), sucralose et acésulfame de potassium[£]. Contient 44,1 % de jus.
La version aromatisée aux **fruits tropicaux juteux** contient également : Jus d'orange fait de concentré (18 %), purée de mangue faite de concentré (6,4 %), jus de mandarine fait de concentré (4,0 %), extraits secs de sirop de maïs et arôme artificiel, acésulfame de potassium[£]. Contient 28,4 % de jus.

[£] Contient 31,3 mg de sucralose et 25 mg d'acésulfame de potassium par 125 ml.
[‡] Contient 25 mg d'acésulfame de potassium par 125 ml
Veuillez consulter l'étiquette des produits individuels pour connaître l'ordre exact des ingrédients.

PKU Lophlex[MD] en poudre

Une préparation en poudre à faible volume sans phénylalanine pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants plus âgés et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans phénylalanine
- Faible volume
- Contient des vitamines, des minéraux et des oligoéléments
- Préparation assurant l'ANREF selon l'âge
- Lophlex fournit 10 g d'équivalent en protéines par sachet à portion individuelle
- Offert en deux variétés : petits fruits et orange
- Osmolalité (mOsm/kg d'H_2O) :

Dilution	Orange	Petits fruits
1 dans 5	1 390	1 340

Indication :

- Phénylcétonurie

Pour des détails sur l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par sachet
49418 – Petits fruits	30 x 14,3 g (0,5 oz)	41
49417 – Orange	30 x 14,3 g (0,5 oz)	41

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 sachet)
Calories	286	41
Équivalent en protéines, g	70,0	10,0
Lipides, g	0,20	0,03
Glucides, g	1,0	0,14
Acides aminés, g		
L-alanine	3,3	0,47
L-arginine	5,8	0,83
Acide L-aspartique	5,4	0,77
L-cystine	2,2	0,31
Glycine	5,1	0,73
L-histidine	3,3	0,47
L-isoleucine	5,1	0,73
L-leucine	8,7	1,24
L-lysine	5,9	0,84
L-méthionine	1,4	0,20
L-phénylalanine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-proline	6,2	0,89
L-sérine	3,8	0,54
L-thréonine	4,3	0,61
L-tryptophane	1,7	0,24
L-tyrosine	7,8	1,12
L-valine	5,6	0,80
L-carnitine	0,06	0,01
Taurine	0,11	0,02
L-glutamine	3,95	0,56

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 sachet)
Vitamine A, UI (µg ÉR)	3 896 (1 170)	557 (167)
Vitamine D_3, UI (µg)	580 (14,5)	82,9 (2,1)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	32,0 (21,5)	4,6 (3,1)
Vitamine K, µg	143	20,4
Thiamine, mg	1,6	0,23
Riboflavine, mg	1,7	0,24
Vitamine B_6, mg	2,8	0,4
Vitamine B_{12}, µg	5,5	0,79
Niacine, mg	10,0	1,4
Acide folique, µg	860	123
Acide pantothénique, mg	8,6	1,2
Biotine, µg	43,0	6,1
Vitamine C, mg	110	15,7
Choline, mg	720	103
Inositol, mg	140	20,0
Minéraux		
Calcium, mg	2 070	296
Phosphore, mg	1 990	285
Magnésium, mg	535	76,5
Fer, mg	25,7	3,7
Zinc, mg	15,8	2,3
Manganèse, mg	3,1	0,44
Cuivre, µg	1 430	204
Iode, µg	229	32,7
Molybdène, µg	65,0	9,3
Chrome, µg	46,0	6,6
Sélénium, µg	101	14,4
Sodium, mg	< 20,0	< 3,0
Potassium, mg	< 40,0	< 6,0
Chlorure, mg	< 1,0	< 1,0

Ingrédients :

Petits fruits : L-lysine, L-aspartate, L-leucine, L-tyrosine, L-proline, L-arginine, phosphate tricalcique, L-valine, glycine, L-isoleucine, L-thréonine, hydrogénophosphate de magnésium, L-glutamine, L-sérine, L-histidine, L-alanine, acide citrique, L-cystine, N-acétyl-L-méthionine, bitartrate de choline, L-tryptophane, phosphate de calcium monobasique, gomme de guar, arôme artificiel, lécithine de soya, acide L-ascorbique, M-inositol, édulcorant artificiel : acésulfame de potassium*, taurine, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, acétate de vitamine A, acide folique, jus de betterave (pour la couleur), iodure de potassium, chlorure de chrome, sélénite de sodium, molybdate de sodium, phylloquinone, D-biotine, vitamine D_3, cyanocobalamine.

Orange : L-lysine, L-aspartate, L-leucine, L-tyrosine, L-proline, L-arginine, phosphate tricalcique, L-valine, glycine, L-isoleucine, hydrogénophosphate de magnésium, L-thréonine, L-glutamine, L-sérine, L-histidine, L-alanine, acide citrique, L-cystine, N-acétyl-L-méthionine, bitartrate de choline, L-tryptophane, phosphate de calcium monobasique, arôme artificiel, gomme de guar, lécithine de soya, acide L-ascorbique, M-inositol, édulcorant artificiel : acésulfame de potassium*, taurine, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, acétate de vitamine A, jus de betterave (pour la couleur), bêta-carotène (pour la couleur), acide folique, iodure de potassium, chlorure de chrome, sélénite de sodium, molybdate de sodium, phylloquinone, D-biotine, vitamine D_3, cyanocobalamine.

CONTIENT : Soya.

* Contient 30 mg d'acésulfame de potassium par 100 ml (dilution 1:5) ou 50 mg par 100 ml (dilution 1:3)

Phlexy-10^{MD} Drink Mix

Une préparation en poudre sans phénylalanine pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans phénylalanine
- Offert en deux variétés : cassis/pomme et surprise tropicale
- Chaque sachet contient 8,33 g d'équivalent en protéines
- Sachets à portion unique prémesurée pratiques
- Osmolalité (mOsm/kg d'H_2O) :

Dilution	Cassis/ pomme	Surprise tropicale
1 dans 5	1 172	1 140

Indication :

- Phénylcétonurie

Pour des détails sur l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par sachet
49161 – Drink Mix (cassis/pomme)	30 x 20 g (0,7 oz)	69
49257 – Drink Mix (surprise tropicale)	30 x 20 g (0,7 oz)	69

Information nutritionnelle :

	Par sachet de 20 g
Nutriments	
Calories	69
Équivalent en protéines, g	8,33
Lipides, g	Aucun ajout
Saturés, g	Aucun ajout
Monoinsaturés, g	Aucun ajout
Polyinsaturés, g	Aucun ajout
Glucides, g	8,8
Fibres, g	Aucun ajout
Acides aminés, g	
L-alanine	0,41
L-arginine	0,72
Acide L-aspartique	0,68
L-cystine	0,27
Glycine	0,64
L-histidine	0,41
L-isoleucine	0,64
L-leucine	1,09
L-lysine	0,74
L-méthionine	0,17
L-phénylalanine	Aucun ajout
L-proline	0,77
L-sérine	0,47
L-thréonine	0,54
L-tryptophane	0,22
L-tyrosine	0,97
L-valine	0,70
L-carnitine	0,007
Taurine	0,014
L-glutamine	0,50

Ingrédients :

Cassis/pomme : Sucrose, aspartate de L-lysine, L-leucine, L-tyrosine, arômes artificiels, L-proline, L-arginine, L-valine, L-isoleucine, glycine, acide malique, L-thréonine, L-glutamine, extraits secs de sirop de maïs, L-sérine, L-histidine, L-alanine, L-cystine, N-acétyl-L-méthionine, L-tryptophane, lécithine de soya, taurine, L-carnitine, édulcorant artificiel : saccharinate de sodium*, colorant artificiel.

Surprise tropicale : Sucrose, aspartate de L-lysine, arômes artificiels, L-leucine, L-tyrosine, L-proline, L-arginine, L-valine, acide citrique, glycine, L-isoleucine, L-thréonine, L-glutamine, extraits secs de sirop de maïs, L-sérine, L-histidine, L-alanine, L-cystine, N-acétyl-L-méthionine, L-tryptophane, lécithine de soya, édulcorant artificiel : acésulfame de potassium**, taurine, L-carnitine, colorant artificiel.

CONTIENT : Soya.

Doit être combiné à un supplément de vitamines et de minéraux approprié lorsque pris comme seule source d'acides aminés de protéines.

* Contient 4 mg de saccharinate de sodium par 100 ml (dilution 1:5)

** Contient 40 mg d'acésulfame de potassium par 100 ml (dilution 1:5)

Veuillez consulter l'étiquette des produits individuels pour connaître l'ordre exact des ingrédients.

Complex MSD[MD] Junior

Une préparation en poudre sans valine, sans leucine et sans isoleucine pour la prise en charge nutritionnelle de la leucinose chez les jeunes enfants.

Principales caractéristiques :

- Sans leucine, sans valine et sans isoleucine
- Profil d'acides aminés spécialement conçu pour la prise en charge de la leucinose; a fait l'objet de deux études de recherche clinique†
- Contient du DHA et de l'ARA
- Vitamines et minéraux essentiels pour répondre aux besoins des jeunes enfants atteints de leucinose
- Arôme neutre et doux
- Fournit 13 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Déplacement : 0,7 ml/g

Indication :

- Leucinose

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
120911	4 x 400 g (14,1 oz)	1 976

† Strauss KA et coll. *Mol Genet Metab.* 2010;99:333-45 et Strauss KA, et al. *Mol Genet Metab.* 2020;129:193-206.

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g de poudre	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 mesurette)
Calories	494	380
Équivalent en protéines, g	13,0	10,0
Lipides, g	29,0	22,3
Lipides saturés, g	10,2	7,8
Monoinsaturés, g	13,4	10,3
Polyinsaturés, g	5,0	3,85
Acide linoléique, mg	3 730	2 869
Glucides, g	46,0	35,4
Acides aminés, g		
L-alanine	1,40	1,08
L-arginine	0,66	0,51
L-asparagine	0,75	0,58
L-cystine	0,29	0,22
Acide L-glutamique	0,45	0,35
L-glutamine	3,71	2,85
Glycine	0,35	0,27
L-histidine	0,92	0,71
L-isoleucine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-leucine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-lysine	1,17	0,90
L-méthionine	0,38	0,29
L-phénylalanine	1,14	0,88
L-proline	0,76	0,58
L-sérine	0,58	0,45
L-thréonine	0,94	0,72
L-tryptophane	0,69	0,53
L-tyrosine	1,14	0,88
L-valine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-carnitine	0,030	0,023
Taurine	0,070	0,054

Nutriments	Pour 100 g de poudre	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 mesurette)
Vitamine A, UI (µg ÉR)	1 187 (356)	913 (274)
Vitamine D_3, UI (µg)	429 (10,7)	330 (8,2)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	13,8 (9,2)	10,6 (7,1)
Vitamine K, µg	62,0	47,7
Thiamine, mg	1,1	0,85
Riboflavine, mg	0,81	0,62
Vitamine B_6, mg	0,78	0,60
Vitamine B_{12}, µg	2,0	1,5
Niacine, mg	5,8	4,5
Acide folique, µg	140	108
Acide pantothénique, mg	3,4	2,6
Biotine, µg	36,0	27,7
Vitamine C, mg	78,0	60,0
Choline, mg	244	188
Inositol, mg	148	114
Minéraux		
Calcium, mg	596	458
Phosphore, mg	444	341
Magnésium, mg	68,0	52,3
Fer, mg	14,7	11,3
Zinc, mg	29,0	22,3
Manganèse, mg	0,44	0,34
Cuivre, µg	952	732
Iode, µg	96,0	73,8
Molybdène, µg	15,8	12,2
Chrome, µg	16,2	12,5
Sélénium, µg	44,0	33,8
Sodium, mg	303	233
Potassium, mg	797	613
Chlorure, mg	384	295

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, maltodextrine, amidon de maïs modifié, huile de canola, huile de carthame, huile de noix de coco, L-glutamine, huile de soya. Contient 2 % ou moins de : phosphate tricalcique, acétate de L-lysine, L-alanine, L-phénylalanine, L-tyrosine, citrate de sodium, phosphate dipotassique, L-thréonine, L-histidine, L-asparagine monohydraté, L-proline, L-tryptophane, bitartrate de choline, L-arginine, palmitate d'ascorbyle, tocophérols mixtes, chlorure de magnésium, extrait de romarin, L-sérine, citrate de potassium, chlorure de potassium, acide L-glutamique, L-méthionine, glycine, dioxyde de silicium, L-cystine, huile de *C. cohnii**, extraits solides de sirop de glucose, mono- et diglycérides, huile de *M. alpina***, inositol, acide ascorbique, sulfate de zinc, taurine, sulfate de fer, huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique, mannitol, L-carnitine, acétate de vitamine E, glycérol, mono- et distéarate, arôme naturel, polyphosphate de sodium, lécithine de tournesol, ascorbate de sodium, vitamine K_1, niacinamide, palmitate de vitamine A, vitamine D_3, D-pantothénate de calcium, D-biotine, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, chlorhydrate de thiamine, iodure de potassium, chlorhydrate de pyridoxine, sélénite de sodium, riboflavine, vitamine B_{12}, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium.

CONTIENT : Huile de noix de coco, huile de soya.

* Une source d'acide docosahexaénoïque (DHA)
** Une source d'acide arachidonique (ARA)

Complex MSD[MD] Essential

Une préparation en poudre sans valine, sans leucine et sans isoleucine pour la prise en charge nutritionnelle de la leucinose chez les enfants et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans leucine, sans valine et sans isoleucine
- Profil d'acides aminés spécialement conçu pour la prise en charge de la leucinose; a fait l'objet de deux études de recherche clinique[†]
- Préparation complète contenant des vitamines et des minéraux essentiels
- Fournit 25 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Arôme de vanille
- Osmolalité (à 0,63 kcal/ml) : 813 mOsm/kg d'H_2O
  Selon la dilution de 40 g de poudre (1 mesurette) dans 210 ml (7 oz liq.) d'eau
- Déplacement : 0,75 ml/g

Indication :

- Leucinose

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
120460	4 x 454 g (1 lb)	1 725

[†] Strauss KA et coll. *Mol Genet Metab.* 2010;99:333-45 et Strauss KA, et al. *Mol Genet Metab.* 2020;129:193-206.

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g de poudre	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 mesurette)
Calories	380	152
Équivalent en protéines, g	25,0	10,0
Lipides, g	12,0	5,0
Lipides saturés, g	2,8	1,1
Monoinsaturés, g	6,3	2,5
Polyinsaturés, g	2,7	1,1
Acide linoléique, mg	1 733	693
Acide α-linolénique, mg	662	265
Glucides, g	47,0	19,0
Fibres	3,9	1,5
Acides aminés, g		
L-alanine	2,70	1,08
L-arginine	1,28	0,51
L-asparagine	1,45	0,58
L-cystine	0,56	0,22
Acide L-glutamique	0,86	0,35
L-glutamine	7,17	2,87
Glycine	0,67	0,27
L-histidine	1,79	0,71
L-isoleucine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-leucine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-lysine	2,27	0,91
L-méthionine	0,74	0,30
L-phénylalanine	2,20	0,88
L-proline	1,48	0,59
L-sérine	1,12	0,45
L-thréonine	1,81	0,72
L-tryptophane	1,33	0,53
L-tyrosine	2,20	0,88
L-valine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-carnitine	0,06	0,02
Taurine	0,14	0,06

Nutriments	Pour 100 g de poudre	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 mesurette)
Vitamine A, UI (µg ÉR) (25 % de bêta-carotène)	1 700 (637)	680 (255)
Vitamine D_3, UI (µg)	600 (15,0)	240 (6,0)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	18,4 (12,3)	7,3 (4,9)
Vitamine K, µg	50,0	20,0
Thiamine, mg	1,5	0,60
Riboflavine, mg	1,5	0,60
Vitamine B_6, mg	1,3	0,52
Vitamine B_{12}, µg	2,0	0,80
Niacine, mg	12,0	4,8
Acide folique, µg	250	100
Acide pantothénique, mg	5,5	2,2
Biotine, µg	30,0	12,0
Vitamine C, mg	60,0	24,0
Choline, mg	100	40,0
Inositol, mg	40,0	16,0
Minéraux		
Calcium, mg	886	355
Phosphore, mg	864	346
Magnésium, mg	200	80,0
Fer, mg	13,0	5,0
Zinc, mg	12,0	4,8
Manganèse, mg	1,5	0,60
Cuivre, µg	1 000	400
Iode, µg	120	48,0
Molybdène, µg	75,0	30,0
Chrome, µg	40,0	16,1
Sélénium, µg	100	40,0
Sodium, mg	600	240
Potassium, mg	1 301	520
Chlorure, mg	860	344

Ingrédients :

Sucre, L-glutamine, amidon alimentaire modifié, dextrine, huile de canola, maltodextrine, huile de carthame, acétate de L-lysine, L-alanine, arôme naturel et artificiel, phosphate tricalcique, citrate de potassium, L-phénylalanine, L-tyrosine. Contient 2 % ou moins de : L-thréonine, L-histidine, L-asparagine monohydratée, phosphate de magnésium, chlorure de sodium, L-proline, phosphate dipotassique, L-tryptophane, L-arginine, L-sérine, huile de noix de coco, huile de soya, acide L-glutamique, L-méthionine, glycine, L-cystine, huile de lin, dioxyde de titane, bitartrate de choline, palmitate d'ascorbyle, tocophérols mixtes, extrait de romarin, citrate de sodium, taurine, acide ascorbique, L-carnitine, sulfate de fer, inositol, acétate de vitamine E, sulfate de zinc, phosphate de calcium, niacinamide, gluconate de cuivre, D-pantothénate de calcium, vitamine D_3, palmitate de vitamine A, vitamine K_1, sulfate de manganèse, mono- et diglycérides, D-biotine, bêta-carotène, chlorure de chrome, sélénite de sodium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, iodure de potassium, mononitrate de thiamine, acide folique, molybdate de sodium, vitamine B_{12}.

CONTIENT : Huile de noix de coco, huile de soya.

Complex MSD[MD] Amino Acid Blend

Une préparation en poudre sans isoleucine, sans leucine et sans valine pour la prise en charge nutritionnelle de la leucinose chez les enfants et les adultes.

Principales caractéristiques :

- Sans leucine, sans valine et sans isoleucine
- Profil d'acides aminés spécialement conçu pour la prise en charge de la leucinose; a fait l'objet de deux études de recherche clinique[†]
- Ne contient pas de lipides, de glucides, de vitamines ou de minéraux
- 40 calories par portion
- Fournit 81 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Non aromatisé
- Déplacement : 0,48 ml/g

Indication :

- Leucinose

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
120459	4 x 454 g (1 lb)	1 466

[†] Strauss KA et coll. *Mol Genet Metab.* 2010;99:333-45 et Strauss KA, et al. *Mol Genet Metab.* 2020;129:193-206.

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g de poudre	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 mesurette)
Calories	323	40
Équivalent en protéines, g	81,0	10,0
Lipides, g	0	0
Glucides, g	0	0

Acides aminés, g	Pour 100 g de poudre	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 mesurette)
L-alanine	8,72	1,08
L-arginine	4,13	0,51
L-asparagine	4,67	0,58
L-cystine	1,80	0,22
Acide L-glutamique	2,79	0,35
L-glutamine	23,12	2,87
Glycine	2,16	0,27
L-histidine	5,76	0,71
L-isoleucine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-leucine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-lysine	7,32	0,91
L-méthionine	2,38	0,30
L-phénylalanine	7,08	0,88
L-proline	4,76	0,59
L-sérine	3,60	0,45
L-thréonine	5,83	0,72
L-tryptophane	4,28	0,53
L-tyrosine	7,08	0,88
L-valine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-carnitine	0,19	0,02
Taurine	0,46	0,06

Ingrédients :

L-glutamine, acétate de L-lysine, L-alanine, L-phénylalanine, L-tyrosine, L-thréonine, L-histidine, L-asparagine monohydraté, L-proline, L-tryptophane, L-arginine, L-sérine, acide L-glutamique, L-méthionine, glycine, L-cystine, taurine, dioxyde de silicium et L-carnitine.

Remarque : Doit être combiné à un supplément de vitamines et de minéraux approprié lorsque pris comme seule source d'acides aminés de protéines.

MSUD Maxamum[MD]

Une préparation en poudre sans valine, sans leucine et sans isoleucine pour la prise en charge nutritionnelle de la leucinose chez les enfants plus âgés et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans leucine, sans valine et sans isoleucine
- Contient un mélange équilibré de tous les autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides, de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments
- Préparation assurant l'ANREF selon l'âge
- Fournit 40 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Arôme d'orange
- Contient < 1 g de lipides par 10 g d'équivalent en protéines, ce qui permet une plus grande flexibilité pour modifier l'apport énergétique
- Osmolalité (mOsm/kg d'H_2O) :
  Dilution
  1 dans 7 750
  1 dans 5 1 090
- Déplacement : 0,6 ml/g

Indication :

- Leucinose

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Produit par boîte	Calories par boîte
49815	6 x 454 g (1 lb)	1 385

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	305	76
Équivalent en protéines, g	40,0	10,0
Lipides, g	< 1,0	< 0,25
Glucides, g	34,0	8,5
Acides aminés, g		
L-alanine	2,4	0,60
L-arginine	4,1	1,03
Acide L-aspartique	3,4	0,85
L-cystine	1,6	0,40
Acide L-glutamique	4,6	1,15
Glycine	3,7	0,93
L-histidine	2,3	0,58
L-isoleucine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-leucine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-lysine	4,2	1,05
L-méthionine	0,99	0,25
L-phénylalanine	2,8	0,70
L-proline	4,5	1,13
L-sérine	2,8	0,70
L-thréonine	3,1	0,78
L-tryptophane	1,3	0,33
L-tyrosine	2,8	0,70
L-valine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-carnitine	0,04	0,01
Taurine	0,14	0,04
L-glutamine	0,32	0,08

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	2 228 (669)	557 (167)
Vitamine D_3, UI (µg)	332 (8,3)	83,0 (2,1)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	18,3 (12,3)	4,6 (3,1)
Vitamine K, µg	82,0	20,5
Thiamine, mg	0,91	0,23
Riboflavine, mg	0,97	0,24
Vitamine B_6, mg	1,6	0,40
Vitamine B_{12}, µg	3,1	0,78
Niacine, mg	5,7	1,4
Acide folique, µg	491	123
Acide pantothénique, mg	4,9	1,2
Biotine, µg	24,5	6,1
Vitamine C, mg	62,0	15,5
Choline, mg	430	108
Inositol, mg	80,0	20,0
Minéraux		
Calcium, mg	1 183	296
Phosphore, mg	1 137	284
Magnésium, mg	306	76,5
Fer, mg	14,7	3,7
Zinc, mg	9,0	2,3
Manganèse, mg	1,8	0,45
Cuivre, µg	820	205
Iode, µg	131	32,8
Molybdène, µg	37,0	9,3
Chrome, µg	26,0	6,5
Sélénium, µg	58,0	14,5
Sodium, mg	560	140
Potassium, mg	700	175
Chlorure, mg	560	140

Ingrédients :

Sucre, L-lysine, L-glutamate, extraits secs de sirop de maïs, phosphate de calcium dibasique, L-proline, L-arginine, glycine, acide L-aspartique, L-thréonine, L-phénylalanine, L-tyrosine, L-sérine, arôme artificiel, L-histidine, L-alanine, acide citrique, acétate de magnésium, L-cystine, L-tryptophane, citrate tripotassique, bitartrate de choline, L-méthionine, chlorure de sodium, lécithine de soya, hydrogénophosphate de disodium, hydrogénophosphate de dipotassium, L-glutamine, phosphate tricalcique, acide L-glutamique, taurine, acide L-ascorbique, M-inositol, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, sélénite de sodium, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, acétate de vitamine A, acide folique, colorants artificiels (bêta-carotène, bétanine), iodure de potassium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, phylloquinone, D-biotine, vitamine D_3, cyanocobalamine.

CONTIENT : Soya.

MSUD Lophlex[MD] LQ

Une préparation prête à boire sans valine, sans leucine et sans isoleucine* contenant des acides aminés, des glucides, des vitamines, des minéraux et du DHA, à base de jus de fruits mélangés (faits de concentré) avec un arôme naturel; pour la prise en charge nutritionnelle de la leucinose confirmée chez les personnes de 4 ans et plus, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans leucine, sans valine et sans isoleucine
- Faible volume; fournit 20 g d'équivalent en protéines en seulement 125 ml (4,2 oz liq.)
- Pratique et prêt à boire
- À base de jus de fruits (faits de concentré) avec un arôme naturel – aucun arôme artificiel
- Contient un mélange équilibré d'autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides, de vitamines, de minéraux et de DHA
- Fournit 150 mg de DHA par sachet
- Arôme Explosion de petits fruits
- Osmolalité (à 0,96 kcal/ml) : 2 460 mOsm/kg d'H_2O

Indication :

- Leucinose

Pour des détails sur l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par sachet
82112	30 X 125 ml (4,2 oz)	120

* Peut contenir des traces de valine, leucine et d'isoleucine – provenant de jus de fruits (faits de concentré) – dont la quantité est inférieure à 1,5 mg/100 ml.

Information nutritionnelle :

Nutriments	Par sachet (125 ml)	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	120	60
Équivalent en protéines, g	20,0	10,0
Lipides, g	0,44	0,22
DHA, mg	150	75,0
Glucides, g	9,3	4,7
Fibres, g	0,50	0,25
Acides aminés, g		
L-alanine	1,40	0,70
L-arginine	1,90	0,95
Acide L-aspartique	1,45	0,73
L-cystine	1,20	0,60
Glycine	1,90	0,95
L-histidine	1,00	0,50
L-isoleucine	Trace*	Trace*
L-leucine	Trace*	Trace*
L-lysine	1,78	0,89
L-méthionine	0,43	0,22
L-phénylalanine	1,18	0,59
L-proline	2,38	1,19
L-sérine	1,65	0,83
L-thréonine	1,30	0,65
L-tryptophane	0,53	0,27
L-tyrosine	2,00	1,00
L-valine	Trace*	Trace*
L-carnitine	0,01	0,01
Taurine	0,06	0,03

Vitamines	Par sachet (125 ml)	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	949 (285)	475 (143)
Vitamine D_3, UI (µg)	320 (8,0)	160 (4,0)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	4,8 (3,2)	2,4 (1,6)
Vitamine K, µg	24,9	12,5
Thiamine, mg	0,54	0,27
Riboflavine, mg	0,50	0,25
Vitamine B_6, mg	0,58	0,29
Vitamine B_{12}, µg	1,8	0,90
Niacine, mg	7,1	3,6
Acide folique, µg	120	60,0
Acide pantothénique, mg	1,8	0,9
Biotine, µg	53,4	26,7
Vitamine C, mg	17,8	8,9
Choline, mg	153	76,5
Inositol, mg	40,6	20,3
Minéraux		
Calcium, mg	319	160
Phosphore, mg	244	122
Magnésium, mg	96,3	48,2
Fer, mg	5,1	2,6
Zinc, mg	3,8	1,9
Manganèse, mg	0,56	0,28
Cuivre, µg	563	282
Iode, µg	56,3	28,2
Molybdène, µg	25,0	12,5
Chrome, µg	10,8	5,4
Sélénium, µg	26,8	13,4
Sodium, mg	< 25,0	< 12,5
Potassium, mg	90,0	45,0
Chlorure, mg	< 25,0	< 12,5

Ingrédients :

Eau, jus de pomme fait de concentré (34,1 %), jus de raisin fait de concentré (6,9 %), jus de cassis fait de concentré (2,5 %), acétate de L-lysine, L-proline, acide citrique, L-tyrosine, L-arginine, glycine, L-sérine, acide L-aspartique, L-alanine, L-thréonine, extraits secs de sirop de maïs, L-cystine, L-phénylalanine, phosphate dicalcique, L-histidine, jus de baie de sureau fait de concentré (0,6 %), maltodextrine, acétate de magnésium, N-acétyl-L-méthionine, L-tryptophane, bitartrate de choline, huile de *C. cohnii*[**], sucre, cellulose microcristalline, arôme naturel, concentrés de fruits (pomme, cassis, radis), acide L-ascorbique, taurine, gomme de guar, lécithine de tournesol, gomme de xanthane, M-inositol, sorbate de potassium (agent de conservation), édulcorant artificiel : sucralose[£], lactate ferreux, édulcorant artificiel : acésulfame de potassium[‡], benzoate de sodium (agent de conservation), sulfate de zinc, L-carnitine, niacinamide, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, palmitate de vitamine A, riboflavine, acide folique, iodure de potassium, palmitate d'ascorbyle, tocophérols mixtes, molybdate de sodium, D-biotine, sélénite de sodium, chlorure de chrome, phylloquinone, vitamine D_3, cyanocobalamine.

** Une source d'acide docosahexaénoïque (DHA)

£ Contient 31,3 mg de sucralose par 125 ml

‡ Contient 25 mg d'acésulfame de potassium par 125 ml

Contient 44,1 % de jus.

IVA Anamix[MD] Next

Une préparation en poudre sans leucine pour la prise en charge nutritionnelle de l'acidémie isovalérique (IVA) chez les personnes de plus de 1 an.

Principales caractéristiques :

- Sans leucine
- Contient un mélange équilibré de tous les autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides (y compris un mélange de fibres), de lipides (y compris du DHA), de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments
- Fournit 28 g d'équivalent en protéines et 12,5 g de lipides pour 100 g de poudre
- Sans arôme
- Osmolalité (à 1,1 kcal/ml) :
  1 220 mOsm/kg d'H_2O
  Selon la dilution de 36 g de poudre (environ 4 mesurettes) dans 100 ml (3,5 oz liq.) d'eau
- Déplacement : 0,72 ml/g

Indication :

- Acidémie isovalérique

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
89471	6 x 400 g (14 oz)	1 508

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	377	135
Équivalent en protéines, g	28,0	10,0
Lipides, g	12,5	4,5
Saturés, g	2,0	0,71
Monoinsaturés, g	8,2	2,9
Polyinsaturés, g	1,8	0,64
DHA, mg	180	64,3
Glucides, g	41,2	14,7
Fibres, g	11,2	4,0
Solubles, g	8,0	2,9
Insolubles, g	3,2	1,1
Acides aminés, g		
L-alanine	1,35	0,48
L-arginine	2,35	0,84
Acide L-aspartique	2,00	0,71
L-cystine	0,94	0,34
Acide L-glutamique	1,88	0,67
L-glutamine	3,16	1,13
Glycine	4,60	1,64
L-histidine	1,40	0,50
L-isoleucine	0,92	0,33
L-leucine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-lysine	2,20	0,79
L-méthionine	0,64	0,23
L-phénylalanine	1,70	0,61
L-proline	4,10	1,46
L-sérine	1,45	0,52
L-thréonine	1,50	0,54
L-tryptophane	0,58	0,21
L-tyrosine	1,70	0,61
L-valine	1,04	0,36
L-carnitine	0,02	0,01
Taurine	0,06	0,02

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	1 748 (525)	628 (187)
Vitamine D_3, UI (µg)	1 052 (26,3)	379 (9,4)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	15,6 (10,5)	5,6 (3,8)
Vitamine K, µg	17,5	6,3
Thiamine, mg	0,91	0,32
Riboflavine, mg	0,91	0,33
Vitamine B_6, mg	0,91	0,33
Vitamine B_{12}, µg	1,6	0,57
Niacine, mg	2,5	0,89
Acide folique, µg	263	93,9
Acide pantothénique, mg	5,3	1,9
Biotine, µg	14,0	5,0
Vitamine C, mg	52,5	18,8
Choline, mg	280	100
Inositol, mg	70,0	25,0
Minéraux		
Calcium, mg	1 225	437
Phosphore, mg	801	286
Magnésium, mg	140	50,0
Fer, mg	12,5	4,5
Zinc, mg	6,1	2,2
Manganèse, mg	1,2	0,43
Cuivre, µg	700	250
Iode, µg	174	62,1
Molybdène, µg	31,9	11,4
Chrome, µg	12,8	4,6
Sélénium, µg	35,3	12,6
Sodium, mg	350	125
Potassium, mg	556	198
Chlorure, mg	508	181

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales raffinées (huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique, huile de canola, triglycérides à chaîne moyenne [huile de palmiste et/ou de noix de coco], huile de tournesol), glycine, L-proline, phosphate de calcium dibasique, fructooligosaccharides, L-glutamine, inuline, acétate de L-lysine, amidon de maïs, cellulose microcristalline, L-arginine, arôme artificiel, L-aspartate de magnésium, gomme arabique, acide L-glutamique, L-tyrosine, L-phénylalanine, citrate tripotassique, L-thréonine, L-sérine, L-histidine, L-alanine, L-valine, citrate trisodique, L-cystine, L-isoleucine, maltodextrine, bitartrate de choline, chlorure de calcium, L-méthionine, L-tryptophane, esters d'acide citrique des mono- et diglycérides (CITREM), huile de *C. cohnii***, acide L-aspartique, chlorure de sodium, acide L-ascorbique, M-inositol, fibres de soya, taurine, sulfate de fer, lécithine de tournesol, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, niacinamide, sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acétate de vitamine A, acide folique, palmitate d'ascorbyle, iodure de potassium, tocophérols mixtes, molybdate de sodium, sélénite de sodium, chlorure de chrome, DL-alpha-tocophérol, vitamine D_3, phylloquinone, D-biotine, cyanocobalamine.

CONTIENT : Huile de noix de coco, soya.

** Une source d'acide docosahexaénoïque (DHA)

XLeu Maxamum[MD]

Une préparation en poudre sans leucine pour la prise en charge nutritionnelle de l'acidémie isovalérique (IVA) et d'autres maladies du métabolisme de la leucine confirmées chez les enfants plus âgés et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans leucine
- Contient un mélange équilibré de tous les autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides, de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments (y compris du fer, du sélénium et du chrome)
- Préparation assurant l'ANREF selon l'âge
- Fournit 40 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Arôme d'orange
- Contient < 1 g de lipides par 10 g d'équivalent en protéines ce qui permet une plus grande flexibilité pour modifier l'apport énergétique
- Osmolalité (mOsm/kg d'H_2O) :
  Dilution
  1 dans 7 800
  1 dans 5 1 120
- Déplacement : 0,6 ml/g

Indications :

- Acidémie isovalérique
- Autres maladies du métabolisme de la leucine confirmées

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
49816	6 x 454 g (1 lb)	1 385

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	305	76
Équivalent en protéines, g	40	10
Lipides, g	< 1	< 0,25
Glucides, g	34	8,5
Acides aminés, g		
L-alanine	2,2	0,55
L-arginine	3,6	0,90
Acide L-aspartique	3,0	0,75
L-cystine	1,3	0,33
Acide L-glutamique	3,9	0,98
Glycine	6,3	1,6
L-histidine	2,1	0,53
L-isoleucine	1,2	0,30
L-leucine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-lysine	3,0	0,75
L-méthionine	0,86	0,22
L-phénylalanine	2,3	0,58
L-proline	6,3	1,58
L-sérine	1,9	0,48
L-thréonine	2,1	0,53
L-tryptophane	0,79	0,20
L-tyrosine	2,3	0,58
L-valine	1,4	0,35
L-carnitine	0,04	0,01
Taurine	0,14	0,04
L-glutamine	0,32	0,08

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	2 228 (669)	557 (167)
Vitamine D_3, UI (µg)	332 (8,3)	83,0 (2,1)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	18,3 (12,3)	4,6 (3,1)
Vitamine K, µg	82	20,5
Thiamine, mg	0,91	0,23
Riboflavine, mg	0,97	0,24
Vitamine B_6, mg	1,6	0,40
Vitamine B_{12}, µg	3,1	0,78
Niacine, mg	5,7	1,4
Acide folique, µg	491	123
Acide pantothénique, mg	4,9	1,2
Biotine, µg	24,5	6,1
Vitamine C, mg	62,0	15,5
Choline, mg	430	108
Inositol, mg	80,0	20,0
Minéraux		
Calcium, mg	1 183	296
Phosphore, mg	1 137	284
Magnésium, mg	306	76,5
Fer, mg	14,7	3,7
Zinc, mg	9,0	2,3
Manganèse, mg	1,8	0,45
Cuivre, µg	820	205
Iode, µg	131	32,8
Molybdène, µg	37,0	9,3
Chrome, µg	26,0	6,5
Sélénium, µg	58,0	14,5
Sodium, mg	560	140
Potassium, mg	700	175
Chlorure, mg	560	140

Ingrédients :

Sucre, L-lysine, L-glutamate, L-proline, glycine, extraits secs de sirop de maïs, phosphate de calcium dibasique, L-arginine, acide L-aspartique, L-phénylalanine, arôme artificiel, L-tyrosine, L-alanine, L-thréonine, acide citrique, L-histidine, L-sérine, acétate de magnésium, L-valine, L-cystine, L-isoleucine, citrate tripotassique, bitartrate de choline, chlorure de sodium, L-méthionine, acide L-glutamique, L-tryptophane, lécithine de soya, hydrogénophosphate de disodium, hydrogénophosphate de dipotassium, L-glutamine, phosphate tricalcique, taurine, acide L-ascorbique, M-inositol, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, sélénite de sodium, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, acétate de vitamine A, acide folique, colorants artificiels (bêta-carotène, bétanine), iodure de potassium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, phylloquinone, D-biotine, vitamine D_3, cyanocobalamine.

CONTIENT : Soya.

XLys, XTrp Analog[MC]

Une préparation pour nourrissons en poudre sans lysine ni tryptophane pour la prise en charge nutritionnelle de l'acidémie glutarique de type 1 (AG1).

Principales caractéristiques :

- Sans lysine ni tryptophane
- Contient un mélange équilibré de tous les autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides, de lipides, de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments (y compris du fer, du sélénium et du chrome)
- Fournit 13 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Non aromatisé
- Osmolalité (à 15 % p/v) : 377 mOsm/kg d'H_2O
- Déplacement : 0,70 ml/g

Indication :

- Acidémie glutarique de type 1

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
49854	6 x 400 g (14 oz)	1 900

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	475	365
Équivalent en protéines, g	13,0	10,0
Lipides, g	20,9	16,1
Saturés, g	6,8	5,2
Monoinsaturés, g	9,5	7,3
Polyinsaturés, g	3,6	2,8
Acide linoléique, mg	3 025	2 330
Glucides, g	59,0	45,4
Acides aminés, g		
L-alanine	0,61	0,47
L-arginine	1,10	0,85
Acide L-aspartique	0,90	0,69
L-cystine	0,43	0,33
Acide L-glutamique	1,10	0,85
Glycine	1,00	0,77
L-histidine	0,65	0,50
L-isoleucine	1,03	0,79
L-leucine	1,75	1,35
L-lysine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-méthionine	0,27	0,21
L-phénylalanine	0,77	0,59
L-proline	1,24	0,95
L-sérine	0,77	0,59
L-thréonine	0,86	0,66
L-tryptophane	Aucun ajout	Aucun ajout
L-tyrosine	0,77	0,59
L-valine	1,12	0,86
L-carnitine	0,01	0,01
Taurine	0,02	0,02
L-glutamine	0,10	0,08

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	1 760 (528)	1 354 (406)
Vitamine D_3, UI (µg)	340 (8,5)	262 (6,5)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	4,9 (3,3)	3,8 (2,5)
Vitamine K, µg	21,0	16,1
Thiamine, µg	500	385
Riboflavine, µg	600	462
Vitamine B_6, µg	520	400
Vitamine B_{12}, µg	1,25	0,96
Niacine, µg	4 500	3 462
Acide folique, µg	38,0	29,2
Acide pantothénique, µg	2 600	2 000
Biotine, µg	26,0	20,0
Vitamine C, mg	40,0	30,8
Choline, mg	50,0	38,5
Inositol, mg	100	76,9
Minéraux		
Calcium, mg	600	462
Phosphore, mg	500	385
Magnésium, mg	40,0	30,8
Fer, mg	10,0	7,7
Zinc, mg	8,0	6,2
Manganèse, µg	600	462
Cuivre, µg	450	346
Iode, µg	47,0	36,1
Molybdène, µg	15,0	11,5
Chrome, µg	15,0	11,5
Sélénium, µg	15,0	11,5
Sodium, mg	120	92,3
Potassium, mg	420	323
Chlorure, mg	290	223

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, huile de carthame hybride, huiles végétales raffinées (noix de coco, soya), phosphate de calcium dibasique, L-leucine, acide L-glutamique, L-proline, L-arginine, L-valine, glycine, L-isoleucine, acide L-aspartique, galactose, L-thréonine, citrate tripotassique, L-phénylalanine, L-tyrosine, L-sérine, phosphate de calcium monobasique, L-alanine, L-histidine, mono- et diglycérides, L-cystine, chlorure de sodium, L-méthionine, acétate de magnésium, chlorure de potassium, esters d'acide diacétyl-tartrique de monoglycérides, citrate tricalcique, L-glutamine, bitartrate de choline, M-inositol, acide L-ascorbique, lécithine de soya, phosphate tricalcique, sulfate de fer, sulfate de zinc, taurine, L-carnitine, nicotinamide, acétate de DL-alpha-tocophéryle, calcium de pantothénate, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, acétate de vitamine A, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de chlorure de thiamine, sulfate de chrome, iodure de potassium, acide folique, molybdate de sodium, phylloquinone, biotine, hydrogénosélénite de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.

GlutarAde[MD] Junior

Une préparation en poudre sans lysine et à faible teneur en tryptophane pour la prise en charge nutritionnelle de l'acidémie glutarique de type 1 (AG1) chez les jeunes enfants.

Principales caractéristiques :

- Sans lysine
- Profil d'acides aminés spécialement conçu pour la prise en charge de l'AG1; a fait l'objet d'une étude de recherche clinique†
- Contient de l'arginine et 60 mg de tryptophane par 100 g de poudre
- Contient une source d'acides gras oméga-3
- Préparation complète contenant des vitamines et des minéraux
- Sans arôme
- Fournit 10 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Déplacement : 0,6 ml/g

Indication :

- Acidémie glutarique de type 1

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
120904	4 x 400 g (14,1 oz)	1 640

† Strauss KA et coll. *Mol Genet Metab.* 2011.

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 100 cal. (24,4 g de poudre)
Calories	410	100
Équivalent en protéines, g	10,0	2,5
Lipides, g	10,0	2,5
Lipides saturés, g	2,2	0,55
Lipides monoinsaturés, g	5,2	1,3
Lipides polyinsaturés, g	2,6	0,63
Acide linoléique, mg	1 487	363
Acide α-linolénique, mg	815	199
Glucides, g	69,0	17,0
Acides aminés, g		
L-alanine	0,48	0,12
L-arginine	1,08	0,26
L-asparagine	0,72	0,18
L-cystine	0,18	0,04
Acide L-glutamique	0,36	0,09
L-glutamine	1,80	0,44
Glycine	0,24	0,06
L-histidine	0,36	0,09
L-isoleucine	0,84	0,21
L-leucine	1,38	0,34
L-lysine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-méthionine	0,41	0,10
L-ornithine	0,24	0,06
L-phénylalanine	0,64	0,16
L-proline	0,60	0,15
L-sérine	0,24	0,06
L-thréonine	0,64	0,16
L-tryptophane	0,06	0,01
L-tyrosine	0,72	0,18
L-valine	0,96	0,23
L-carnitine	0,03	0,01
Taurine	0,06	0,01

Vitamines	Pour 100 g	Pour 100 cal. (24,4 g de poudre)
Vitamine A, UI (µg ÉR)	1 373 (412)	335 (101)
Vitamine D_3, UI (µg)	525 (13,1)	128 (3,2)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	8,5 (5,7)	2,1 (1,4)
Vitamine K, µg	34,0	8,3
Thiamine, mg	0,83	0,20
Riboflavine, mg	0,69	0,17
Vitamine B_6, mg	0,66	0,16
Vitamine B_{12}, µg	1,4	0,35
Niacine, mg	6,6	1,6
Acide folique, µg	150	37,0
Acide pantothénique, mg	6,0	1,5
Biotine, µg	31,0	7,6
Vitamine C, mg	56,0	13,6
Choline, mg	213	52,0
Inositol, mg	125	30,0
Minéraux		
Calcium, mg	460	112
Phosphore, mg	400	97,6
Magnésium, mg	60,0	14,6
Fer, mg	8,0	2,0
Zinc, mg	7,0	1,6
Manganèse, mg	0,43	0,10
Cuivre, µg	500	122
Iode, µg	90,0	22,0
Molybdène, µg	18,0	4,4
Chrome, µg	12,0	2,9
Sélénium, µg	40,0	9,7
Sodium, mg	221	54,0
Potassium, mg	589	144
Chlorure, mg	332	81,0

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, amidon de maïs modifié, huile de canola, maltodextrine, huile de carthame, arôme naturel et artificiel. Contient 2 % ou moins de : L-glutamine, L-leucine, phosphate tricalcique, L-arginine, L-valine, huile de noix de coco, huile de soya, L-isoleucine, L-asparagine monohydraté, phosphate dipotassique, huile de lin, L-tyrosine, L-phénylalanine, L-thréonine, L-proline, bitartrate de choline, chlorure de potassium, L-ornithine-alpha cétoglutarate, L-alanine, phosphate de magnésium, L-méthionine, acide L-glutamique, L-histidine, glycine, L-sérine, palmitate d'ascorbyle, citrate de sodium, tocophérols mixtes, extrait de romarin, L-cystine, chlorure de sodium, inositol, dioxyde de silicium, acide ascorbique, L-tryptophane, taurine, sulfate de fer, phosphate de calcium, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de vitamine E, niacinamide, D-pantothénate de calcium, mono- et diglycérides, palmitate de vitamine A, vitamine D_3, gluconate de cuivre, vitamine K_1, D-biotine, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, iodure de potassium, chlorure de chrome, acide folique, vitamine B_{12}, molybdate de sodium.

CONTIENT : Huile de noix de coco, huile de soya.

GlutarAde[MD] Essential

Une préparation en poudre sans lysine et à faible teneur en tryptophane pour la prise en charge nutritionnelle de l'acidémie glutarique de type 1 (AG1) chez les enfants et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans lysine
- Profil d'acides aminés spécialement conçu pour la prise en charge de l'AG1; a fait l'objet d'une étude de recherche clinique†
- Contient de l'arginine et 150 mg de tryptophane par 100 g de poudre
- Contient une source d'acides gras oméga-3
- Fournit 25 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Arôme de vanille
- Osmolalité (à 0,64 kcal/ml) : 797 mOsm/kg d'H_2O
  Selon la dilution de 40 g de poudre (1 mesurette) dans 210 ml (7 oz liq.) d'eau
- Déplacement : 0,75 ml/g

Indication :

- Acidémie glutarique de type 1

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
120462	4 x 454 g (1 lb)	1 748

† Strauss KA et coll. *Mol Genet Metab.* 2011.

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 mesurette)
Calories	385	154
Équivalent en protéines, g	25,0	10,0
Lipides, g	13,0	5,0
Lipides saturés, g	3,1	1,2
Lipides monoinsaturés, g	6,9	2,8
Lipides polyinsaturés, g	2,9	1,2
Acide linoléique, mg	1 936	774
Acide α-linolénique, mg	730	292
Glucides, g	45,0	18,0
Fibres, g	3,9	1,5
Acides aminés, g		
L-alanine	1,2	0,48
L-arginine	2,7	1,1
L-asparagine	1,8	0,72
L-cystine	0,45	0,18
Acide L-glutamique	0,90	0,36
L-glutamine	4,5	1,8
Glycine	0,60	0,24
L-histidine	0,90	0,36
L-isoleucine	2,1	0,84
L-leucine	3,46	1,38
L-lysine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-méthionine	1,02	0,41
L-ornithine	0,60	0,24
L-phénylalanine	1,6	0,64
L-proline	1,5	0,60
L-sérine	0,60	0,24
L-thréonine	1,6	0,64
L-tryptophane	0,15	0,06
L-tyrosine	1,8	0,72
L-valine	2,4	0,96
L-carnitine	0,04	0,01
Taurine	0,15	0,06

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 mesurette)
Vitamine A, UI (µg ÉR) (25 % de bêta-carotène)	1 700 (637)	680 (255)
Vitamine D_3, UI (µg)	600 (15,0)	240 (6,0)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	19,1 (12,8)	7,6 (5,1)
Vitamine K, µg	70,0	28,0
Thiamine, mg	1,5	0,60
Riboflavine, mg	1,5	0,60
Vitamine B_6, mg	1,4	0,56
Vitamine B_{12}, µg	3,0	1,2
Niacine, mg	15,5	6,2
Acide folique, µg	300	120
Acide pantothénique, mg	7,5	3,0
Biotine, µg	30,0	12,0
Vitamine C, mg	60,0	24,0
Choline, mg	313	125
Inositol, mg	50,0	20,0
Minéraux :		
Calcium, mg	1 257	503
Phosphore, mg	787	315
Magnésium, mg	201	80,0
Fer, mg	11,3	4,5
Zinc, mg	10,0	4,0
Manganèse, mg	1,9	0,76
Cuivre, µg	1 000	400
Iode, µg	115	46,0
Molybdène, µg	31,0	12,4
Chrome, µg	21,0	8,6
Sélénium, µg	63,0	25,0
Sodium, mg	384	154
Potassium, mg	874	350
Chlorure, mg	475	190

Ingrédients :

Sucre, amidon de maïs modifié, huile de canola, maltodextrine, huile de carthame, dextrine, L-glutamine, L-leucine, arôme naturel et artificiel, L-arginine, phosphate dicalcique, L-valine, L-isoleucine, L-asparagine monohydraté. Contient 2 % ou moins de : L-tyrosine, phosphate tricalcique, L-phénylalanine, L-thréonine, L-proline, citrate de potassium, L-ornithine-alpha cétoglutarate, L-alanine, huile de noix de coco, huile de soya, L-méthionine, citrate de sodium, chlorure de potassium, acide L-glutamique, L-histidine, bitartrate de choline, glycine, L-sérine, L-cystine, huile de lin, oxyde de magnésium, palmitate d'ascorbyle, tocophérols mixtes, extrait de romarin, dioxyde de silicium, L-tryptophane, taurine, chlorure de sodium, acide ascorbique, inositol, orthophosphate ferrique, acétate de vitamine E, L-carnitine, niacinamide, phosphate de calcium, oxyde de zinc, sucralose*, D-pantothénate de calcium, gluconate de cuivre, vitamine K_1, vitamine D_3, sulfate de manganèse, palmitate de vitamine A, mono-et diglycérides, D-biotine, bêta-carotène, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de potassium, riboflavine, mononitrate de thiamine, sélénite de sodium, acide folique, vitamine B_{12}, chlorure de chrome, molybdate de sodium.

CONTIENT : Huile de noix de coco, huile de soya.

* Contient 4 mg de sucralose par 40 g de poudre

GlutarAde[MD] Amino Acid Blend

Une préparation en poudre sans lysine et à faible teneur en tryptophane pour la prise en charge nutritionnelle de l'acidémie glutarique de type 1 (AG1) chez les enfants et les adultes.

Principales caractéristiques :

- Sans lysine
- Profil d'acides aminés spécialement conçu pour la prise en charge de l'AG1; a fait l'objet d'une étude de recherche clinique†
- Contient de l'arginine et 480 mg de tryptophane par 100 g de poudre
- Ne contient pas de lipides, de glucides, de vitamines ou de minéraux
- 40 calories par portion
- Fournit 81 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Non aromatisé
- Déplacement : 0,48 ml/g

Indication :

- Acidémie glutarique de type 1

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
120461	4 x 454 g (1 lb)	1 471

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 mesurette)
Calories	324	40
Équivalent en protéines, g	81,0	10,0
Lipides, g	0	0
Glucides, g	0	0
Sodium, mg	355	44,0

Acides aminés, g	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 mesurette)
L-alanine	3,86	0,48
L-arginine	8,69	1,07
L-asparagine	5,79	0,71
L-cystine	1,45	0,18
Acide L-glutamique	2,90	0,36
L-glutamine	14,48	1,79
Glycine	1,93	0,24
L-histidine	2,90	0,36
L-isoleucine	6,76	0,83
L-leucine	11,10	1,37
L-lysine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-méthionine	3,28	0,41
L-ornithine	1,93	0,24
L-phénylalanine	5,12	0,63
L-proline	4,83	0,60
L-sérine	1,93	0,24
L-thréonine	5,12	0,63
L-tryptophane	0,48	0,06
L-tyrosine	5,79	0,71
L-valine	7,72	0,95
L-carnitine	0,20	0,03
Taurine	0,48	0,06

Ingrédients :

L-glutamine, L-leucine, L-arginine, L-valine, L-isoleucine, L-asparagine monohydraté, L-tyrosine, L-phénylalanine, L-thréonine, L-proline, L-ornithine-alpha cétoglutarate, L-alanine, L-méthionine, acide L-glutamique, L-histidine, glycine, L-sérine, L-cystine, taurine, L-tryptophane, dioxyde de silicium, L-carnitine.

Remarque : Doit être combiné à un supplément de vitamines et de minéraux approprié lorsque pris comme seule source d'acides aminés de protéines.

† Strauss KA et coll. *Mol Genet Metab.* 2011.

XMet Analog[MC]

Une préparation pour nourrissons en poudre sans méthionine pour la prise en charge nutritionnelle de l'homocystinurie non réactive à la vitamine B_6 ou de l'hyperméthioninémie.

Principales caractéristiques :

- Sans méthionine
- Contient un mélange équilibré de tous les autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides, de lipides, de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments (y compris du fer, du sélénium et du chrome)
- Fournit 13 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Non aromatisé
- Osmolalité (à 15 % p/v) : 377 mOsm/kg d'H_2O
- Déplacement : 0,70 ml/g

Indications :

- Homocystinurie non réactive à la vitamine B_6
- Hyperméthioninémie

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
49853	6 x 400 g (14 oz)	1 900

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	475	365
Équivalent en protéines, g	13,0	10,0
Lipides, g	20,9	16,1
Saturés, g	6,8	5,2
Monoinsaturés, g	9,5	7,3
Polyinsaturés, g	3,6	2,8
Acide linoléique, mg	3 025	2 330
Glucides, g	59,0	45,4
Acides aminés, g		
L-alanine	0,50	0,38
L-arginine	1,00	0,77
Acide L-aspartique	0,80	0,62
L-cystine	0,39	0,30
Acide L-glutamique	1,14	0,88
Glycine	0,93	0,72
L-histidine	0,60	0,46
L-isoleucine	0,93	0,72
L-leucine	1,59	1,22
L-lysine	1,08	0,83
L-méthionine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-phénylalanine	0,70	0,54
L-proline	1,12	0,86
L-sérine	0,69	0,53
L-thréonine	0,78	0,62
L-tryptophane	0,31	0,24
L-tyrosine	0,80	0,62
L-valine	1,01	0,78
L-carnitine	0,01	0,01
Taurine	0,02	0,02
L-glutamine	0,10	0,08

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	1 760 (528)	1 354 (406)
Vitamine D_3, UI (µg)	340 (8,5)	262 (6,5)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	4,9 (3,3)	3,8 (2,5)
Vitamine K, µg	21,0	16,1
Thiamine, µg	500	385
Riboflavine, µg	600	462
Vitamine B_6, µg	520	400
Vitamine B_{12}, µg	1,25	0,96
Niacine, µg	4 500	3 462
Acide folique, µg	38,0	29,2
Acide pantothénique, µg	2 600	2 000
Biotine, µg	26,0	20,0
Vitamine C, mg	40,0	30,8
Choline, mg	50,0	38,5
Inositol, mg	100	76,9
Minéraux		
Calcium, mg	600	462
Phosphore, mg	500	385
Magnésium, mg	40,0	30,8
Fer, mg	10,0	7,7
Zinc, mg	8,0	6,2
Manganèse, µg	600	462
Cuivre, µg	450	346
Iode, µg	47,0	36,1
Molybdène, µg	15,0	11,5
Chrome, µg	15,0	11,5
Sélénium, µg	15,0	11,5
Sodium, mg	120	92,3
Potassium, mg	420	323
Chlorure, mg	290	223

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, huile de carthame hybride, huiles végétales raffinées (noix de coco, soya), L-lysine, L-glutamate, phosphate de calcium dibasique, L-leucine, L-proline, L-arginine, L-valine, glycine, L-isoleucine, galactose, acide L-aspartique, citrate tripotassique, L-thréonine, L-phénylalanine, L-tyrosine, L-sérine, phosphate de calcium monobasique, L-alanine, L-histidine, mono- et diglycérides, L-cystine, L-tryptophane, chlorure de sodium, acétate de magnésium, chlorure de potassium, esters d'acide diacétyl-tartrique de monoglycérides, citrate tricalcique, L-glutamine, bitartrate de choline, M-inositol, acide L-ascorbique, lécithine de soya, acide L-glutamique, phosphate tricalcique, sulfate de fer, sulfate de zinc, taurine, L-carnitine, nicotinamide, acétate de DL-alpha-tocophéryle, calcium de pantothénate, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, acétate de vitamine A, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de chlorure de thiamine, sulfate de chrome, iodure de potassium, acide folique, molybdate de sodium, phylloquinone, D-biotine, hydrogénosélénite de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.

HCU Anamix[MD] Next

Une préparation en poudre sans méthionine pour la prise en charge nutritionnelle de l'homocystinurie chez les personnes de plus de 1 an.

Principales caractéristiques :

- Sans méthionine
- Contient un mélange équilibré de tous les autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides (y compris un mélange de fibres), de lipides (y compris du DHA), de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments
- Fournit 28 g d'équivalent en protéines et 12,5 g de lipides pour 100 g de poudre
- Sans arôme
- Osmolalité (à 1,1 kcal/ml) : 1 340 mOsm/kg d'H_2O Selon la dilution de 36 g de poudre (environ 4 mesurettes) dans 100 ml (3,5 oz liq.)
- Déplacement : 0,72 ml/g

Indication :

- Homocystinurie

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
89470	6 x 400 g	1 540

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	385	137
Équivalent en protéines, g	28,0	10,0
Lipides, g	12,5	4,5
Saturés, g	2,0	0,71
Monoinsaturés, g	8,2	2,9
Polyinsaturés, g	1,8	0,64
DHA, mg	180	64,3
Glucides, g	43,2	15,4
Fibres, g	11,2	4,0
Solubles, g	8,0	2,9
Insolubles, g	3,2	1,1
Acides aminés, g		
L-alanine	1,40	0,50
L-arginine	2,25	0,80
Acide L-aspartique	2,00	0,71
L-cystine	1,50	0,54
L-glutamine	2,60	0,93
Glycine	2,13	0,76
L-histidine	1,22	0,44
L-isoleucine	2,10	0,75
L-leucine	3,46	1,24
L-lysine	2,44	0,87
L-méthionine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-phénylalanine	1,50	0,54
L-proline	2,52	0,90
L-sérine	1,57	0,56
L-thréonine	2,00	0,71
L-tryptophane	0,50	0,18
L-tyrosine	1,60	0,57
L-valine	2,30	0,82
L-carnitine	0,02	0,01
Taurine	0,05	0,02

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	1 399 (420)	500 (150)
Vitamine D_3, UI (µg)	840 (21,0)	300 (7,5)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	12,5 (8,4)	4,5 (3,0)
Vitamine K, µg	14,0	5,0
Thiamine, mg	0,73	0,28
Riboflavine, mg	0,73	0,26
Vitamine B_6, mg	0,73	0,26
Vitamine B_{12}, µg	1,3	0,46
Niacine, mg	2,0	0,71
Acide folique, µg	210	75,0
Acide pantothénique, mg	4,2	1,5
Biotine, µg	11,2	4,0
Vitamine C, mg	42,0	15,0
Choline, mg	224	80,0
Inositol, mg	56,0	20,0
Minéraux		
Calcium, mg	980	350
Phosphore, mg	641	229
Magnésium, mg	113	40,3
Fer, mg	10,0	3,6
Zinc, mg	4,9	1,8
Manganèse, mg	0,92	0,33
Cuivre, µg	560	200
Iode, µg	139	49,6
Molybdène, µg	25,5	9,1
Chrome, µg	10,2	3,6
Sélénium, µg	28,2	10,1
Sodium, mg	280	100
Potassium, mg	445	159
Chlorure, mg	406	145

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales raffinées (huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique, huile de canola, triglycérides à chaîne moyenne [huile de palmiste et/ou de noix de coco], huile de tournesol), L-arginine, L-aspartate, L-leucine, fructooligosaccharides, acétate de L-lysine, inuline, amidon de maïs, L-glutamine, phosphate de calcium dibasique, L-proline, cellulose microcristalline, L-valine, arôme artificiel, glycine, L-isoleucine, L-thréonine, gomme arabique, L-tyrosine, L-sérine, L-cystine, L-phénylalanine, L-alanine, citrate tripotassique, citrate trisodique, L-histidine, chlorure de calcium, hydrogénophosphate de magnésium, maltodextrine, bitartrate de choline, esters d'acide citrique des mono- et diglycérides (CITREM), L-tryptophane, huile de *C. cohnii***, L-aspartate de magnésium, citrate tricalcique, acide L-ascorbique, fibres de soya, M-inositol, taurine, sulfate de fer, lécithine de tournesol, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, niacinamide, sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acétate de vitamine A, palmitate d'ascorbyle, acide folique, iodure de potassium, tocophérols mixtes, molybdate de sodium, sélénite de sodium, chlorure de chrome, DL-alpha-tocophérol, vitamine D_3, phylloquinone, D-biotine, cyanocobalamine.

CONTIENT : Huile de noix de coco, soya.

** Une source d'acide docosahexaénoïque (DHA)

XMet Maxamum[MD]

Une préparation en poudre sans méthionine pour la prise en charge nutritionnelle de l'homocystinurie non réactive à la vitamine B_6 ou de l'hyperméthioninémie chez les enfants plus âgés et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans méthionine
- Contient un mélange équilibré de tous les autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides, de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments
- Préparation assurant l'ANREF selon l'âge
- Fournit 40 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Arôme d'orange
- Contient < 1 g de lipides par 10 g d'équivalent en protéines ce qui permet une plus grande flexibilité pour modifier l'apport énergétique
- Osmolalité (mOsm/kg d'H_2O) :
  Dilution
  1 dans 7 800
  1 dans 5 1 190
- Déplacement : 0,6 ml/g

Indications :

- Homocystinurie non réactive à la vitamine B_6
- Hyperméthioninémie

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
117795	6 x 454 g (1 lb)	1 385

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	305	76
Équivalent en protéines, g	40,0	10,0
Lipides, g	< 1	< 0,25
Glucides, g	34,0	8,5
Acides aminés, g		
L-alanine	1,8	0,45
L-arginine	3,2	0,80
Acide L-aspartique	2,7	0,68
L-cystine	1,2	0,30
Acide L-glutamique	3,6	0,90
Glycine	2,8	0,70
L-histidine	1,8	0,45
L-isoleucine	2,8	0,70
L-leucine	4,9	1,23
L-lysine	3,3	0,83
L-méthionine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-phénylalanine	2,2	0,55
L-proline	3,4	0,85
L-sérine	2,1	0,53
L-thréonine	2,4	0,60
L-tryptophane	0,95	0,24
L-tyrosine	2,2	0,55
L-valine	3,1	0,78
L-carnitine	0,04	0,01
Taurine	0,14	0,04
L-glutamine	0,32	0,08

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	2 228 (669)	557 (167)
Vitamine D_3, UI (µg)	332 (8,3)	83,0 (2,1)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	18,3 (12,3)	4,6 (3,1)
Vitamine K, µg	82,0	20,5
Thiamine, mg	0,91	0,23
Riboflavine, mg	0,97	0,24
Vitamine B_6, mg	1,6	0,40
Vitamine B_{12}, µg	3,1	0,78
Niacine, mg	5,7	1,4
Acide folique, µg	491	123
Acide pantothénique, mg	4,9	1,2
Biotine, µg	24,5	6,1
Vitamine C, mg	62,0	15,5
Choline, mg	430	108
Inositol, mg	80,0	20,0
Minéraux		
Calcium, mg	1 183	296
Phosphore, mg	1 137	284
Magnésium, mg	306	76,5
Fer, mg	14,7	3,7
Zinc, mg	9,0	2,3
Manganèse, mg	1,8	0,45
Cuivre, µg	820	205
Iode, µg	131	32,8
Molybdène, µg	37,0	9,3
Chrome, µg	26,0	6,5
Sélénium, µg	58,0	14,5
Sodium, mg	560	140
Potassium, mg	700	175
Chlorure, mg	560	140

Ingrédients :

Sucre, L-lysine, L-glutamate, extraits secs de sirop de maïs, L-leucine, phosphate de calcium dibasique, L-proline, L-arginine, L-valine, glycine, L-isoleucine, acide L-aspartique, L-thréonine, arôme artificiel, L-phénylalanine, L-tyrosine, L-sérine, acide citrique, acétate de magnésium, L-alanine, L-histidine, citrate tripotassique, L-cystine, bitartrate de choline, L-tryptophane, chlorure de sodium, lécithine de soya, hydrogénophosphate de disodium, hydrogénophosphate de dipotassium, L-glutamine, phosphate tricalcique, acide L-glutamique, taurine, acide L-ascorbique, M-inositol, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, sélénite de sodium, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, acétate de vitamine A, acide folique, colorants artificiels (bêta-carotène, bétanine), iodure de potassium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, phylloquinone, D-biotine, vitamine D_3, cyanocobalamine.

CONTIENT : Soya.

HCU Lophlex^{MD} LQ

Une préparation prête à boire sans méthionine* contenant des acides aminés, des glucides, des vitamines, des minéraux et du DHA, à base de jus de fruits mélangés (faits de concentré) avec un arôme naturel; pour la prise en charge nutritionnelle de l'homocystinurie chez les personnes de 4 ans et plus, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans méthionine
- Faible volume; fournit 20 g d'équivalent en protéines en seulement 125 ml (4,2 oz liq.)
- Pratique et prêt à boire
- À base de jus de fruits (faits de concentré) avec un arôme naturel – aucun arôme artificiel
- Contient un mélange équilibré d'autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides, de vitamines, de minéraux et de DHA
- Fournit 150 mg de DHA par sachet
- Arôme Explosion de petits fruits
- Osmolalité : 2 460 mOsm/kg d'H_2O

Indication :

- Homocystinurie

Pour des détails sur l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par sachet
82111	30 x 125 ml (4,2 oz liq.)	120

* Peut contenir des traces de méthionine – provenant de jus de fruits (faits de concentré) – dont la quantité est inférieure à 2 mg/100 ml.

Information nutritionnelle :

Nutriments	Par sachet (125 ml)	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	120	60
Équivalent en protéines, g	20,0	10,0
Lipides, g	0,44	0,22
DHA, mg	150	75,0
Glucides, g	9,3	4,7
Fibres, g	0,50	0,25
Acides aminés, g		
L-alanine	1,18	0,59
L-arginine	1,50	0,75
Acide L-aspartique	1,73	0,87
L-cystine	0,98	0,49
Glycine	1,60	0,80
L-histidine	0,85	0,43
L-isoleucine	1,35	0,68
L-leucine	2,30	1,15
L-lysine	1,55	0,78
L-méthionine	Trace*	Trace*
L-phénylalanine	1,00	0,50
L-proline	2,03	1,02
L-sérine	1,38	0,69
L-thréonine	1,13	0,57
L-tryptophane	0,45	0,23
L-tyrosine	1,65	0,83
L-valine	1,45	0,73
L-carnitine	0,01	0,01
Taurine	0,06	0,03

Vitamines	Par sachet (125 ml)	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	949 (285)	475 (143)
Vitamine D_3, UI (µg)	320 (8,0)	160 (4,0)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	4,8 (3,2)	2,4 (1,6)
Vitamine K, µg	24,9	12,5
Thiamine, mg	0,54	0,27
Riboflavine, mg	0,50	0,25
Vitamine B_6, mg	0,58	0,29
Vitamine B_{12}, µg	1,8	0,90
Niacine, mg	7,1	3,6
Acide folique, µg	120	60,0
Acide pantothénique, mg	1,8	0,9
Biotine, µg	53,4	26,7
Vitamine C, mg	17,8	8,9
Choline, mg	153	76,5
Inositol, mg	40,6	20,3
Minéraux		
Calcium, mg	319	160
Phosphore, mg	244	122
Magnésium, mg	96,3	48,2
Fer, mg	5,1	2,6
Zinc, mg	3,8	1,9
Manganèse, mg	0,56	0,28
Cuivre, µg	563	282
Iode, µg	56,3	28,2
Molybdène, µg	25,0	12,5
Chrome, µg	10,8	5,4
Sélénium, µg	26,8	13,4
Sodium, mg	< 25,0	< 12,5
Potassium, mg	90,0	45,0
Chlorure, mg	< 25,0	< 12,5

Ingrédients :

Eau, jus de pomme fait de concentré (34,1 %), jus de raisin fait de concentré (6,9 %), jus de cassis fait de concentré (2,5 %), L-arginine, L-aspartate, L-leucine, acétate de L-lysine, acide citrique, L-proline, L-tyrosine, glycine, L-valine, L-sérine, L-isoleucine, extraits secs de sirop de maïs, phosphate dicalcique, L-alanine, L-thréonine, L-phénylalanine, L-cystine, L-histidine, jus de baie de sureau fait de concentré (0,6 %), maltodextrine, L-aspartate de magnésium, acétate de magnésium, L-tryptophane, bitartrate de choline, huile de *C. Cohnii***, sucre, cellulose microcristalline, arôme naturel, concentrés de fruits (pomme, cassis, radis), acide L-ascorbique, taurine, gomme de guar, lécithine de tournesol, gomme de xanthane, M-inositol, sorbate de potassium (agent de conservation), édulcorant artificiel : sucralose§, édulcorant artificiel : acésulfame de potassium‡, lactate ferreux, benzoate de sodium (agent de conservation), sulfate de zinc, L-carnitine, niacinamide, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, palmitate de vitamine A, riboflavine, acide folique, iodure de potassium, palmitate d'ascorbyle, tocophérols mixtes, molybdate de sodium, D-biotine, sélénite de sodium, chlorure de chrome, phylloquinone, vitamine D_3, cyanocobalamine.

** Une source d'acide docosahexaénoïque (DHA)

§ Contient 31,3 mg de sucralose par 125 ml

‡ Contient 25 mg d'acésulfame de potassium par 125 ml

CONTIENT : 44,1 % de jus.



MMA/PA Anamix[MD] Next

Une préparation en poudre sans méthionine, sans thréonine et sans valine, à faible teneur en isoleucine, pour la prise en charge nutritionnelle de l'acidémie méthylmalonique et de l'acidémie propionique chez les personnes de plus de 1 an.

Principales caractéristiques :

- Sans méthionine, sans thréonine et sans valine
- Faible teneur en isoleucine
- Contient un mélange équilibré de tous les autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides (y compris un mélange de fibres), de lipides (y compris du DHA), de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments
- Fournit 28 g d'équivalent en protéines et 12,5 g de lipides pour 100 g de poudre
- Sans arôme
- Osmolalité (à 1,1 kcal/ml) : 1 220 mOsm/kg d'H_2O
  Selon la dilution de 36 g de poudre (environ 4 mesurettes) dans 100 ml (3,5 oz liq.) d'eau
- Déplacement : 0,72 ml/g

Indications :

- Acidémie méthylmalonique
- Acidémie propionique

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
89472	6 x 400 g	1 508

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	377	135
Équivalent en protéines, g	28,0	10,0
Lipides, g	12,5	4,5
Saturés, g	2,0	0,71
Monoinsaturés, g	8,2	2,9
Polyinsaturés, g	1,8	0,64
DHA, mg	180	64,3
Glucides, g	41,2	14,7
Fibres, g	11,2	4,0
Solubles, g	8,0	2,9
Insolubles, g	3,2	1,1
Acides aminés, g		
L-alanine	3,42	1,22
L-arginine	3,00	1,07
Acide L-aspartique	2,72	0,97
L-cystine	1,56	0,56
L-glutamine	3,61	1,29
Glycine	1,37	0,49
L-histidine	2,02	0,72
L-isoleucine	< 0,03	< 0,01
L-leucine	4,54	1,62
L-lysine	3,05	1,09
L-méthionine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-phénylalanine	1,99	0,71
L-proline	1,37	0,49
L-sérine	1,98	0,71
L-thréonine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-tryptophane	0,69	0,25
L-tyrosine	1,99	0,71
L-valine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-carnitine	0,02	0,01
Taurine	0,06	0,02

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	1 748 (525)	624 (187)
Vitamine D_3, UI (µg)	1 052 (26,3)	376 (9,4)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	15,6 (10,5)	5,6 (3,7)
Vitamine K, µg	17,5	6,2
Thiamine, mg	0,91	0,32
Riboflavine, mg	0,91	0,32
Vitamine B_6, mg	0,91	0,32
Vitamine B_{12}, µg	1,6	0,57
Niacine, mg	2,5	0,89
Acide folique, µg	263	93,9
Acide pantothénique, mg	5,3	1,9
Biotine, µg	14,0	5,0
Vitamine C, mg	52,5	18,7
Choline, mg	280	100
Inositol, mg	70,0	25,0
Minéraux		
Calcium, mg	1 225	437
Phosphore, mg	801	286
Magnésium, mg	140	50,0
Fer, mg	12,5	4,5
Zinc, mg	6,1	2,2
Manganèse, mg	1,2	0,43
Cuivre, µg	700	250
Iode, µg	174	62,1
Molybdène, µg	31,9	11,4
Chrome, µg	12,8	4,6
Sélénium, µg	35,3	12,6
Sodium, mg	350	125
Potassium, mg	556	199
Chlorure, mg	508	181

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales raffinées (huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique, huile de canola, triglycérides à chaîne moyenne [huile de palmiste et/ou de noix de coco], huile de tournesol), L-leucine, acétate de L-lysine, L-glutamine, fructooligosaccharides, L-alanine, inuline, phosphate de calcium dibasique, L-arginine, amidon de maïs, acide L-aspartique, cellulose microcristalline, arôme artificiel, L-histidine, L-tyrosine, L-phénylalanine, L-sérine, gomme arabique, citrate tripotassique, citrate trisodique, L-cystine, glycine, L-proline, chlorure de calcium, hydrogénophosphate de magnésium, maltodextrine, bitartrate de choline, L-tryptophane, citrate tricalcique, esters d'acide citrique des mono- et diglycérides (CITREM), huile de *C. cohnii***, acide L-ascorbique, M-inositol, fibres de soya, taurine, sulfate de fer, lécithine de tournesol, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, niacinamide, sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acétate de vitamine A, acide folique, palmitate d'ascorbyle, iodure de potassium, tocophérols mixtes, molybdate de sodium, sélénite de sodium, chlorure de chrome, DL-alpha-tocophérol, vitamine D_3, phylloquinone, D-biotine, cyanocobalamine.

CONTIENT : Huile de noix de coco, soya.

** Une source d'acide docosahexaénoïque (DHA)

XMTVI Maxamum[MD]

Une préparation sans méthionine, sans thréonine et sans valine, à faible teneur en isoleucine, pour la prise en charge nutritionnelle de l'acidémie méthylmalonique non réactive à la vitamine B_{12} ou de l'acidémie propionique chez les enfants plus âgés et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans méthionine, sans thréonine et sans valine, à faible teneur en isoleucine
- Contient un mélange équilibré de tous les autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides, de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments
- Préparation assurant l'ANREF selon l'âge
- Fournit 40 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Arôme d'orange
- Contient < 1 g de lipides par 10 g d'équivalent en protéines ce qui permet une plus grande flexibilité pour modifier l'apport énergétique
- Osmolalité (mOsm/kg d'H_2O) :
  Dilution
  1 dans 7 740
  1 dans 5 1 070
- Déplacement : 0,6 ml/g

Indications :

- Acidémie méthylmalonique non réactive à la vitamine B_{12}
- Acidémie propionique

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
49805	6 x 454 g (1 lb)	1 385

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	305	76
Équivalent en protéines, g	40,0	10,0
Lipides, g	< 1,0	< 0,25
Glucides, g	34,0	8,5
Acides aminés, g		
L-alanine	3,4,0	1,15
L-arginine	4,10	1,03
Acide L-aspartique	3,60	0,90
L-cystine	1,50	0,38
Acide L-glutamique	4,50	1,13
Glycine	1,80	0,45
L-histidine	2,80	0,70
L-isoleucine	< 0,14	Trace
L-leucine	6,20	1,55
L-lysine	4,20	1,05
L-méthionine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-phénylalanine	2,70	0,68
L-proline	1,90	0,48
L-sérine	2,60	0,65
L-thréonine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-tryptophane	1,20	0,30
L-tyrosine	2,70	0,68
L-valine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-carnitine	0,04	0,01
Taurine	0,14	0,04
L-glutamine	0,32	0,08

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	2 228 (669)	557 (167)
Vitamine D_3, UI (µg)	332 (8,3)	83,0 (2,1)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	18,3 (12,3)	4,6 (3,1)
Vitamine K, µg	82,0	20,5
Thiamine, mg	0,91	0,23
Riboflavine, mg	0,97	0,24
Vitamine B_6, mg	1,6	0,40
Vitamine B_{12}, µg	3,1	0,78
Niacine, mg	5,7	1,4
Acide folique, µg	491	123
Acide pantothénique, mg	4,9	1,2
Biotine, µg	24,5	6,1
Vitamine C, mg	62,0	15,5
Choline, mg	430	108
Inositol, mg	80,0	20,0
Minéraux		
Calcium, mg	1 183	296
Phosphore, mg	1 137	284
Magnésium, mg	306	76,5
Fer, mg	14,7	3,7
Zinc, mg	9,0	2,3
Manganèse, mg	1,8	0,45
Cuivre, µg	820	205
Iode, µg	131	32,8
Molybdène, µg	37,0	9,3
Chrome, µg	26,0	6,5
Sélénium, µg	58,0	14,5
Sodium, mg	560	140
Potassium, mg	700	175
Chlorure, mg	560	140

Ingrédients :

Sucre, L-lysine, L-glutamate, L-leucine, extraits secs de sirop de maïs, L-alanine, phosphate de calcium dibasique, L-arginine, acide L-aspartique, L-histidine, L-phénylalanine, L-tyrosine, L-sérine, arôme artificiel, acide citrique, acétate de magnésium, glycine, L-proline, L-cystine, L-tryptophane, citrate tripotassique, bitartrate de choline, chlorure de sodium, lécithine de soya, hydrogénophosphate de disodium, hydrogénophosphate de dipotassium, L-glutamine, phosphate tricalcique, acide L-glutamique, taurine, acide L-ascorbique, M-inositol, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, sélénite de sodium, chlorhydrate de chlorure de thiamine, riboflavine, acétate de vitamine A, acide folique, colorants artificiels (bêta-carotène, bétanine), iodure de potassium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, phylloquinone, D-biotine, vitamine D_3, cyanocobalamine.

CONTIENT : Soya.

XPhe, XTyr Analog[MC]

Une préparation pour nourrissons en poudre sans phénylalanine ni tyrosine pour la prise en charge nutritionnelle de la tyrosinémie lorsque la concentration de méthionine plasmatique est normale.

Principales caractéristiques :

- Sans phénylalanine ni tyrosine
- Contient un mélange équilibré de tous les autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides, de lipides, de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments (y compris du fer, du sélénium et du chrome)
- Fournit 13 g d'équivalent en protéines pour 100 g de poudre
- Non aromatisé
- Osmolalité (à 15 % p/v) : 377 mOsm/kg d'H_2O
- Déplacement : 0,70 ml/g

Indication :

- Tyrosinémie

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
49831	6 x 400 g (14 oz)	1 900

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	475	365
Équivalent en protéines, g	13,0	10,0
Lipides, g	20,9	16,1
Saturés, g	6,8	5,2
Monoinsaturés, g	9,5	7,3
Polyinsaturés, g	3,6	2,8
Acide linoléique, mg	3 025	2 327
Glucides, g	59,0	45,4
Acides aminés, g		
L-alanine	0,63	0,48
L-arginine	1,13	0,87
Acide L-aspartique	0,93	0,72
L-cystine	0,42	0,32
Acide L-glutamique	1,26	0,97
Glycine	0,96	0,74
L-histidine	0,65	0,50
L-isoleucine	1,00	0,77
L-leucine	1,72	1,32
L-lysine	1,17	0,90
L-méthionine	0,27	0,21
L-phénylalanine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-proline	1,21	0,93
L-sérine	0,74	0,57
L-thréonine	0,84	0,65
L-tryptophane	0,34	0,26
L-tyrosine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-valine	1,10	0,85
L-carnitine	0,01	0,01
Taurine	0,02	0,02
L-glutamine	0,10	0,08

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	1 760 (528)	1 354 (406)
Vitamine D_3, UI (µg)	340 (8,5)	262 (6,5)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	4,9 (3,3)	3,8 (2,5)
Vitamine K, µg	21,0	16,2
Thiamine, µg	500	385
Riboflavine, µg	600	462
Vitamine B_6, µg	520	400
Vitamine B_{12}, µg	1,25	0,96
Niacine, µg	4 500	3 462
Acide folique, µg	38,0	29,2
Acide pantothénique, µg	2 600	2 000
Biotine, µg	26,0	20,0
Vitamine C, mg	40,0	30,8
Choline, mg	50,0	38,5
Inositol, mg	100	76,9
Minéraux		
Calcium, mg	600	462
Phosphore, mg	500	385
Magnésium, mg	40,0	30,8
Fer, mg	10,0	7,7
Zinc, mg	8,0	6,2
Manganèse, µg	600	462
Cuivre, µg	450	346
Iode, µg	47,0	36,2
Molybdène, µg	15,0	11,5
Chrome, µg	15,0	11,5
Sélénium, µg	15,0	11,5
Sodium, mg	120	92,3
Potassium, mg	420	323
Chlorure, mg	290	223

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, huile de carthame hybride, huiles végétales raffinées (noix de coco, soya), L-lysine, L-glutamate, phosphate de calcium dibasique, L-leucine, L-proline, L-arginine, L-valine, glycine, L-isoleucine, acide L-aspartique, galactose, L-thréonine, citrate tripotassique, L-sérine, phosphate de calcium monobasique, L-alanine, L-histidine, mono- et diglycérides, L-cystine, L-tryptophane, chlorure de sodium, L-méthionine, acétate de magnésium, chlorure de potassium, esters d'acide diacétyl-tartrique de monoglycérides, citrate tricalcique, L-glutamine, bitartrate de choline, M-inositol, acide L-ascorbique, lécithine de soya, acide L-glutamique, phosphate tricalcique, sulfate de fer, sulfate de zinc, taurine, L-carnitine, nicotinamide, acétate de DL-alpha-tocophéryle, calcium de pantothénate, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, acétate de vitamine A, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de chlorure de thiamine, sulfate de chrome, iodure de potassium, acide folique, molybdate de sodium, phylloquinone, biotine, hydrogénosélénite de sodium, vitamine D_3, cyanocobalamine.

TYR Anamix[MD] Next

Une préparation en poudre légèrement aromatisée sans phénylalanine ni tyrosine pour la prise en charge nutritionnelle de la tyrosinémie chez les personnes de plus de 1 an.

Principales caractéristiques :

- Sans phénylalanine ni tyrosine
- Contient un mélange équilibré de tous les autres acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides (y compris un mélange de fibres), de lipides (y compris du DHA), de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments
- Fournit 28 g d'équivalent en protéines et 12,5 g de lipides pour 100 g de poudre
- Sans arôme
- Osmolalité (à 1,1 kcal/ml) : 1 220 mOsm/kg d'H_2O
  Selon la dilution de 36 g de poudre (environ 4 mesurettes) dans 100 ml (3,5 oz liq.) d'eau
- Déplacement : 0,72 ml/g

Indication :

- Tyrosinémie

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
89479	6 x 400 g (14 oz)	1 540

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	385	138
Équivalent en protéines, g	28,0	10,0
Lipides, g	12,5	4,5
Saturés, g	2,0	0,71
Monoinsaturés, g	8,2	2,9
Polyinsaturés, g	1,8	0,64
DHA, mg	180	64,3
Glucides, g	43,2	15,4
Fibres, g	11,2	4,0
Solubles	8,0	2,9
Insolubles	3,2	1,1
Acides aminés, g		
L-alanine	4,71	1,68
L-arginine	1,67	0,60
Acide L-aspartique	0,41	0,15
L-cystine	2,71	0,97
L-glutamine	3,36	1,20
Glycine	3,94	1,41
L-histidine	0,79	0,28
L-isoleucine	1,66	0,59
L-leucine	2,52	0,90
L-lysine	2,24	0,80
L-méthionine	0,56	0,2
L-phénylalanine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-proline	2,71	0,97
L-sérine	1,59	0,57
L-thréonine	2,94	1,05
L-tryptophane	0,56	0,20
L-tyrosine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-valine	1,96	0,70
L-carnitine	0,02	0,01
Taurine	0,05	0,02

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	1 399 (420)	500 (150)
Vitamine D_3, UI (µg)	840 (21,0)	300 (7,5)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	12,5 (8,4)	4,5 (3,0)
Vitamine K, µg	14,0	5,0
Thiamine, mg	0,73	0,24
Riboflavine, mg	0,73	0,26
Vitamine B_6, mg	0,73	0,26
Vitamine B_{12}, µg	1,3	0,46
Niacine, mg	2,0	0,71
Acide folique, µg	210	75,0
Acide pantothénique, mg	4,2	1,5
Biotine, µg	11,2	4,0
Vitamine C, mg	42,0	15,0
Choline, mg	224	80,0
Inositol, mg	56,0	20,0
Minéraux		
Calcium, mg	980	350
Phosphore, mg	641	229
Magnésium, mg	113	40,3
Fer, mg	10,0	3,6
Zinc, mg	4,9	1,7
Manganèse, mg	0,92	0,33
Cuivre, µg	560	200
Iode, µg	139	49,6
Molybdène, µg	25,5	9,1
Chrome, µg	10,2	3,6
Sélénium, µg	28,2	10,1
Sodium, mg	280	100
Potassium, mg	445	159
Chlorure, mg	406	145

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales raffinées (huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique, huile de canola, triglycérides à chaîne moyenne [huile de palmiste et/ou de noix de coco], huile de tournesol), L-alanine, glycine, fructooligosaccharides, L-glutamine, acétate de L-lysine, inuline, L-thréonine, amidon de maïs, L-cystine, L-proline, phosphate de calcium dibasique, L-leucine, cellulose microcristalline, arôme artificiel, L-valine, gomme arabique, L-arginine, L-isoleucine, L-sérine, citrate tripotassique, citrate trisodique, chlorure de calcium, L-histidine, maltodextrine, bitartrate de choline, hydrogénophosphate de magnésium, L-méthionine, L-tryptophane, L-aspartate de magnésium, esters d'acide citrique des mono- et diglycérides (CITREM), huile de *C. cohnii***, citrate tricalcique, acide L-ascorbique, fibres de soya, M-inositol, taurine, sulfate de fer, lécithine de tournesol, L-carnitine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, niacinamide, sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acétate de vitamine A, palmitate d'ascorbyle, acide folique, iodure de potassium, tocophérols mixtes, molybdate de sodium, sélénite de sodium, chlorure de chrome, DL-alpha-tocophérol, vitamine D_3, phylloquinone, D-biotine, cyanocobalamine.

CONTIENT : Huile de noix de coco, soya.

** Une source d'acide docosahexaénoique (DHA)

TYR Lophlex^{MD} LQ

Une préparation prête à boire sans tyrosine ni phénylalanine*, contenant des acides aminés, des glucides, des vitamines, des minéraux et du DHA, à base de jus de fruits mélangés (faits de concentré) avec un arôme naturel; pour la prise en charge nutritionnelle de la tyrosinémie chez les personnes de 4 ans et plus, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Principales caractéristiques :

- Sans tyrosine ni phénylalanine
- Faible volume; fournit 20 g d'équivalent en protéines en seulement 125 ml (4,2 oz liq.)
- Pratique et prêt à boire
- À base de jus de fruits (faits de concentré) avec un arôme naturel – aucun arôme artificiel
- Contient un mélange équilibré d'acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides, de vitamines, de minéraux et de DHA
- Fournit 150 mg de DHA par sachet
- Arôme Explosion de petits fruits
- Osmolalité (à 0,96 kcal/ml) : 2 460 mOsm/kg d'H_2O

Indication :

- Tyrosinémie

Pour des détails sur l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par sachet
66750	30 x 125 ml (4,2 oz liq.)	120

* Peut contenir des traces de tyrosine et de phénylalanine provenant de jus de fruits (faits de concentré).

Information nutritionnelle :

Nutriments	Par sachet (125 ml)	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	120	60
Équivalent en protéines, g	20,0	10,0
Lipides, g	0,44	0,22
DHA, mg	150	75,0
Glucides, g	9,3	4,7
Fibres, g	0,50	0,25
Acides aminés, g		
L-alanine	1,13	0,57
L-arginine	1,68	0,84
Acide L-aspartique	1,63	0,82
L-cystine	0,83	0,42
Glycine	1,63	0,82
L-histidine	0,95	0,48
L-isoleucine	1,55	0,78
L-leucine	2,50	1,25
L-lysine	1,75	0,88
L-méthionine	0,40	0,20
L-phénylalanine	Trace*	Trace*
L-proline	2,03	1,02
L-sérine	1,30	0,65
L-thréonine	1,25	0,63
L-tryptophane	0,50	0,25
L-tyrosine	Trace*	Trace*
L-valine	1,65	0,83
L-carnitine	0,02	0,01
Taurine	0,14	0,07

Vitamines	Par sachet (125 ml)	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	949 (285)	475 (143)
Vitamine D_3, UI (µg)	320 (8,0)	160 (4,0)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	4,8 (3,2)	2,4 (1,6)
Vitamine K, µg	24,9	12,5
Thiamine, mg	0,54	0,27
Riboflavine, mg	0,50	0,25
Vitamine B_6, mg	0,58	0,29
Vitamine B_{12}, µg	1,8	0,90
Niacine, mg	7,1	3,6
Acide folique, µg	120	60,0
Acide pantothénique, mg	1,8	0,90
Biotine, µg	53,4	26,7
Vitamine C, mg	17,8	8,9
Choline, mg	153	76,5
Inositol, mg	40,6	20,3
Minéraux		
Calcium, mg	319	160
Phosphore, mg	244	122
Magnésium, mg	96,3	48,2
Fer, mg	5,1	2,6
Zinc, mg	3,8	1,9
Manganèse, mg	0,56	0,28
Cuivre, µg	563	282
Iode, µg	56,3	28,2
Molybdène, µg	25,0	12,5
Chrome, µg	10,8	5,4
Sélénium, µg	26,8	13,4
Sodium, mg	< 25,0	12,5
Potassium, mg	90,0	45,0
Chlorure, mg	< 25,0	< 12,5

Ingrédients :

Eau, jus de pomme fait de concentré (34,1 %), jus de raisin fait de concentré (6,9 %), jus de cassis fait de concentré (2,5 %), L-leucine, acétate de L-lysine, acide citrique, L-proline, L-arginine, L-valine, acide L-aspartique, glycine, L-isoleucine, L-sérine, L-thréonine, extraits secs de sirop de maïs, phosphate dicalcique, L-alanine, L-histidine, L-cystine, jus de baie de sureau fait de concentré (0,6 %), maltodextrine, acétate de magnésium, sucre, N-acétyl-L-méthionine, L-tryptophane, bitartrate de choline, huile de *C. cohnii***, cellulose microcristalline, arôme naturel, taurine, concentrés de fruits (pomme, cassis, radis), acide L-ascorbique, gomme de guar, lécithine de tournesol, gomme de xanthane, M-inositol, sorbate de potassium (agent de conservation), édulcorant artificiel : sucralose§, lactate ferreux, édulcorant artificiel : acésulfame de potassium‡, L-carnitine, benzoate de sodium (agent de conservation), sulfate de zinc, niacinamide, acétate de DL-alpha-tocophéryle, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, palmitate de vitamine A, riboflavine, acide folique, iodure de potassium, palmitate d'ascorbyle, tocophérols mixtes, molybdate de sodium, D-biotine, sélénite de sodium, chlorure de chrome, phylloquinone, vitamine D_3, cyanocobalamine.

** Une source d'acide docosahexaénoïque (DHA)

§ Contient 31,3 mg de sucralose par 125 ml

‡ Contient 25 mg d'acésulfame de potassium par 125 ml

CONTIENT : 44,1 % de jus.

TYR Lophlex[MD] GMP MIX-IN

Une préparation en poudre à faible teneur en phénylalanine et en tyrosine, contenant un mélange de glycomacropeptides (GMP), d'acides aminés essentiels et non essentiels, de glucides en petites quantités et de quelques minéraux. Pour la prise en charge nutritionnelle de la tyrosinémie (TYR) confirmée chez les personnes de plus de 1 an.

Principales caractéristiques :

- Une source flexible de protéines à base de GMP pour aider les patients à atteindre leurs objectifs nutritionnels
- La plus grande quantité de protéines pour 100 g de poudre parmi tous les produits pour la TYR
- Se mélange à une préparation pour la TYR afin d'augmenter la quantité de protéines provenant d'une source à base de GMP
- Se mélange facilement avec des boissons et des aliments aromatisés pour offrir de la variété
- Fournit seulement 40 kcal par sachet
- Moins de 0,5 g de sucre par sachet
- Aucun lipide, aucun arôme artificiel

Indication :

- Tyrosinémie

Pour des détails sur l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par sachet
135757	20 x 12,5 g (0,44 oz)	40

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g de poudre	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 sachet)
Calories	324	40
Équivalent en protéines, g	80,0	10,0
Lipides, g	< 0,10	< 0,10
Glucides, g	< 1,0	< 0,50
Acides aminés, g		
L-alanine	3,2	0,40
L-arginine	3,9	0,48
Acide L-aspartique	4,7	0,59
L-cystine	1,2	0,15
Acide L-glutamique	10,8	1,35
Glycine	7,5	0,94
L-histidine	3,9	0,49
L-isoleucine	5,8	0,73
L-leucine	11,6	1,45
L-lysine	6,2	0,78
L-méthionine	1,9	0,24
L-phénylalanine, mg	143	18,0
L-proline	6,3	0,79
L-sérine	4,1	0,51
L-thréonine	9,0	1,13
L-tryptophane	1,9	0,24
L-tyrosine, mg	28	3,5
L-valine	7,0	0,88
L-carnitine	0,08	0,01
Taurine	0,24	0,03

Minéraux	Pour 100 g de poudre	Pour 10 g d'équivalent en protéines (1 sachet)
Calcium, mg	62,1	7,8
Phosphore, mg	320	40,0
Potassium, mg	960	120
Sodium, mg	1 125	141

Ingrédients :

Glycomacropeptide* (Lait), L-leucine, glycine, acétate de L-lysine, L-histidine, L-arginine, L-valine. Contient 2 % ou moins de : L-tryptophane, L-cystine, L-méthionine, extraits secs de sirop de maïs, dioxyde de silicium, taurine, L-carnitine.

CONTIENT : Lait.

* Contient 18 mg de phénylalanine et 3,5 mg de tyrosine par 10 g d'équivalent en protéines

Remarque : Doit être combiné à un supplément de vitamines et de minéraux lorsque pris comme seule source de préparation pour la TYR.



UCD Anamix[MD] Junior

Préparation en poudre contenant des acides aminés essentiels (avec des taux accrus d'acides aminés à chaîne ramifiée et de tryptophane), des glucides, des lipides, des vitamines et des minéraux; pour la prise en charge nutritionnelle des maladies du cycle de l'urée (MCU), du syndrome d'hyperammoniémie-hyperornithinémie-homocitrullinémie (HHH) et de l'atrophie gyrée chez les patients de plus de 1 an.

Principales caractéristiques :

- Contient des acides aminés essentiels pour aider à maintenir un équilibre azoté positif dans le contexte des MCU
- Profil d'acides aminés à teneur élevée en BCAA pour une synthèse des protéines efficace et optimale chez les enfants présentant une MCU
- Quantité suffisante de calories non protéiques pour empêcher la dégradation des protéines produisant de l'énergie et des métabolites toxiques
- Des micronutriments essentiels comme du calcium, de la vitamine D, du fer et du zinc sont fournis pour compenser la faible consommation d'aliments naturels
- Offert en deux variétés : vanille et non aromatisé
- Osmolalité (mOsm/kg d'H_2O) :
  Dilution
  1 dans 3,5 1 040
- Déplacement : 0,7 ml/g

Indications :

- Maladies du cycle de l'urée (MCU)
- Syndrome d'hyperammoniémie-hyperornithinémie-homocitrullinémie (HHH)
- Atrophie gyrée

Pour des détails sur l'administration et les mesures domestiques, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
59292 – Non aromatisé	6 x 400 g (14 oz)	1 540
59293 – Vanille	6 x 400 g (14 oz)	1 540

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Calories	385	321
Équivalent en protéines, g	12,0	10,0
Lipides, g	17,0	14,2
Glucides, g	46,0	38,3
Acides aminés, g		
L-alanine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-arginine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-asparagine	Aucun ajout	Aucun ajout
Acide L-aspartique	Aucun ajout	Aucun ajout
L-citrulline	Aucun ajout	Aucun ajout
L-cystine	0,43	0,36
Acide L-glutamique	Aucun ajout	Aucun ajout
L-glutamine	Aucun ajout	Aucun ajout
Glycine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-histidine	0,51	0,43
L-isoleucine	2,26	1,88
L-leucine	3,82	3,18
L-lysine	1,92	1,60
L-méthionine	0,40	0,33
L-phénylalanine	0,67	0,56
L-proline	Aucun ajout	Aucun ajout
L-sérine	Aucun ajout	Aucun ajout
L-thréonine	1,59	1,32
L-tryptophane	0,48	0,40
L-tyrosine	1,23	1,02
L-valine	2,29	1,91
L-carnitine	0,01	0,01
Taurine	0,07	0,06

Vitamines	Pour 100 g	Pour 10 g d'équivalent en protéines
Vitamine A, UI (µg ÉR)	3 197 (960)	2 664 (800)
Vitamine D_3, UI (µg)	920 (23,0)	767 (19,2)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	27,5 (18,5)	22,9 (15,4)
Vitamine K, µg	92,2	76,8
Thiamine, mg	1,9	1,6
Riboflavine, mg	1,5	1,3
Vitamine B_6, mg	1,5	1,3
Vitamine B_{12}, µg	3,8	3,2
Niacine, mg	9,6	8,0
Acide folique, µg	461	384
Acide pantothénique, mg	6,1	5,1
Biotine, µg	34,6	28,8
Vitamine C, mg	120	100
Choline, mg	480	400
Inositol, mg	108	90
Minéraux		
Calcium, mg	1 555	1 296
Phosphore, mg	1 555	1 296
Magnésium, mg	246	205
Fer, mg	26,9	22,4
Zinc, mg	21,1	17,6
Manganèse, mg	3,6	3,0
Cuivre, µg	1 900	1 583
Iode, µg	276	230
Molybdène, µg	63,4	52,8
Chrome, µg	41,3	34,4
Sélénium, µg	76,8	64,0
Sodium, mg	1 114	928
Potassium, mg	1 613	1 344
Chlorure, mg	864	720

Ingrédients :

Non aromatisé : Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales raffinées (huile de carthame à teneur élevée en acide oléique, huile de canola, huile de noix de coco fractionnée), sucre, L-leucine, phosphate de sodium dibasique, citrate tripotassique, citrate tricalcique, phosphate tricalcique, chlorhydrate de L-lysine, L-valine, L-isoleucine, hydrogénophosphate de magnésium, L-thréonine, bitartrate de choline, L-tyrosine, chlorure de potassium, esters d'acide citrique des mono- et diglycérides (un émulsifiant), L-phénylalanine, L-histidine, L-tryptophane, L-cystine, L-méthionine, acide L-ascorbique, M-inositol, sulfate de fer, taurine, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, sulfate de manganèse, niacinamide, L-carnitine, D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acétate de vitamine A, acide folique, iodure de potassium, sélénite de sodium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, phylloquinone, D-biotine, vitamine D_3, cyanocobalamine.

La version aromatisée à la **vanille** contient également : Arôme artificiel.

CONTIENT : Huile de noix de coco.

Veuillez consulter l'étiquette des produits individuels pour connaître l'ordre exact des ingrédients.

Mesures domestiques

Mesure	g de produit	g d'équivalent en protéines
Periflex Infant		
Mesurette fournie	4,75	0,62
1 c. à table	7	0,91
1 tasse	114	14,8
PKU Periflex Junior Plus (nature)		
Mesurette fournie	9,0	2,5
1 c. à table	8,7	2,4
1 tasse	139	38,9
PKU Periflex Junior Plus (aromatisé)		
Mesurette fournie	9,0	2,5
1 c. à table	8,3	2,3
1 tasse	132	37
TYR Anamix Next		
Mesurette fournie	9,0	2,5
1 c. à table	8,6	2,4
1 tasse	137	38,4

Mesure	g de produit	g d'équivalent en protéines
HCU Anamix Next		
Mesurette fournie	9,0	2,5
1 c. à table	8,3	2,3
1 tasse	133	37,2
IVA, MMA/PA Anamix Next		
Mesurette fournie	9,0	2,5
1 c. à table	8,8	2,5
1 tasse	140	39,2
UCD Anamix Junior (non aromatisé)		
Mesurette fournie	5,0	0,60
1 c. à table	9,0	1,1
1 tasse	143	17,2
UCD Anamix Junior (vanille)		
Mesurette fournie	5,0	0,60
1 c. à table	8,7	1,0
1 tasse	139	16,7
Periflex Advance		
1 c. à table	9,4	3,3
1 tasse	150	53
PhenylAde Essential Drink Mix		
Mesurette fournie ou 1 sachet	40	10
1 c. à table	10	2,5
1 tasse	160	40
PhenylAde GMP Drink Mix		
Mesurette fournie ou 1 sachet	33,3	10
1 c. à table	6,6	2
1 tasse	128	38,4
PhenylAde GMP MIX-IN		
1 sachet	12,5	10
PhenylAde GMP ULTRA		
1 sachet	33,4	20

Selon les mesures domestiques sèches standards*. Toutes les mesures sont des mesures rases de poudre non tassée. Ces valeurs ne sont qu'approximatives et sont présentées pour plus de commodité : les résultats peuvent varier selon la personne qui mesure, l'instrument de mesure et la méthode utilisée. Nutricia North America recommande d'utiliser une balance pour obtenir les mesures les plus précises. Les mesurettes fournies par Nutricia ont été approuvées pour un usage avec les préparations de Nutricia et sont donc préférables aux mesures domestiques.

* Mesures domestiques pour produit sec : 1 tasse = 240 ml; ¾ tasse = 120 ml; ⅓ tasse = 80 ml; ¼ tasse = 60 ml; 1 c. à table = 15 ml; 1 c. à thé = 5 ml; ½ c. à thé = 2,5 ml

Mesure	g de produit	g d'équivalent en protéines
PhenylAde 40 Drink Mix		
1 sachet	25	10
PhenylAde 60 Drink Mix		
Mesurette fournie ou 1 sachet	16,7	10
1 c. à table	9,8	5,9
1 tasse	148	90
PhenylAde MTE Amino Acid Blend		
Mesurette fournie ou 1 sachet	12,8	10
1 c. à table	8,5	6,6
1 tasse	116	90
GlutarAde Junior		
Mesurette fournie	9,8	0,98
1 c. à table	9,3	0,93
1 tasse	146	14,6
GlutarAde Essential		
Mesurette fournie	40	10
1 c. à table	10	2,5
1 tasse	160	40
GlutarAde Amino Acid Blend		
Mesurette fournie	12,3	10
1 c. à table	8,5	6,9
1 tasse	116	94
Complex MSD Junior		
Mesurette fournie	8,5	1,1
1 c. à table	8,4	1,1
1 tasse	118	15,2
Complex MSD Essential		
Mesurette fournie	40	10
1 c. à table	9,8	2,4
1 tasse	160	40

Mesure	g de produit	g d'équivalent en protéines
Complex MSD Amino Acid Blend		
Mesurette fournie	12,4	10
1 c. à table	8,2	6,6
1 tasse	124	100
Gamme Maxamum (aromatisé et non aromatisé)		
1 c. à table	9	3,6
1 tasse	145	58
TYR Lophlex GMP MIX-IN		
1 sachet	12,5	10

Selon les mesures domestiques sèches standards*. Toutes les mesures sont des mesures rases de poudre non tassée. Ces valeurs ne sont qu'approximatives et sont présentées pour plus de commodité : les résultats peuvent varier selon la personne qui mesure, l'instrument de mesure et la méthode utilisée. Nutricia North America recommande d'utiliser une balance pour obtenir les mesures les plus précises. Les mesurettes fournies par Nutricia ont été approuvées pour un usage avec les préparations de Nutricia et sont donc préférables aux mesures domestiques.

* Mesures domestiques pour produit sec : 1 tasse = 240 ml; ¾ tasse = 120 ml; ⅓ tasse = 80 ml; ¼ tasse = 60 ml; 1 c. à table = 15 ml; 1 c. à thé = 5 ml; ½ c. à thé = 2,5 ml

Periflex[MD] Infant

Préparation pour nourrissons contenant du fer, du DHA et de l'ARA, pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie.

Administration :

- La préparation pour nourrissons Periflex doit être consommée en association avec une source de protéines complètes (p. ex., le lait maternel ou une préparation pour nourrissons standard) aux quantités prescrites par un diététiste ou un médecin afin de répondre aux besoins en protéines complètes et d'assurer une croissance normale.
- La quantité et la dilution de la préparation varieront selon l'âge, le poids corporel, l'état de santé et la tolérance aux protéines du nourrisson.

Instructions pour le mélange :

1. Se laver les mains avec de l'eau et du savon.
2. Nettoyer et désinfecter la surface de travail.
3. Pour stériliser les biberons, les tétines, les capuchons et les autres pièces, les placer dans une casserole remplie d'eau et porter l'eau à ébullition. Laisser bouillir à gros bouillons pendant 2 minutes. Retirer la casserole du feu et couvrir jusqu'au moment d'utiliser.
4. Porter de l'eau fraîche à ébullition, laisser bouillir à gros bouillons pendant 2 minutes, puis laisser refroidir. Si le nourrisson est né à terme et en bonne santé, laisser refroidir l'eau jusqu'à la température ambiante. Si le nourrisson était de faible poids à la naissance ou s'il est immunodéprimé, consulter un professionnel de la santé.
5. Selon une dilution standard (0,67 kcal/ml), 1 mesurette rase de poudre non tassée (4,75 g de poudre) donne 30 ml de préparation liquide.
6. Mesurer la quantité requise de poudre à l'aide de la mesurette fournie et ajouter au(x) biberon(s) (voir le tableau ci-dessous).
7. Ajouter la quantité requise d'eau. Mettre le capuchon sur le(s) biberon(s).
8. Bien agiter pendant 15 à 20 secondes jusqu'à ce que la poudre soit dissoute.
9. Utiliser immédiatement ou réfrigérer aussitôt à une température de 4 °C ou moins et utiliser au cours des 24 heures qui suivent.
10. Agiter juste avant d'utiliser.
11. Une fois la préparation entamée, l'utiliser au cours de l'heure qui suit. Jeter toute portion de préparation inutilisée.
12. Ne pas préparer ou faire chauffer la préparation au four à micro-ondes.
13. Ne pas faire bouillir la préparation reconstituée.

Quantité d'eau à ajouter	Quantité de poudre	Volume final
105 ml	4 mesurettes rases de poudre non tassée (19 g)	120 ml
215 ml	8 mesurettes rases de poudre non tassée (38 g)	240 ml
800 ml	30 mesurettes rases de poudre non tassée (142,5 g)	900 ml

Conservation :

- Conserver les boîtes non ouvertes à la température ambiante, à l'abri des températures extrêmes. Une fois ouverte, refermer la boîte avec le couvercle fourni et la conserver dans un endroit frais et sec. Utiliser au cours du mois qui suit.

PKU Periflex[MD] Junior Plus et Anamix[MD] Next

Préparations pour la prise en charge nutritionnelle des maladies métaboliques chez les personnes de plus de 1 an.

Administration :

- PKU Periflex Junior Plus et Anamix Next doivent être consommés en association avec des protéines complètes et d'autres nutriments aux quantités prescrites par un diététiste ou un médecin afin de répondre aux besoins en protéines complètes, en liquides et en nutriments généraux.
- L'apport de Periflex Junior Plus ou d'Anamix Next dépend de l'âge, du poids corporel et de l'état de santé de la personne. Periflex Junior ou Anamix Next doivent être divisés en portions égales réparties sur toute la journée.

Instructions pour le mélange :

- Ajouter le volume d'eau désiré à un agitateur ou à un autre contenant muni d'un couvercle étanche. Ajouter ensuite la quantité de poudre prescrite et agiter jusqu'à ce le mélange soit homogène. La préparation a meilleur goût lorsqu'elle est servie froide.
- La dilution standard est 36 g de poudre (environ 4 mesurettes) dans 100 ml (3,5 oz liq.) d'eau pour obtenir un volume final d'environ 126 ml (4,3 oz liq.).

Dilution (kcal/ml)	Quantité de poudre	Eau ajoutée	Volume final
0,6	18 g (environ 2 mesurettes)	100 ml (3,5 oz liq.)	114 ml (3,9 oz liq.)
0,9	27 g (environ 3 mesurettes)	100 ml (3,5 oz liq.)	120 ml (4,0 oz liq.)
1,1	36 g (environ 4 mesurettes)	100 ml (3,5 oz liq.)	126 ml (4,3 oz liq.)

Il est préférable de consommer une préparation fraîchement reconstituée. Réfrigérer immédiatement la préparation prémélangée et utiliser au cours des 24 heures qui suivent. Agiter juste avant d'utiliser. En cas d'alimentation par sonde, ne pas conserver dans les tubes pendant plus de 4 heures.

Précautions :

- Ne doit être consommé que par des personnes présentant des erreurs innées du métabolisme confirmées. Ne convient pas aux nourrissons. Ne convient pas comme seule source d'alimentation. N'est pas destiné à un usage parentéral.

Conservation :

- Conserver toute boîte non ouverte à la température ambiante. Ne pas entreposer à des températures extrêmes. Une fois ouverte, refermer la boîte avec le couvercle fourni et la conserver dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur); utiliser au cours des 14 jours qui suivent.

Periflex[MD] Advance et Periflex[MD] LQ

Préparations destinées à un groupe d'âge spécifique pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Administration :

- Utiliser seulement sous la supervision d'un médecin ou d'un diététiste. Periflex doit être consommé en association avec des protéines complètes, des liquides et d'autres nutriments, aux quantités prescrites par un médecin ou un diététiste afin de répondre aux besoins en phénylalanine et en nutriments généraux.
- Periflex Advance est destiné aux enfants plus âgés et aux adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.
- L'apport de Periflex dépend de l'âge, du poids corporel et de l'état de santé de la personne. Periflex doit être divisé en portions égales réparties sur toute la journée.

Instructions pour le mélange :

Periflex Advance

- Ajouter le volume d'eau désiré à un agitateur ou à un autre contenant muni d'un couvercle étanche. Ajouter ensuite la quantité de poudre prescrite et agiter jusqu'à ce le mélange soit homogène. Les indications de dilution sont présentées dans les tableaux qui suivent. Periflex est meilleur servi froid.
- Periflex a bon goût lorsqu'il est mélangé avec 30 ml (1 oz liq.) d'eau pour chaque 5 à 6 grammes de poudre.
- Une fois reconstituée, conserver la préparation au réfrigérateur pendant un maximum de 24 heures. Agiter ou remuer la préparation immédiatement avant utilisation.

Indications de dilution pour Periflex Advance

Volume d'eau	Quantité prescrite de poudre	ÉP approx.
60 à 90 ml (2 à 3 oz liq.)	16 g	6 g
120 à 150 ml (4 à 5 oz liq.)	32 g	11 g
240 à 300 ml (8 à 10 oz liq.)	64 g	22 g
480 à 600 ml (16 à 20 oz liq.)	128 g	45 g

Periflex LQ

Bien agiter avant d'utiliser. La préparation a meilleur goût lorsqu'elle est servie froide.

Précautions :

- Ne doit être consommé que par des personnes présentant une phénylcétonurie confirmée. Ne convient pas aux nourrissons. Ne convient pas comme seule source d'alimentation. N'est pas destiné à un usage parentéral.

Conservation :

- Conserver toute boîte non ouverte à la température ambiante. Ne pas entreposer à des températures extrêmes. Une fois ouverte, refermer la boîte avec le couvercle et la conserver dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur); utiliser au cours du mois qui suit.
- Conserver Periflex LQ dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil.

Les rapports de dilution ne sont fournis qu'à titre indicatif. Periflex Advance peut être administré sous une forme plus concentrée (p. ex., une pâte ou une boisson concentrée) en utilisant moins d'eau. Si c'est le cas, de l'eau ou d'autres boissons devraient être consommées en même temps.

Analog[MC]

Préparations pour nourrissons pour la prise en charge nutritionnelle des maladies métaboliques.

Administration :

- Les préparations métaboliques pour nourrissons Analog doivent être consommées en association avec une source de protéines complètes (p. ex., le lait maternel ou une préparation pour nourrissons standard) aux quantités prescrites par un diététiste ou un médecin afin de répondre aux besoins en protéines complètes et d'assurer une croissance normale.
- L'apport d'Analog variera selon l'âge, le poids corporel, l'état de santé et la tolérance aux protéines du nourrisson.

Instructions pour le mélange :

1. Se laver soigneusement les mains et nettoyer la surface de préparation. Stériliser le système d'alimentation par biberon.
2. Faire bouillir l'eau pendant 5 minutes et laisser refroidir pendant au moins 30 minutes afin qu'elle soit tiède lorsqu'appliquée sur le poignet.
3. Ajouter la quantité prescrite de poudre Analog et une source de protéines au biberon stérilisé. Pour plus de précision, Analog doit être pesé sur une balance qui se lit en grammes. Si la mesurette fournie est utilisée, remplir la mesurette, puis enlever ce qui dépasse avec un couteau propre et sec. Ne pas presser la poudre dans la mesurette.
4. Verser la quantité requise d'eau bouillie refroidie dans le biberon. Pour effectuer la dilution recommandée (21 kcal/oz liq.), Analog nécessite 30 ml (1 oz liq.) d'eau pour chaque part de 5 g (1 mesurette rase non tassée) de poudre. Fixer le capuchon sur le biberon et agiter jusqu'à ce que la poudre soit dissoute.
5. S'assurer que la préparation est tiède en plaçant quelques gouttes sur votre poignet.

La préparation reconstituée à l'avance doit être refroidie rapidement, conservée au réfrigérateur à une température comprise entre 1,5 et 4,5 °C (35 et 40 °F) et utilisée au cours des 24 heures qui suivent. Agiter juste avant d'utiliser. La préparation restante dans le biberon après 1 heure d'alimentation doit être jetée. L'alimentation par sonde ne doit pas durer plus de 4 heures.

Mise en garde :

- Ne pas faire bouillir la préparation. Ne pas préparer ou faire chauffer la préparation au four à micro-ondes.

Précautions :

- Administrer uniquement sous étroite surveillance médicale aux nourrissons présentant des erreurs innées du métabolisme confirmées. Ne convient pas comme seule source d'alimentation. N'est pas destiné à un usage parentéral.

Conservation :

- Conserver toute boîte non ouverte à la température ambiante. Ne pas entreposer à des températures extrêmes. Une fois ouverte, refermer la boîte avec le couvercle fourni et la conserver dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur); utiliser au cours du mois qui suit.

Maxamum[MD]

Préparations destinées à un groupe d'âge spécifique pour la prise en charge nutritionnelle des maladies métaboliques chez les enfants plus âgés et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Administration :

- Doit être consommé en association avec des protéines complètes, des liquides et d'autres nutriments, aux quantités prescrites par un médecin ou un diététiste, afin de répondre aux besoins en protéines et en nutriments généraux.
- L'apport recommandé variera selon l'âge, le poids corporel et l'état de santé de la personne. L'apport est ajusté pour maintenir la croissance et le développement normaux. Pour plus de précision, peser sur une balance qui se lit en grammes. L'apport quotidien doit être divisé en portions égales réparties sur toute la journée.
- Destiné aux enfants plus âgés et aux adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Instructions pour le mélange :

- Meilleur lorsque servi avec les repas.
- Faire une pâte avec la quantité prescrite de poudre et un petit volume d'eau froide. Ajouter graduellement suffisamment d'eau pour obtenir le volume désiré.
- Pour un meilleur goût, consommer immédiatement. Les volumes plus importants de préparation reconstituée doivent être réfrigérés et utilisés au cours des 24 heures qui suivent. Agiter ou remuer la préparation immédiatement avant utilisation.

Dilution	Quantité de poudre	Volume d'eau	ÉP approx.
1 dans 7	35 g	245 ml (environ 8 oz liq.)	14 g
1 dans 7	1 sachet (50 g)	350 ml (environ 12 oz liq.)	20 g
1 dans 5	35 g	175 ml (environ 6 oz liq.)	14 g
1 dans 5	1 sachet (50 g)	250 ml (environ 8 oz liq.)	20 g

- Il est recommandé de préparer Maxamum dans un rapport de dilution initial de 1 dans 7, puis de passer à une dilution de 1 dans 5. Les rapports de dilution ne sont fournis qu'à titre indicatif. Le produit peut être administré sous une forme plus concentrée (p. ex., boisson ou pâte). Si c'est le cas, de l'eau ou des boissons diluées devraient être offertes en même temps.

Précautions :

- Administrer uniquement sous étroite surveillance médicale aux patients présentant des erreurs innées du métabolisme. Ne convient pas aux enfants de moins de 1 an. Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation. N'est pas destiné à un usage parentéral.

Conservation :

- Conserver les boîtes/sachets non ouverts à la température ambiante. Ne pas entreposer à des températures extrêmes. Une fois ouverte, refermer la boîte avec le couvercle et la conserver dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur); utiliser au cours du mois qui suit.

PhenylAde[MD]

Préparations pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les enfants et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Administration :

- Utiliser seulement sous la supervision d'un médecin ou d'un diététiste. PhenylAde doit être consommé en association avec des protéines complètes, des liquides et d'autres nutriments aux quantités prescrites par un médecin ou un diététiste afin de répondre aux besoins en phénylalanine et en nutriments généraux.

Instructions pour le mélange :

1. Ajouter la quantité prescrite de poudre PhenyLade à de l'eau froide, puis agiter ou remuer jusqu'à ce qu'elle se soit complètement mélangée à l'eau.
2. La dilution peut être adaptée au goût. Voir la dilution recommandée ci-dessous pour une indication.
3. Une fois reconstituée, conserver la préparation au réfrigérateur pendant un maximum de 24 heures. Agiter ou remuer la préparation immédiatement avant utilisation.
4. Ne pas réchauffer, cuire au four ou ajouter à des aliments ou à des boissons à plus de 54,4 °C (130 °F).

Dilution recommandée :

- PhenylAde Essential Drink Mix
  Ajouter le contenu de 1 mesurette ou 1 sachet (40 g) à environ 210 ml (7 oz liq.) d'eau froide.
- PhenylAde GMP Drink Mix
  Ajouter le contenu de 1 mesurette ou de 1 sachet (33,3 g) à environ 150 à 180 ml (5 à 6 oz liq.) d'eau froide.
- PhenylAde GMP READY
  Bien agiter avant d'utiliser. Meilleur servi froid ou à la température ambiante.
- PhenylAde GMP MIX-IN
  Ajouter le contenu de 1 sachet (12,5 g) à environ 180 à 240 ml (6 à 8 oz liq.) d'eau froide ou d'une boisson aromatisée (sans protéines).
- PhenylAde GMP ULTRA
  Ajouter le contenu de 1 sachet (33,4 g) à environ 180 ml (6 oz liq.) d'eau froide.
- PhenylAde40 Drink Mix
  Ajouter le contenu de 1 sachet (25 g) à environ 120 à 180 ml (4-6 oz liq.) d'eau froide.
- PhenylAde60 Drink Mix
  Ajouter le contenu de 1 mesurette ou de 1 sachet (16,7 g) à environ 90 ml (3 oz liq.) d'eau froide.
- PhenylAde MTE Amino Acid Blend
  Ajouter simplement une portion à une part d'aliment, de boisson ou de préparation pour la PCU à faible teneur en protéines. La taille de la portion appropriée doit être établie et consommée afin de répondre aux besoins prescrits en matière d'acides aminés de protéines. Non destiné à être ajouté à de l'eau.

Précautions :

- Doit être consommé par des personnes présentant une phénylcétonurie confirmée. Ne convient pas aux nourrissons. Ne convient pas comme seule source d'alimentation. N'est pas destiné à un usage parentéral.

Conservation :

- Conserver toute boîte non ouverte à la température ambiante. Ne pas entreposer à des températures extrêmes. Une fois ouverte, refermer la boîte avec le couvercle fourni et la conserver dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur); utiliser au cours du mois qui suit (s'applique à tous les produits PhenylAde, sauf PhenylAde GMP Drink Mix et PhenylAde GMP READY). PhenylAde GMP Drink Mix doit être utilisé au cours des 2 semaines suivant l'ouverture. PhenylAde GMP READY doit être utilisé immédiatement ou réfrigéré rapidement une fois ouvert. Utiliser au cours des 24 heures qui suivent.

Phlexy-10[MD] Drink Mix

Une préparation sans phénylalanine pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les personnes de plus de 1 an, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Administration :

- Phlexy-10 Drink Mix doit être consommé en association avec des protéines complètes, des liquides et d'autres nutriments aux quantités prescrites par un médecin ou un diététiste afin de répondre aux besoins en phénylalanine et en nutriments généraux. Les sources de lipides et de glucides à faible teneur en protéines peuvent servir à fournir les calories nécessaires et à répondre aux besoins essentiels en acides gras.
- L'apport de Phlexy-10 Drink Mix variera selon l'âge, le poids corporel et l'état de santé de la personne. L'apport est ajusté pour maintenir la croissance et le développement normaux. Un sachet du mélange pour boisson équivaut à 8,33 g de protéines.
- Phlexy-10 Drink Mix ne contient pas de vitamines, de minéraux ou d'oligoéléments. Il est essentiel que ces nutriments soient fournis séparément.

Instructions pour le mélange :

- Mélanger le contenu d'un sachet avec une petite quantité d'eau, en remuant de manière à former une pâte épaisse. Continuer à remuer tout en ajoutant de l'eau pour obtenir un volume final d'environ 100 ml (~3,5 oz liq.). Une fois reconstituée, conserver la préparation au réfrigérateur pendant un maximum de 24 heures. Agiter ou remuer la préparation immédiatement avant utilisation.

Précautions :

- Administrer uniquement sous étroite surveillance médicale aux patients présentant une phénylcétonurie confirmée. Ne convient pas comme seule source d'alimentation.
  Ne convient pas aux nourrissons de moins de 1 an.
  N'est pas destiné à un usage parentéral.

Conservation :

- Phlexy-10 Drink Mix doit être conservé dans un endroit frais et sec. Une fois reconstitué, Phlexy-10 Drink Mix doit être conservé au réfrigérateur pendant un maximum de 24 heures.

PhenylAde[MC] PheBLOC[MC] LNAA

Préparation en poudre sans phénylalanine contenant les acides aminés essentiels restants (grands acides aminés neutres et lysine). Pour la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) chez les personnes de plus de 12 ans.

Administration :

- Utiliser seulement sous la supervision d'un médecin ou d'un diététiste. Les produits doivent être consommés en association avec des protéines complètes, des liquides et d'autres nutriments aux quantités prescrites par un médecin ou un diététiste afin de répondre aux besoins en phénylalanine et en nutriments généraux.
- L'apport dépend de l'âge, du poids corporel et de l'état de santé de la personne.

Instructions pour le mélange :

- Ajouter le contenu de 1 sachet (3 g) à ~½ tasse de tout aliment semi-solide (c.-à-d., compote de pommes, purée de pommes de terre, pudding, sorbet, etc.).

Précautions :

- Ne doit être consommé que par des personnes présentant une phénylcétonurie confirmée. Convient aux personnes de plus de 12 ans. Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation. N'est pas destiné à un usage parentéral.
- **Ne pas utiliser lorsqu'une grossesse est planifiée ou pendant la grossesse.**
- **Consulter un médecin avant d'utiliser des médicaments sérotoninergiques ou tout type de psychotrope.**

Conservation :

- Conserver les sachets non ouverts dans un endroit frais et sec.

Lophlex[MD] en poudre et Lophlex[MD] LQ

Préparations à faible volume à base d'acides aminés pour la prise en charge nutritionnelle des maladies métaboliques chez les enfants et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Administration :

- Utiliser seulement sous la supervision d'un médecin ou d'un diététiste. Lophlex et Lophlex LQ doivent être consommés en association avec des protéines complètes, des liquides et d'autres nutriments aux quantités prescrites par un médecin ou un diététiste afin de répondre aux besoins en acides aminés et en nutriments généraux. Les sources de lipides et de glucides à faible teneur en protéines peuvent servir à fournir les calories nécessaires et à répondre aux besoins essentiels en acides gras.
- L'apport de Lophlex et de Lophlex LQ variera selon l'âge, le poids corporel et l'état de santé de la personne. L'apport est ajusté pour maintenir la croissance et le développement normaux. Lophlex et Lophlex LQ doivent être divisés en portions égales réparties sur toute la journée.

Reconstitution (Lophlex LQ) :

- Lophlex LQ est prêt à boire et a meilleur goût lorsqu'il est servi froid. Agiter vigoureusement avant d'utiliser.

Instructions pour le mélange (Lophlex en poudre) :

- Mélanger le contenu d'un sachet avec une petite quantité d'eau pour faire une pâte. Continuer à remuer tout en ajoutant de l'eau pour obtenir un volume final d'environ 70 ml (2,5 oz liq.) afin d'arriver à une dilution de 1 dans 5. Lophlex peut être pris sous une forme plus concentrée, soit en boisson ou en pâte. Si c'est le cas, de l'eau ou des boissons diluées devraient être offertes en même temps. Il est préférable de reconstituer Lophlex avec de l'eau froide et de consommer une préparation fraîchement reconstituée. Les volumes plus importants de préparation reconstituée doivent être réfrigérés et utilisés au cours des 24 heures qui suivent. Agiter ou remuer la préparation immédiatement avant utilisation.

Précautions :

- Administrer uniquement sous étroite surveillance médicale chez les personnes atteintes d'une maladie métabolique confirmée. Ne convient pas comme seule source d'alimentation. N'est pas destiné à un usage parentéral.

Conservation :

- Conserver dans un endroit frais et sec, à une température de moins de 30 °C (86 °F) (pas au réfrigérateur) et à l'abri des rayons du soleil.

Dilution recommandée (TYR Lophlex GMP MIX-IN) :

- Ajouter le contenu de 1 sachet (12,5 g) à environ 180 à 240 ml (6 à 8 oz liq.) d'une boisson aromatisée refroidie (sans protéines).

Complex MSD[MD] : Junior, Essential et Amino Acid Blend

Préparations pour la prise en charge nutritionnelle de la leucinose chez les enfants et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Administration :

- Utiliser seulement sous la supervision d'un médecin ou d'un diététiste. Complex doit être consommé en association avec des protéines complètes, des liquides et d'autres nutriments aux quantités prescrites par un médecin ou un diététiste afin de répondre aux besoins en acides aminés à chaîne ramifiée et en nutriments généraux.

Instructions pour le mélange :

- Ajouter la quantité prescrite de poudre Complex à de l'eau froide, puis agiter ou remuer jusqu'à ce qu'elle se soit complètement mélangée à l'eau.
- La dilution peut être adaptée au goût. Consulter les indications dans les tableaux qui suivent.
- Une fois reconstituée, conserver la préparation au réfrigérateur pendant un maximum de 24 heures. Agiter ou remuer la préparation immédiatement avant utilisation.
- Ne pas réchauffer, cuire au four ou ajouter à des aliments ou à des boissons à plus de 54 °C (130 °F).

Dilution recommandée :

- Complex MSD Junior

Dilution d'environ 20 calories par 30 ml (1 oz liq.)

Pour faire environ	Eau	Quantité de poudre
60 ml (2 oz liq.)	60 ml (2 oz liq.)	8,5 g
120 ml (4 oz liq.)	120 ml (4 oz liq.)	17 g
180 ml (6 oz liq.)	180 ml (6 oz liq.)	26 g
240 ml (8 oz liq.)	240 ml (8 oz liq.)	34 g

Une mesurette rase de poudre non tassée donne environ 8,5 g de poudre. Pour plus de précision, utiliser une balance.

Dilution d'environ 30 calories par 30 ml (1 oz liq.)

Pour faire environ	Eau	Quantité de poudre
60 ml (2 oz liq.)	60 ml (2 oz liq.)	12,2 g
120 ml (4 oz liq.)	120 ml (4 oz liq.)	24,3 g
180 ml (6 oz liq.)	180 ml (6 oz liq.)	36,5 g
240 ml (8 oz liq.)	240 ml (8 oz liq.)	48,6 g

- Complex MSD Essential

  Ajouter le contenu de 1 mesurette (40 g) à environ 210 ml (7 oz liq.) d'eau froide.

- Complex MSD Amino Acid Blend

  Ajouter simplement une portion à une part d'aliment, de boisson ou de préparation pour la leucinose en poudre à faible teneur en protéines. La taille de la portion appropriée doit être établie et consommée afin de répondre aux besoins prescrits en matière d'acides aminés de protéines. Non destiné à être ajouté à de l'eau.

Précautions :

- Doit être consommé par des personnes atteintes d'une leucinose confirmée. Ne convient pas aux nourrissons. Ne convient pas comme seule source d'alimentation. N'est pas destiné à un usage parentéral.

Conservation :

- Conserver toute boîte non ouverte à la température ambiante. Ne pas entreposer à des températures extrêmes. Une fois ouverte, refermer la boîte avec le couvercle fourni et la conserver dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur); utiliser au cours du mois qui suit.

GlutarAde[MD]: Junior, Essential et Amino Acid Blend

Des préparations pour la prise en charge nutritionnelle de l'acidémie glutarique de type 1 (AG1) chez les enfants et les adultes, y compris les femmes enceintes et les femmes en âge de procréer.

Administration :

- Utiliser seulement sous la supervision d'un médecin ou d'un diététiste. GlutarAde doit être consommé en association avec des protéines complètes, des liquides et d'autres nutriments aux quantités prescrites par un médecin ou un diététiste afin de répondre aux besoins en lysine et en nutriments généraux.

Instructions pour le mélange :

- Ajouter la quantité prescrite de poudre GlutarAde à de l'eau froide, puis agiter ou remuer jusqu'à ce qu'elle se soit complètement mélangée à l'eau.
- La dilution peut être adaptée au goût. Consulter les indications dans les tableaux qui suivent.
- Une fois reconstituée, conserver la préparation au réfrigérateur pendant un maximum de 24 heures. Agiter ou remuer la préparation immédiatement avant utilisation.
- Ne pas réchauffer, cuire au four ou ajouter à des aliments ou à des boissons à plus de 54 °C (130 °F).

Dilution recommandée

• GlutarAde Junior

Dilution d'environ 20 calories par 30 ml (1 oz liq.)

Pour faire environ	Eau	Quantité de poudre
60 ml (2 oz liq.)	60 ml (2 oz liq.)	9,8 g
120 ml (4 oz liq.)	120 ml (4 oz liq.)	19,5 g
180 ml (6 oz liq.)	180 ml (6 oz liq.)	29 g
240 ml (8 oz liq.)	240 ml (8 oz liq.)	39 g

Une mesurette rase de poudre non tassée donne environ 9,8 g de poudre. Pour plus de précision, utiliser une balance.

Dilution d'environ 30 calories par 30 ml (1 oz liq.)

Pour faire environ	Eau	Quantité de poudre
60 ml (2 oz liq.)	60 ml (2 oz liq.)	14,7 g
120 ml (4 oz liq.)	120 ml (4 oz liq.)	29,4 g
180 ml (6 oz liq.)	180 ml (6 oz liq.)	44,1 g
240 ml (8 oz liq.)	240 ml (8 oz liq.)	58,8 g

- GlutarAde Essential
  Ajouter le contenu de 1 mesurette (40 g) à environ 210 ml (7 oz liq.) d'eau froide.
- GlutarAde Amino Acid Blend
  Ajouter simplement une portion à une part d'aliment, de boisson ou de préparation pour l'AG1 à faible teneur en protéines. La portion appropriée doit être établie et consommée afin de répondre aux besoins prescrits en matière d'acides aminés de protéines. Non destiné à être ajouté à de l'eau.

Précautions :

- Doit être consommé par des personnes atteintes d'acidémie glutarique de type 1 confirmée. Ne convient pas aux nourrissons. Ne convient pas comme seule source d'alimentation. N'est pas destiné à un usage parentéral.

Conservation :

- Conserver toute boîte non ouverte à la température ambiante. Ne pas entreposer à des températures extrêmes. Une fois ouverte, refermer la boîte avec le couvercle fourni et la conserver dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur); utiliser au cours du mois qui suit.

UCD Anamix[MD] Junior

Une préparation pour la prise en charge nutritionnelle des maladies du cycle de l'urée chez les personnes de plus de 1 an.

Administration :

- Doit être consommé en association avec des protéines complètes, des liquides et d'autres nutriments, aux quantités prescrites par un médecin ou un diététiste afin de répondre aux besoins en protéines et en nutriments généraux.
- L'apport recommandé d'UCD Anamix Junior dépend de l'âge, du poids corporel et de l'état de santé de la personne. L'apport est ajusté pour maintenir la croissance et le développement normaux. Pour plus de précision, utiliser une balance. L'apport quotidien doit être divisé en portions égales réparties sur toute la journée.

Instructions pour le mélange :

- Meilleur lorsque servi froid avec les repas.
- Verser le volume requis d'eau froide dans un verre ou une tasse.
- Ajouter la quantité prescrite de poudre UCD Anamix Junior à l'eau et mélanger. Pour plus de précision, il est recommandé d'utiliser une balance.
- Il est recommandé de préparer UCD Anamix Junior dans un rapport de dilution de 1 dans 3,5. Ce rapport de dilution n'est fourni qu'à titre indicatif. D'autres proportions pourraient être recommandées par un médecin ou un diététiste (p. ex., boisson ou pâte). Si le produit est administré sous une forme plus concentrée, de l'eau ou des boissons diluées devraient être offertes en même temps. Une fois reconstituée, conserver la préparation au réfrigérateur pendant un maximum de 24 heures. Agiter ou remuer la préparation immédiatement avant utilisation.

Indications de dilution pour UCD Anamix Junior

Dilution	Quantité de poudre	Volume d'eau	ÉP approx.
1 dans 3,5	50 g (10 mesurettes)	175 ml (approx. 6 oz liq.)	6,0 g

Précautions :

- Administrer uniquement sous étroite surveillance médicale aux patients présentant une maladie du cycle de l'urée confirmée. Ne convient pas aux enfants de moins de 1 an. Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation. N'est pas destiné à un usage parentéral.

Conservation :

- Conserver les boîtes non ouvertes dans un endroit frais et sec. Ne pas entreposer à des températures extrêmes. Une fois ouverte, refermer la boîte avec le couvercle fourni et la conserver dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur); utiliser au cours du mois qui suit.

ALIMENTS FAIBLES EN PROTÉINES

Aliments faibles en protéines Loprofin et Milupa

Une gamme de produits pour ajouter de la variété à un régime alimentaire restreint en protéines. Notre gamme d'aliments faibles en protéines comprend un mélange à pâtisserie, des pâtes, du riz, des céréales, des craquelins et plus encore.

Indications : Prise en charge nutritionnelle de certaines maladies métaboliques héréditaires et autres affections médicales pour lesquelles un régime alimentaire à faibles teneur en protéines est indiqué.

Pour de plus amples renseignements, visiter www.NutriciaMetabolics.com (en anglais seulement)

Nathan
A reçu un diagnostic d'épilepsie réfractaire

NEUROLOGIE

KetoCal[MD] 4:1 en poudre

Une préparation cétogène complète sur le plan nutritionnel dans un rapport de 4:1 (matières grasses : glucides + protéines) pour la prise en charge nutritionnelle de l'épilepsie réfractaire et d'autres affections liées à l'épilepsie où la diète cétogène est indiquée. Produit conçu pour les personnes âgées de plus de 1 an.

Principales caractéristiques :

- Complet sur le plan nutritionnel
- Rapport de 4:1
- Préparation pratique en une étape avec une approche non modulaire
- Arôme de vanille
- Mélange de fibres
- DHA et ARA
- Convient à l'alimentation entérale ou orale
- Contient du sucralose
- Haute teneur en nutriments pour les enfants dont les besoins énergétiques sont peu élevés
- Dilution standard = 1 kcal/ml
- Osmolalité (à 1 kcal/ml) : 170 mOsm/kg d'H_2O
- Distribution énergétique :
  Protéines : 8,2 %
  Glucides : 3,5 %
  Fibres : 1,5 %
  Lipides (TCL 100 %) 88,3 %
- Déplacement : 1 ml/g

Indications :

- Épilepsie réfractaire
- Autres affections liées à l'épilepsie où la diète cétogène est indiquée, y compris :
  - Syndrome du déficit en transporteur de glucose de type 1 (GLUT1)
  - Déficit en pyruvate déshydrogénase (DPD)
  - Syndrome de Dravet
  - État de mal épileptique super réfractaire (EMESR)

Pour des détails sur l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
101777	6 x 300 g (11 oz)	2 115

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 100 ml
Énergie, kcal (kJ)	705 (2 950)	100 (411)
Protéines, g	14,4	2,0
Glucides, g	8,2	1,2
Fibres, g	5,3	0,75
Solubles, g	3,2	0,45
Insolubles, g	2,1	0,30
Lipides, g	69,2	9,8
Saturés, g	26,7	3,8
+ Trans, g	0	0
Monoinsaturé, g	22,8	3,2
Polyinsaturés g	19,7	2,8
Acide arachidonique, mg	120	17,0
Acide docosahexanoïque, mg	110	15,6
Vitamines		
Vitamine A, UI (µg)	1 232 (370)	175 (52,5)
Vitamine D, UI (µg)	420 (10,5)	59,6 (1,5)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	15,9 (10,7)	2,3 (1,5)
Vitamine K, mg	0,031	0,0044
Thiamine, mg	0,89	0,13
Riboflavine, mg	0,70	0,10
Vitamine B_6, mg	0,70	0,10
Vitamine B_{12}, mg	0,0013	0,00018
Niacine, mg	4,9	0,70
Acide folique, mg	0,116	0,0165
Acide pantothénique, mg	2,9	0,41
Biotine, mg	0,0191	0,0027
Vitamine C, mg	40,0	5,7
Choline, mg	320	45,5
Inositol, mg	19,1	2,7

Minéraux, oligoéléments	Pour 100 g	Pour 100 ml
Calcium, mg	700	99,3
Phosphore, mg	420	59,6
Magnésium, mg	96,3	13,7
Fer, mg	7,0	0,99
Zinc, mg	3,6	0,51
Manganèse, mg	0,83	0,12
Cuivre, mg	0,50	0,071
Iode, mg	0,0862	0,0122
Molybdène, mg	0,0287	0,0041
Chrome, mg	0,0148	0,0021
Sélénium, mg	0,027	0,0038
Sodium, mg	481	68,2
Potassium, mg	771	109
Chlorure, mg	726	103
L-carnitine, mg	45,0	6,4
Taurine, mg	33,0	4,7

Les fibres ne sont pas incluses dans le calcul du rapport cétogène.

Ingrédients :

Huiles végétales raffinées (huile de palme, huile de soya, huile de tournesol à haute teneur en acide oléique), caséine (lait), lécithine de soya, lactosérum (lait), cellulose microcristalline, inuline de racine de chicorée, carbonate de calcium, extraits secs de sirop de maïs, fructooligosaccharide (FOS), dioxyde de silicium, gomme arabique, citrate tripotassique, chlorure de potassium, chlorure de sodium, phosphate tricalcique, amidon de maïs à haute teneur en amylose, arôme artificiel (vanille), L-arginine, L-cystine, bitartrate de choline, huile de *M. alpina**, huile de *C. cohnii***, fibres de soya, L-tryptophane, oxyde de magnésium, caséinate de sodium (lait), ascorbate de sodium, L-phénylalanine, maltodextrine, acide L-ascorbique, L-valine, L-tyrosine, L-carnitine, taurine, sulfate de fer, mono- et diglycérides, acétate de DL-alpha-tocophéryle, sucralose§, M-inositol, L-histidine, sulfate de zinc, niacinamide, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acétate de vitamine A, palmitate d'ascorbyle, tocophérols mixtes, acide folique, iodure de potassium, molybdate de sodium, chlorure chromique, sélénite de sodium, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.

Contient : Lait, soya.

* Une source d'acide arachidonique (ARA)

** Une source d'acide docosahexanoïque (DHA)

§ Contient 14,2 mg/100 ml de sucralose

KetoCal[MD] 4:1 LQ

Une préparation cétogène complète sur le plan nutritionnel prête à l'emploi dans un rapport de 4:1 (matière grasse : glucides + protéines) pour la prise en charge nutritionnelle de l'épilepsie réfractaire et d'autres affections liées à l'épilepsie où la diète cétogène est indiquée. Produit conçu pour les personnes âgées de plus de 1 an.

Principales caractéristiques :

- Complet sur le plan nutritionnel
- Rapport de 4:1
- Préparation prête à l'emploi pratique
- Délicieux arôme de vanille ou non aromatisé
- Mélange de fibres
- DHA et ARA
- Convient à l'alimentation entérale ou orale
- Contient du sucralose
- Haute teneur en nutriments pour les enfants dont les besoins énergétiques sont peu élevés
- Osmolalité (à 1,5 kcal/ml) :
  Vanille 260 mOsm/kg d'H_2O
  Non aromatisé 280 mOsm/kg d'H_2O
- Distribution énergétique :
  Protéines 8,2 %
  Glucides 3,1 %
  Fibres 1,5 %
  Lipides (TCL 100 %) 88,7 %
- Eau libre 77,8 %
- Densité 1,01 g/ml

Indications :

- Épilepsie réfractaire
- Autres affections liées à l'épilepsie où la diète cétogène est indiquée, y compris :
  - Syndrome du déficit en transporteur de glucose de type 1 (GLUT1)
  - Déficit en pyruvate déshydrogénase (DPD)
  - Syndrome de Dravet
  - État de mal épileptique super réfractaire (EMESR)

Pour des détails sur l'administration, veuillez consulter la fin de cette section.

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par contenant
113354 – Vanille	27 x 237 ml (8 oz liq.)	356
113357 – Non aromatisé	27 x 237 ml (8 oz liq.)	356

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 ml	Par contenant (237 ml)
Énergie, kcal (kJ)	150 (620)	356 (1 469)
Protéines, g	3,09	7,32
Glucides, g	1,73	4,10
Fibres alimentaires, g	1,12	2,65
Solubles, g	0,56	1,33
Insolubles, g	0,56	1,33
Lipides, g	14,8	35,1
Saturés, g	2,2	5,2
+ Trans, g	0	0
Monoinsaturés, g	8,3	19,7
Polyinsaturés, g	3,7	8,8
Acide arachidonique, mg	55,0	131
Acide docosahexanoïque, mg	55,0	131
Vitamines		
Vitamine A, UI	264	626
Vitamine D_3, UI	92,0	220
Vitamine E, UI	2,3	5,5
Vitamine K, mg	0,0056	0,0132
Thiamine, mg	0,15	0,36
Riboflavine, mg	0,15	0,36
Vitamine B_6, mg	0,15	0,36
Vitamine B_{12}, mg	0,00017	0,00040
Niacine, mg	1,5	3,6
Acide folique, mg	0,0287	0,0680
Acide pantothénique, mg	0,62	1,50
Biotine, mg	0,0041	0,0097
Vitamine C, mg	9,3	22,0
Choline, mg	51,5	122
Inositol, mg	4,1	9,7

Minéraux, oligoéléments	Pour 100 ml	Par contenant (237 ml)
Calcium, mg	88,4	210
Phosphore, mg	88,4	210
Magnésium, mg	22,7	53,8
Fer, mg	1,5	3,6
Zinc, mg	1,2	2,8
Manganèse, mg	0,180	0,427
Cuivre, mg	0,120	0,284
Iode, mg	0,0185	0,0438
Molybdène, mg	0,0062	0,0147
Chrome, mg	0,0032	0,0076
Sélénium, mg	0,0071	0,0168
Sodium, mg	103	244
Potassium, mg	165	391
Chlorure, mg	155	367
Carnitine, mg	8,3	19,7
Taurine, mg	6,3	14,9

Les fibres ne sont pas incluses dans le calcul du rapport cétogène.

Ingrédients (non aromatisé et vanille) :

Eau, huiles végétales raffinées (huile de tournesol à haute teneur en acide oléique, huile de soya, huile de palmiste), caséinate de sodium (lait), concentré de protéines de lactosérum (lait), fibres de soya, amidon de maïs, inuline de racine de chicorée, esters d'acide citrique de mono- et diglycérides, phosphate dipotassique, gomme arabique, chlorure de calcium, huile de *Mortierella alpina**, acétate de magnésium, chlorure de potassium, huile de *Crypthecodinium cohnii***, cellulose microcristalline, fructooligosaccharide (FOS), acide ascorbique, phosphate de calcium monobasique, mono- et diglycérides, citrate trisodique, hydroxyde de sodium, chlorure de choline, L-cystine, phosphate de calcium dibasique, alginate de propylèneglycol, lactate ferreux, L-carnitine, taurine, inositol, L-tryptophane, sulfate de zinc, acétate de DL-alpha-tocophéryle, lécithine de soya, niacinamide, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, palmitate d'ascorbyle, sulfate de cuivre, chlorhydrate de chlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acétate de vitamine A, tocophérols mixtes, DL-alpha tocophérol, acide folique, iodure de potassium, chlorure chromique, sélénite de sodium, molybdate de sodium, phylloquinone, biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine.

Contient : Lait, soya.

La version **non aromatisée** contient également du sucre.

La version aromatisée à la **vanille** contient du sucre, un arôme artificiel (vanille) et du sucralose : 43 mg/237 ml.

Veuillez consulter les étiquettes des produits individuels pour connaître l'ordre exact des ingrédients.

* Une source d'acide arachidonique (ARA)

** Une source d'acide docosahexanoïque (DHA)

Gamme KetoCal[MD]

Préparation :

Pour l'alimentation orale ou par sonne :

KetoCal 4:1 en poudre

1. Mesurer la quantité d'eau tiède requise dans un contenant qui se ferme avec un couvercle vissable. Pour dissoudre complètement la poudre, l'eau doit être à une température de 45 à 50 °C (113 à 122 °F).
2. Ajouter la quantité prescrite de KetoCal à l'eau.
3. Couvrir et agiter le contenant jusqu'à dissolution complète de la poudre.
4. Une fois reconstituée, la préparation doit être conservée au réfrigérateur pendant un maximum de 24 heures.

Utilisation :

- Pour l'alimentation orale, servir froid et consommer immédiatement.
- **Durée de l'alimentation par sonde :** Selon la recommandation de Nutricia, la préparation peut être conservée en toute sécurité à la température ambiante pendant un maximum de 4 heures, après quoi la préparation inutilisée doit être jetée.
- Il est recommandé de rincer la sonde à l'eau tiède (environ 37 °C ou 98 °F) entre chaque alimentation.
- Ne pas faire bouillir ou chauffer la préparation au four à micro-ondes.
- Ne pas congeler. Conserver le produit à une température se situant entre 4 et 25 °C (39 et 77 °F).
- Une fois que la préparation en poudre est préparée ou que la boîte de la préparation liquide est ouverte, utiliser immédiatement ou réfrigérer rapidement à 4 °C/39 °F ou moins et utiliser dans les 24 heures.

Instructions pour le mélange :

KetoCal 4:1 en poudre

Dilution selon l'ordonnance :

Dilution	Poudre	Eau	Volume final	Osmolalité
0,67 kcal/ml	9,5 g	91 ml	100 ml	110 mOsm/kg
0,8 kcal/ml	11,4 g	89 ml	100 ml	130 mOsm/kg
1 kcal/ml	14,3 g	86 ml	100 ml	170 mOsm/kg
1,5 kcal/ml	21,4 g	79 ml	100 ml	260 mOsm/kg

Une balance est nécessaire pour le mélange adéquat de la préparation.

Conservation :

Conserver le produit scellé au frais et au sec, à l'abri du soleil.

KetoCal 4:1 en poudre : Une fois ouverte, refermer la boîte avec le couvercle et la conserver dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur); utiliser au cours du mois qui suit.

KetoCal 4:1 LQ : Une fois ouvert, conserver au réfrigérateur. Jeter si non consommé dans les 24 heures. Ne pas congeler.

Volume et guide de commande

		KetoCal 4:1 en poudre		KetoCal 4:1 LQ (liquide) Vanille ou non aromatisé	
Calories/ jour	Calories/ mois	Boîtes/ mois	Caisses/ mois	Contenants/ mois	Caisses mois
600	18 000	9	2	51	2
700	21 000	10	2	59	3
800	24 000	12	2	68	3
900	27 000	13	3	76	3
1 000	30 000	15	3	85	4
1 100	33 000	16	3	93	4
1 200	36 000	18	3	102	4
1 300	39 000	19	4	110	5
1 400	42 000	20	4	118	5
1 500	45 000	22	4	127	5
1 600	48 000	23	4	135	5
1 700	51 000	25	5	144	6
1 800	54 000	26	5	152	6
1 900	57 000	28	5	161	6
2 000	60 000	29	5	169	7

* Le nombre de boîtes et de caisses par mois est arrondi au nombre entier le plus proche.

Mise en garde :

- Ne pas faire bouillir ou chauffer la préparation au four à micro-ondes.
- Surveiller l'apparition d'une hypoglycémie, de calculs rénaux ou d'une hyperlipidémie, et s'assurer d'une croissance adéquate de l'enfant.
- **UTILISER UNIQUEMENT SOUS ÉTROITE SURVEILLANCE MÉDICALE. N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE PARENTÉRAL.**
- L'apport recommandé doit être déterminé par un professionnel de la santé en fonction de l'âge, du poids et de l'état de santé du patient.

Habul
A reçu un diagnostic
de leucinose

AUTRES PRODUITS NUTRITIONNELS

Monogen[MD]

Préparation en poudre à base de protéines de lait, à faible teneur en lipides et à haute teneur en triglycérides à chaîne moyenne (TCM). Pour utilisation comme supplément chez les personnes de plus de 1 an.

Principales caractéristiques :

- 26 % des calories provenant de lipides
- 84 % des lipides en tant que TCM
- Contient du DHA et de l'ARA
- Fournit des protéines sous la forme d'un mélange de caséine/lactosérum; caséine 61 %, lactosérum 39 %
- Contient un profil complet de vitamines et de minéraux, y compris des oligoéléments
- Osmolalité (mOsm/kg) :

  Dilution
  0,74 kcal/ml : 240 mOsm/kg d'H_2O
  1,0 kcal/ml : 365 mOsm/kg d'H_2O

Indications :

- Troubles d'oxydation des acides gras à chaîne longue
- Hyperlipoprotéinémie de type 1
- Autres troubles lipidiques et lymphatiques pour lesquels un régime alimentaire à haute teneur en TCM est indiqué
- Chylothorax

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
106033	6 x 400 g (14,1 oz)	1 776

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g	Pour 100 kcal
Calories	444	100
Protéines, g	12,8	2,9
Lipides, g	12,9	2,9
TCM, g	10,9	2,5
TCL, g	2,0	0,45
Acide linoléique, g	0,87	0,20
Acide α-linolénique, g	0,18	0,04
ARA, mg	60,0	14,1
DHA, mg	60,0	14,1
Glucides, g	68,6	15,6
Vitamines		
Vitamine A, UI	1 158	263
Vitamine D_3, UI	428	97,2
Vitamine E, UI	6,6	1,5
Vitamine K, mg	0,0161	0,0037
Thiamine, mg	0,32	0,07
Riboflavine, mg	0,47	0,11
Vitamine B_6, mg	0,40	0,09
Vitamine B_{12}, mg	0,0006	0,00014
Niacine, mg	2,7	0,61
Acide folique, mg	0,061	0,0137

Nutriments	Pour 100 g	Pour 100 kcal
Acide pantothénique, mg	2,0	0,45
Biotine, mg	0,014	0,0032
Vitamine C, mg	53,9	12,2
Choline, mg	90,9	20,6
Inositol, mg	78,7	17,9
Minéraux		
Calcium, mg	329	74,7
Phosphore, mg	198	44,9
Magnésium, mg	39,6	9,0
Fer, mg	6,0	1,4
Zinc, mg	4,1	0,93
Manganèse, mg	0,028	0,006
Cuivre, mg	0,323	0,0732
Iode, mg	0,0796	0,0181
Molybdène, mg	0,0216	0,0049
Chrome, mg	0,0089	0,002
Sélénium, mg	0,0156	0,0036
Sodium, mg	189	42,9
Potassium, mg	357	81,2
Chlorure, mg	271	61,6

Ingrédients :

Maltodextrine, lait écrémé, huiles végétales raffinées (huiles de palmiste et/ou de noix de coco modifiées), lactosérum (lait), caséinate (lait), huile de noix de Grenoble, extraits secs de sirop de maïs, citrate de sodium, chlorure de potassium, carbonate de calcium, hydrogénophosphate de magnésium, chlorure de choline, huile de *C. cohnii*, huile de *M. alpina*, L-valine, inositol, acide L-ascorbique, L-tryptophane, L-ascorbate de sodium, taurine, L-isoleucine, sulfate de fer, sulfate de zinc, L-carnitine, acétate de DL-alpha-tocophéryle, niacinamide, DL-alpha-tocophérol, D-pantothénate de calcium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de chlorure de thiamine, acétate de vitamine A, riboflavine, acide folique, iodure de potassium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, phylloquinone, D-biotine, sélénite de sodium, vitamine D_3.

Contient : Lait, huile de noix de Grenoble, huile de noix de coco.

Administration :

- L'apport recommandé est établi par un professionnel de la santé en fonction de l'âge, du poids et de l'état de santé du patient.
- Une surveillance régulière des acides gras essentiels est recommandée.
- Pour l'alimentation orale et par sonde chez les personnes de plus de 1 an.

Pour l'alimentation orale ou par sonde :

1. Mesurer la quantité requise d'eau tiède et la verser dans un contenant.
2. Ajouter la quantité prescrite de Monogen à l'eau. La mesurette fournie dans la boîte contient 5,6 g de poudre (rase non tassée).
3. Couvrir et agiter le contenant jusqu'à dissolution complète de la poudre.

Voici des indications pour atteindre les concentrations souhaitées :

Concentration	Poudre	Eau	Volume final
22 kcal/30 ml (0,74 kcal/ml)	16,8 g (3 mesurettes)	90 ml (3 oz liq.)	100 ml
30 kcal/30 ml (1,0 kcal/ml)	22,7 g (4 mesurettes)	80 ml (2 ½ oz liq.)	100 ml

Les mesurettes rases de poudre non tassée ne sont qu'approximatives. Pour plus de précision, utiliser une balance.

Une fois reconstituée, la préparation doit être conservée au réfrigérateur pendant un maximum de 12 heures. Agiter ou remuer Monogen immédiatement avant utilisation.

Précautions :

- Doit être utilisé sous supervision médicale.
- N'est pas destiné à un usage parentéral.

Conservation :

Garder dans un endroit frais et sec. Une fois ouvert, utiliser au cours du mois qui suit. Bien refermer le couvercle après usage.

Liquigen[MD]

Émulsion hyperénergétique de triglycérides à chaîne moyenne (TCM) pour les affections exigeant une prise en charge nutritionnelle à base de TCM, comme les troubles d'oxydation des acides gras à chaîne longue ou les maladies prises en charge par une diète cétogène.

Principales caractéristiques :

- Simplifie l'ajout de TCM au régime alimentaire
- Émulsionné pour faciliter le mélange
- 50 % de TCM et 50 % d'eau
- Non aromatisé
- Hyperénergétique : 4,5 kcal/ml
- Osmolalité: 10 mOsm/kg d'H_2O
- Densité : 0,97 g/ml
- Destiné à une administration par voie orale ou entérale
- Peut être utilisé dans les boissons et les aliments

Indications :

Maladies pour lesquelles les TCM font partie de la prise en charge nutritionnelle, comme :

- Maladies prises en charge par une diète cétogène
- Troubles d'oxydation des acides gras à chaîne longue
- Autres erreurs innées du métabolisme où les TCM peuvent être bénéfiques
- Chylothorax
- Malabsorption des lipides
- Syndrome de l'intestin court

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par bouteille
169221 (caisse)	250 ml (8,5 oz liq.)	1 125

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 ml	Pour 250 ml
Calories	450	1 125
Protéines, g	Aucune	Aucune
Glucides, g	Aucun	Aucun
Lipides, g	50,0	125
Saturés, g	47,1	118
+ Trans, g	0	0
TCM, g (%)	45,4 (96,4 %)	114 (96,4 %)
Minéraux		
Sodium, mg	5,0	12,5

Ingrédients :

Huiles végétales raffinées (huiles de palmiste ou de noix de coco modifiées [triglycérides à chaîne moyenne]), eau, esters d'acide citrique des mono- et diglycérides, mono- et diglycérides, acide citrique.

Administration :

- La quantité de Liquigen doit être déterminée par un professionnel de la santé seulement, en fonction de l'âge, du poids et de l'état de santé du patient.
- Liquigen peut nécessiter une dilution chez les enfants âgés de moins de 5 ans.
- **Bien agiter avant d'utiliser.**

Précautions :

- Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation.
- N'est pas destiné à un usage parentéral.

Conservation :

- Conserver à une température comprise entre 4 et 25 °C (39 et 77 °F).
- Une fois ouvert, conserver au réfrigérateur et utiliser au cours des 14 jours qui suivent.
- Toujours refermer la bouteille après utilisation.

Duocal[MD]

Un produit en poudre qui fournit des lipides et des glucides afin d'augmenter l'apport calorique.

Principales caractéristiques :

- Hypercalorique – 1 mesurette (5 g) fournit 25 kcal
- Source d'énergie unique constituée d'un double apport de lipides et de glucides
- Soluble dans les liquides et les aliments humides sans modifier la saveur ou la texture
- Sans protéines de lait
- Osmolalité (dilution 1:3) : 310 mOsm/kg d'H_2O
- 1 gramme contribue à environ 0,93 mOsm lorsqu'ajouté à une solution
- Charge osmotique rénale potentielle inférieure à 0,017 mOsm/g
- Distribution énergétique :
  Glucides 59 %
  Lipides (TCM 50 % / TCL 50 %) 41 %
- Déplacement : 0,77 ml/g

Indications :

- Maladies pour lesquelles un régime alimentaire à haute teneur énergétique, avec restriction hydrique et à faible teneur en électrolytes est indiqué
- Régime alimentaire à faible teneur en protéines
- Troubles du métabolisme des protéines et des acides aminés
- États de malabsorption
- Régimes alimentaires modulaires
- États cataboliques (p. ex., brûlures, traumatisme, stress postopératoire)

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
49828	6 x 400 g (14,1 oz)	1 968

Information nutritionnelle :

Nutriments Pour 100 g	
Calories	492
Protéines, g	0
Lipides, g	22,3
Saturés, g	13,8
Monoinsaturés, g	2,5
Polyinsaturés, g	4,8
Glucides, g	72,7
Minéraux	
Sodium, mg	≤ 20,0
Potassium, mg	≤ 5,0
Chlorure, mg	≤ 20,0
Calcium, mg	≤ 5,0
Phosphore, mg	≤ 5,0

Ingrédients :

Extraits secs de sirop de maïs, huiles végétales raffinées (huile de maïs, huile de noix de coco non hydrogénée, huile de noix de coco et/ou de palmiste modifiées [triglycérides à chaîne moyenne]), mono- et diglycérides, esters d'acide diacétyltartrique de mono- et diglycérides.

Mesures domestiques :

(toutes les mesures sont des mesures rases de poudre non tassée)

Mesure	Poids	Calories
1 mesurette	5 g	25
1 c. à thé	2,6 g	13
1 c. à table	8,5 g	42
¼ tasse	30 g	148
½ tasse	56 g	276
1 tasse	117 g	576

Selon les mesures domestiques sèches standards. Toutes les mesures sont des mesures rases de poudre non tassée. Les mesures domestiques ne sont qu'approximatives. Pour plus de précision, utiliser une balance.

Précautions :

- N'est pas destiné à un usage parentéral.
- Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation.

Administration :

- Doit être utilisé sous supervision médicale. Pour les personnes de 1 an et plus.
- L'apport recommandé doit être déterminé par un professionnel de la santé en fonction de l'âge, du poids et de l'état de santé du patient.

Pour l'alimentation orale ou par sonde :

1. Mesurer la quantité recommandée de Duocal.
2. Ajouter la poudre au volume requis de liquide et/ou d'aliments mous et remuer sans arrêt jusqu'à ce que la poudre soit dissoute. Une mesure rase de poudre non tassée contient environ 5 g de poudre (25 kcal).
3. Tout reste d'aliments et de liquides mélangés avec Duocal doit être réfrigéré et utilisé au cours des 24 heures qui suivent. Agiter ou remuer immédiatement avant de servir.

Conservation :

- Conserver toute boîte non ouverte dans un endroit frais et sec. Une fois ouvert, utiliser au cours du mois qui suit. Bien refermer le couvercle après usage.

Polycal[MC]

Source d'énergie concentrée (maltodextrine), en poudre.

Principales caractéristiques :

- Une source d'énergie concentrée en glucides – 1 mesurette contient environ 5 g (~20 kcal)
- Une source de maltodextrine facile à digérer
- Entièrement soluble dans les aliments et les boissons
- Un goût neutre – il ne modifie pas la saveur des aliments et des boissons
- Osmolalité (solution à 10 %) : 104 mOsm/kg d'H_2O
- 1 gramme contribue à environ 1,04 mOsm lorsqu'ajouté à une solution
- Charge osmotique rénale potentielle < 0,01 mOsm/10 g
- Déplacement : 0,57 ml/g

Indications :

- Maladies pour lesquelles un régime alimentaire à haute teneur énergétique, une restriction hydrique ou des préparations modulaires sont indiqués
- Pour la prise en charge nutritionnelle des besoins énergétiques

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
89461	12 x 400 g (14,1 oz)	1 536

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g
Calories	384
Glucides, g	96,0
Protéines, g	0
Lipides, g	0
Minéraux	
Sodium, mg	2,0
Potassium, mg	0

Ingrédient :

Maltodextrine.

Mesures domestiques :

(toutes les mesures sont des mesures rases de poudre non tassée)

Mesure	Poids	Calories
1 mesurette	5 g	~20 kcal
¼ c. à thé	1,2 g	4,6 kcal
1 c. à thé	2,4 g	9,3 kcal
1 c. à table	7,3 g	27,8 kcal
¼ tasse	29,0 g	111 kcal
⅓ tasse	38,7 g	148 kcal
½ tasse	58,0 g	223 kcal
1 tasse	116 g	445 kcal

Selon les mesures domestiques sèches standards. Toutes les mesures sont des mesures rases de poudre non tassée. Les mesures domestiques ne sont qu'approximatives. Pour plus de précision, utiliser une balance.

(Pour les mesures sèches standards, 1 tasse = 240 ml)

Précautions :

- N'est pas destiné à un usage parentéral.
- Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation.

Administration :

L'apport recommandé doit être déterminé par un professionnel de la santé en fonction de l'âge, du poids et de l'état de santé du patient.

La mesurette fournie dans la boîte contient environ 5 g de poudre (~20 kcal).

- Boissons : Saupoudrer la quantité de poudre requise dans une boisson et bien agiter.
- Aliments : Pour de meilleurs résultats, diluer la poudre dans suffisamment de liquide pour former une pâte lisse, puis mélanger cette pâte à un aliment chaud ou froid.

Conservation :

Conserver toute boîte non ouverte dans un endroit frais et sec. Une fois ouverte, refermer la boîte avec le couvercle et la conserver dans un endroit frais et sec (pas au réfrigérateur); utiliser au cours du mois qui suit. Les boissons et les aliments non utilisés peuvent être réfrigérés pendant un maximum de 24 heures.

Complete Amino Acid Mix

Un mélange en poudre non aromatisé d'acides aminés essentiels et non essentiels.

Principales caractéristiques :

- Mélange équilibré d'acides aminés essentiels et non essentiels
- Comble les besoins protéiques accrus dans les préparations entérales
- Complete Amino Acid Mix fournit 4 g d'équivalent en protéines pour 5 g de poudre
- Osmolalité (5 % p/v) : 360 mOsm/kg d'H_2O
- Déplacement approximatif : 0,75 ml/g

Indication :

- Prise en charge nutritionnelle des maladies nécessitant des protéines supplémentaires sous forme d'acides aminés

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
53341	6 x 200 g (7 oz)	656

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g
Calories	328
Équivalent en protéines, g	82
Lipides, g	Aucun
Glucides, g	Aucun
Acides aminés, g	
L-alanine	3,5
L-arginine	7,66
Acide L-aspartique	6,39
L-cystine	2,4
Acide L-glutamique	8,17
Glycine	6,0
L-histidine	4,38
L-isoleucine	5,95
L-leucine	10,22
L-lysine	7,55
L-méthionine	1,65
L-phénylalanine	4,5
L-proline	7,0
L-sérine	4,29
L-thréonine	5,0
L-tryptophane	2,0
L-tyrosine	4,3
L-valine	6,5
L-glutamine	0,7

Ingrédients :

L-lysine L-glutamate, L-leucine, L-arginine, L-proline, L-valine, acide L-aspartique, glycine, L-isoleucine, L-thréonine, L-phénylalanine, L-histidine, L-sérine, L-tyrosine, L-alanine, L-cystine, L-tryptophane, L-méthionine, L-glutamine, acide L-glutamique.

Mesures domestiques :

(toutes les mesures sont des mesures rases de poudre non tassée)

Mesure	Poids	Équivalent en protéines
1/2 c. à thé	1,4 g	1,15
1 c. à thé	2,9 g	2,38
1/2 c. à table	4,4 g	3,61
1 c. à table	9,5 g	7,79

Selon les mesures domestiques sèches standards. Toutes les mesures sont des mesures rases de poudre non tassée. Les mesures domestiques ne sont qu'approximatives. Pour plus de précision, utiliser une balance.

Précautions :

- N'est pas destiné à un usage parentéral.
- Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation.

Administration :

- L'apport recommandé doit être déterminé par un professionnel de la santé en fonction de l'âge, du poids et de l'état de santé du patient.
- La concentration d'alimentation recommandée est de 5 % p/v (p. ex., 5 g de poudre dans 100 ml d'eau).
- Complete Amino Acid Mix doit être pesé sur une balance qui se lit en grammes.
- A meilleur goût lorsque servi comme boisson froide, mélangé à de l'eau, des jus de fruits ou d'autres préparations. Complete Amino Acid Mix peut également être ajouté à des aliments mous et humides, comme de la compote de pommes.

Conservation :

- Garder dans un endroit frais et sec. Une fois ouvert, utiliser au cours du mois qui suit. Toujours refermer le couvercle du contenant après utilisation.
- Une fois reconstituée, la préparation doit être conservée au réfrigérateur pendant un maximum de 24 heures. Remuer ou agiter immédiatement avant de servir.

Essential Amino Acid Mix

Un mélange en poudre non aromatisé d'acides aminés essentiels, y compris de la cystine et de l'histidine.

Principales caractéristiques :

- Mélange équilibré d'acides aminés essentiels
- Essential Amino Acid Mix fournit 4 g d'équivalent en protéines par 5 g de poudre
- Osmolalité (5 % p/v) : 360 mOsm/kg d'H_2O
- Déplacement approximatif : 0,75 ml/g

Indications :

- Prise en charge nutritionnelle des maladies du cycle de l'urée
- Maladies pour lesquelles une alimentation complète sur le plan nutritionnel n'est pas appropriée ou une approche modulaire est requise

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par boîte
53342	6 x 200 g (7 oz)	632

Information nutritionnelle :

Nutriments	Pour 100 g
Calories	316
Équivalent en protéines, g	79
Lipides, g	Aucun
Glucides, g	Aucun
Acides aminés, g	
L-cystine	3,78
L-histidine	3,78
L-isoleucine	10,4
L-leucine	16,17
L-lysine	13,25
L-méthionine	3,78
L-phénylalanine	5,67
L-thréonine	11,35
L-tryptophane	2,36
L-tyrosine	9,46
L-valine	14,56

Ingrédients :

Acétate de L-lysine, L-leucine, L-valine, L-thréonine, L-isoleucine, L-tyrosine, L-phénylalanine, L-histidine, L-cystine, L-méthionine, L-tryptophane.

Mesures domestiques :

(toutes les mesures sont des mesures rases de poudre non tassée)

Mesure	Poids	Équivalent en protéines
1/2 c. à thé	1,4 g	1,11
1 c. à thé	2,7 g	2,13
1/2 c. à table	4,1 g	3,24
1 c. à table	9,0 g	7,11

Selon les mesures domestiques sèches standards. Toutes les mesures sont des mesures rases de poudre non tassée. Les mesures domestiques ne sont qu'approximatives. Pour plus de précision, utiliser une balance.

Précautions :

- N'est pas destiné à un usage parentéral.
- Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation.

Administration :

- L'apport recommandé doit être déterminé par un professionnel de la santé en fonction de l'âge, du poids et de l'état de santé du patient.
- La concentration d'alimentation recommandée est de 5 % p/v (p. ex., 5 g de poudre dans 100 ml d'eau).
- Essential Amino Acid Mix doit être pesé sur une balance qui se lit en grammes.
- A meilleur goût lorsque servi comme boisson froide, mélangé à de l'eau, des jus de fruits ou d'autres préparations. Peut également être ajouté à des aliments mous et humides, comme de la compote de pommes.

Conservation :

- Garder dans un endroit frais et sec. Une fois ouvert, utiliser au cours du mois qui suit. Toujours refermer le couvercle du contenant après utilisation.
- Une fois reconstituée, la préparation doit être conservée au réfrigérateur pendant un maximum de 24 heures. Remuer ou agiter immédiatement avant de servir.

Phlexy-Vits

Une préparation concentrée et en poudre de vitamines, de minéraux et d'oligoéléments conçue pour répondre aux besoins en micronutriments des enfants plus âgés (11 ans et plus) et des adultes.

Principale caractéristique :

- Un sachet de 7 g fournit la majorité des vitamines et minéraux nécessaires pour aider à fournir l'apport nutritionnel de référence chez les personnes de 11 ans et plus

Indication :

- Régimes alimentaires thérapeutiques restrictifs

Renseignements pour commander :

Code de produit	Conditionnement du produit	Calories par sachet
49133	30 x 7 g	0,2

Information nutritionnelle :

Nutriments	Par sachet de 7 g
Calories	0,20
Protéines, g	0,02
Lipides, g	Aucun
Glucides, g	0,04
Vitamines	
Vitamine A, UI (µg ÉR)	2 664 (800)
Vitamine D, UI (µg)	400 (10)
Vitamine E, UI (mg ÉAT)	13,5 (9)
Vitamine K, µg	70,0
Thiamine, mg	1,2
Riboflavine, mg	1,4
Vitamine B_6, mg	1,6
Vitamine B_{12}, µg	5,0
Niacine, mg	20,0
Acide folique, µg	700
Acide pantothénique, mg	5,0
Biotine, µg	150
Vitamine C, mg	50,0
Minéraux	
Calcium, mg	1 000
Phosphore, mg	775
Magnésium, mg	300
Fer, mg	15,1
Zinc, mg	11,1
Manganèse, mg	1,5
Cuivre, µg	1 505
Iode, µg	150
Molybdène, µg	70,0
Chrome, µg	30,0
Sélénium, µg	75,0
Sodium, mg	8,8
Potassium, mg	< 1,4
Chlorure, mg	< 0,35

Ingrédients :

Phosphate de calcium dibasique, acétate de magnésium, gomme de guar, acide L-ascorbique, sulfate de fer, dextrose, sulfate de zinc, nicotinamide, acétate de DL-alpha-tocophéryle, gluconate de cuivre, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, riboflavine, acétate de vitamine A, acide folique, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, D-biotine, chlorure de chrome, phylloquinone, vitamine D_3, cyanocobalamine.

Mesures domestiques :

(toutes les mesures sont des mesures rases de poudre non tassée)

Mesure	Poids
1/4 c. à thé	0,7 g
1/2 c. à thé	1,4 g
1 c. à thé	3 g
1 c. à table	10 g

Selon les mesures domestiques sèches standards. Toutes les mesures sont des mesures rases de poudre non tassée. Les mesures domestiques ne sont qu'approximatives. Pour plus de précision, utiliser une balance.

Précautions :

- N'est pas destiné à un usage parentéral.
- Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation.

Administration :

- Ajouter une petite quantité d'eau et mélanger afin d'obtenir une pâte lisse. Ajouter l'eau restante pour obtenir un volume final d'environ 100 ml.
- Mélanger un sachet de Phlexy-Vits avec une petite quantité de limonade ou de jus de fruits (environ 45 ml) afin d'obtenir une pâte lisse. Diluer jusqu'à un volume final de 150 ml (5 oz liq.). La quantité de limonade/jus et d'eau utilisée variera en fonction des goûts de chacun.

Conservation :

- Garder dans un endroit frais et sec. Une fois ouvert, un sachet doit être rangé dans un contenant refermable et utilisé dans les 2 à 3 jours qui suivent.

NOTES

NOTES

Les produits et les services de Nutricia contribuent à transformer le quotidien de millions de nourrissons, d'enfants et d'adultes | www.Nutricia.ca

NUTRICIA

GUIDE DE RÉFÉRENCE DES PRODUITS DE NUTRICIA

POUR LE CANADA

Pour commander ou pour plus de renseignements, composer le **877 636-2283**

440, boulevard Armand-Frappier, bureau 230, Laval (Québec) H7V 4B4

www.Nutricia.ca

Présenté par Nutricia North America

© 2021 Nutricia North America. Tous droits réservés.

GENPRGEN120 6/21